

تعليم المريض / مقدم الرعاية

نبذة عن جراحتك الصدرية البطنية في مركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) للأطفال

سيساعدك هذا الدليل على الاستعداد لجراحتك في المنطقة الصدرية البطنية في مركز ميموريال سلون كيترینج (MSK). وسيساعدك أيضًا في فهم الأمور المتوقعة خلال فترة التعافي.

استخدم هذا الدليل كمصدر معلومات خلال الأيام السابقة للجراحة. اصطحبه معك في يوم الجراحة. وسيحيلك إليه فريق الرعاية الخاص بك لمعرفة المزيد من المعلومات خلال فترة تعافيك.

ومفردات المخاطب وضمائر المخاطب في هذا المستند تعني أنتم وأطفالكم.

نبذة عن الجراحة الصدرية البطنية الخاصة بك

نبذة عن الورم الأروممي العصبي


الورم الأروممي العصبي هو ورم سرطاني نادر يصيب الأطفال وينشأ في الخلايا العصبية في مراحل تكوينها المبكرة والتي تُعرف بالأرومـات العصبية. تتطور الأرومـات العصبية بشكل طبيعي إلى الخلايا العصبية لبناء الجهاز العصبي للإنسان قبل ولادته. ويحدث الورم الأروممي العصبي عندما يبدأ نمو الأرومـات العصبية بشكل خارج عن السيطرة ويتكون ورم.

تتوقف خطط علاج الورم الأروممي العصبي على عدة عوامل، من بينها مكان الورم في الجسم. فإذا كان في الجزء العلوي من البطن، فقد يوصي الطبيب بإجراء جراحة في المنطقة الصدرية البطنية في إطار خطة العلاج الخاصة بك.

نبذة عن الجراحة الصدرية البطنية

تعتبر الجراحة الصدرية البطنية علاجًا جراحيًا شائعاً للورم الأروممي العصبي في الجزء العلوي من البطن. ويمكن استخدامه أيضًا لعلاج أنواع أخرى من الأورام، غير أن هذا أقل شيوعاً. سيتحدث معك الجراح إذا كنت ستتعرض لجراحة في المنطقة الصدرية البطنية لعلاج أحد أنواع السرطان بخلاف الورم الأروممي العصبي.

أثناء الجراحة الصدرية البطنية، يُحدث الجراح شقًا جراحيًا قطريًا يمتد من الجزء السفلي من الصدر حتى الجزء العلوي من البطن (انظر الشكل 1). وهو يساعد في رؤية هذه المنطقة بوضوح حتى يتمكن من إزالة الورم بشكل آمن.



الشكل 1. الشق الجراحي الصدرى البطنى

سيساعدك الجراح وأعضاء فريق الرعاية الآخرون في معرفة ما يمكن أن تتوقعه قبل الجراحة وأثناءها وبعدها. وسيتناولون بالتفصيل خطة الجراحة التي ستخضع لها ويجيبون عن أي أسئلة لديك.

الاستعداد للجراحة الصدرية البطنية الخاصة بك

ستساعدك المعلومات الواردة في هذا القسم في الاستعداد لإجراء الجراحة الخاصة بك. اقرأ هذا القسم عند تحديد موعد الجراحة الخاصة بك وارجع إليه مع اقتراب موعد إجراء الجراحة. فهو يحتوي على معلومات مهمة حول ما ينبغي عليك فعله قبل الجراحة. أثناء قراءة هذا القسم، دون أي أسئلة واستفسر عنه من مقدم الرعاية الصحية.

الاستعداد للجراحة الصدرية البطنية الخاصة بك

ستتعاون مع فريق الرعاية الصحية من أجل الاستعداد للجراحة الخاصة بك. ومن المهم إبلاغنا بما إذا كنت:

- تتناول أدوية تُصرف بدون وصفة طبية أو أي مكمّلات غذائية. قد تحتاج إلى التوقف عن تناول بعض الأدوية والمكمّلات الغذائية قبل الخضوع للجراحة. حيث قد ترتفع مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الجراحة. وتعتبر الفيتامينات والعلاجات العشبية من ضمن الأمثلة على المكمّلات الغذائية.
- تعاني من أي حساسية.
- واجهت أي مشكلات بخصوص التخدير فيما مضى.

استخدام MyMSK

(MyMSK) هي بوابة المرضى في مركز ميموريال سلون كيترینج [MSK]. ويمكنك استخدامه لإرسال واستلام الرسائل من وإلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك، وعرض نتائج الاختبارات، والاطلاع على تواریخ وأوقات المواجهات المقرونة لك، والمزيد غير ذلك. ويمكنك أيضًا دعوة مقدم الرعاية الخاصة بك لإنشاء حسابه الخاص حتى يكون بوسعيه الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالرعاية المقدمة لك.

إذا لم يكن لديك حساب MyMSK، فيرجى إنشاء حساب على الموقع my.mskcc.org. يمكنك الحصول على معرف تسجيل من خلال الاتصال برقم 646-227-2593 أو بعيادة طبيبك.

شاهد *How to Enroll in MyMSK: Memorial Sloan Kettering's Patient Portal* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/how-enroll-mymsk-patient-portal) لمعرفة المزيد. كما يمكنك الاتصال بمكتب مساعدة MyMSK عن طريق إرسال بريد إلكتروني mymsk@mskcc.org أو الاتصال برقم 800-248-0593.

نبذة عن قائمة المرجعية لأهداف الخروج من المستشفى على حساب MyMSK

بعد الجراحة، ستُركز على التعافي بالشكل الذي يتيح لك مغادرة المستشفى. سُترسل القائمة المرجعية لأهداف الخروج من المستشفى إلى حسابك على MyMSK لمساعدتك في تتبع مستوى تقدمك.

يمكنك استخدام القائمة المرجعية لأهداف الخروج من المستشفى على حساب MyMSK للتعرف على الأهداف التي يجب عليك تحقيقها قبل مغادرة المستشفى. يمكنك أيضًا تحديث مستوى تقدمك على مدار اليوم. وستُرسل تحديثات التنبيهات إلى فريق الجراحة الخاص بك بشأن مستوى تقدمك.

لمعرفة المزيد، اقرأ *Frequently Asked Questions About the MyMSK Goals to Discharge Checklist* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-mymsk-goals-discharge-checklist).

نبذة عن التعافي المحسّن بعد الجراحة

التعافي المحسّن بعد الجراحة هو برنامج يهدف لمساعدتك على التحسن بشكل أسرع بعد الجراحة. وفي إطار هذا البرنامج، يكون من المهم الالتزام بعدة أمور قبل وبعد الجراحة. قبل الجراحة، تأكد أنك مستعد للقيام بالأمور التالية:

- اقرأ هذا الدليل. سيساعدك هذا في معرفة ما يمكن أن تتوقعه قبل الجراحة وأثنائها وبعدها. إذا كانت لديك أسئلة، فقم بتدوينها. يمكنك أن تسأل مقدم الرعاية الصحية خلال موعدك التالي، أو يمكنك الاتصال بمكتبه.

- مرس التمرين الرياضية واتبع نظاماً غذائياً صحيّاً. حيث يسّعد هذا جسمك على الاستعداد للجراحة.

بعد الجراحة، عزّز قدرتك على التعافي بسرعة أكبر عن طريق القيام بالأمور التالية:

- اقرأ مسر التعافي الخاص بك. وهو عبارة عن مورد تعليمي مكتوب يعطيك إياه مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. وهو يحدد أهدافاً للتعافي ويساعدك في معرفة ما يجب أن تفعله وتتوقعه كل يوم أثناء فترة التعافي.
- ابدأ الحركة بمجرد أن تستطيع ذلك. فبمجرد أن تنهض من السرير وتحرك أو تحبو أو تمشي على قدميك، ستمكن من العودة لممارسة أنشطتك المعتادة بسرعة أكبر.

اختبار قبل الجراحة

سيتم تحديد موعد لك لإجراء اختبار قبل الجراحة (PST) أو اختبار قبل الجراحة للأطفال (PPST) قبل الخضوع للجراحة. ستتولى عيادة الجراح تذكيرك بتاريخ ووقت ومكان الموعد. يمكنك تناول الطعام وتناول دوائلك (أدوية) المعتمد في اليوم المحدد للموعد.

من المفيد إحضار الأشياء التالية في موعد الفحص:

- جميع الأدوية التي تتناولها، وتشمل الأدوية الموصوفة وتلك التي تُصرف بدون وصفة طبية، إلى جانب أي لصقات وكريمات.
- نتائج أي فحوصات طبية أجريت خارج MSK خلال العام الماضي، إن كانت لديك. ومن بين الأمثلة عليهـ نتائج اختبار إجهـد القلب، أو تخطيط صدى القلب، أو فحص دوبرل للشرايين السباتية.
- أسمـء وأرقام هواتف مقدمي الرعاية الصحية لك.

ستلتقي بموفـر مـراسـة متقدمة خلال موعد اختبارـ ما قبل الجراحة. وهو يعمل بشكل وثيق مع فريق الجراحة.

سيراجع موفـر مـراسـة المتقدمة سجلـك الطبي والجراحي معـكـ. وقد تخضع لفحوصـات معـينة لوضع خطة الرعاية المناسبة لكـ، مثلـ:

- مخطط كهـرـية القـلـب لـفـحـص نـظـم قـلـبـكـ
- أـشـعـة سـيـنـيـة عـلـى الصـدـرـ
- اختـبارـات الدـمـ

قد يوصي موفر المـرسـة المتقدمة بعرضك على مقدمي رعاية صحية آخرين. وسيتحدث معك أيضاً بشأن الدواء (الأدوية) الذي ستتناوله صباح يوم الجراحة.

فريق تخفيف الألم والرعاية التلطيفية للأطفال (PACT)

يتكون فريق تخفيف الألم والرعاية التلطيفية للأطفال من أطباء وموظفي مـرسـة متقدمة. نقدم الدعم للأطفال والعائلات التي تواجه أمراض خطيرة في مركز ميموريال سلون كيترينج للأطفال (MSK Kids).

وهدف الرعاية التلطيفية هو مسـعدـتك أنت وعائلتك أثناء فترة العلاج. يمكن أن يـسعـدـ فـريقـ تـخفـيفـ الألمـ والـرعاـيةـ التـلطـيفـيـةـ لـلـأـطـفـالـ فـيـ التـغلـبـ عـلـىـ المشـكـلاتـ الـجـسـديـةـ وـالـعـقـلـيـةـ وـالـاجـتمـعـيـةـ وـالـنـفـسـيـةـ.ـ نـسـتـطـيعـ مـسـعدـتكـ بـصـرـفـ النـظـرـ عـنـ عـمـرـكـ أوـ مـرـحـلـةـ الـمـرـضـ لـدـيـكـ.ـ وـيـمـكـنـنـاـ أـيـضاـ مـدـ يـدـ الـعـونـ لـكـ سـوـاءـ كـنـتـ تـتـلـقـيـ الرـعـاـيةـ فـيـ الـمـسـتـشـفـىـ أـوـ فـيـ الـعـيـادـاتـ الـخـارـجـيـةـ.ـ الرـعـاـيةـ التـلطـيفـيـةـ مـهـمـةـ وـمـفـيـدةـ لـلـجـمـيـعـ.

يـحـترـمـ فـرـيقـ تـخفـيفـ الـأـلمـ وـالـرـعـاـيةـ التـلطـيفـيـةـ لـلـأـطـفـالـ اـخـتـيـارـاتـكـ وـقـيـمـكـ وـمـعـقـدـاتـكـ.ـ نـوـصـيـكـ أـنـتـ وـأـفـرـادـ عـائـلـتـكـ بـأـخـذـ خـطـوـاتـ إـيجـابـيـةـ لـاتـخـاذـ الـقـرـاراتـ الـمـتـعـلـقـةـ بـأـهـدـافـكـ وـخـطـطـ الرـعـاـيةـ الـخـاصـةـ بـكـ.ـ وـسـتـنـتـعـونـ مـعـ جـمـيـعـ أـعـضـاءـ فـرـيقـ الرـعـاـيةـ الـخـاصـ بـكـ.ـ وـنـهـدـفـ لـلـتـأـكـدـ مـنـ حـصـولـكـ أـنـتـ وـأـفـرـادـ عـائـلـتـكـ عـلـىـ الدـعـمـ الـمـطـلـوبـ لـعـيـشـ أـفـضـلـ حـيـاةـ مـمـكـنةـ.

الرعاية الطبية التكمالية

تسـعـدـكـ خـدـمـاتـ الرـعـاـيةـ الطـبـيـةـ التـكـامـلـيـةـ فـيـ مـرـكـزـ مـيمـوريـالـ سـلوـنـ كـيـتـريـنجـ (MSK)ـ عـلـىـ الـاسـتـرـخـاءـ وـتـخـفـيفـ الشـعـورـ بـعـدـ الـرـاحـةـ،ـ وـتـعـمـلـ عـلـىـ تـحـسـينـ صـحـتـكـ وـعـافـيـتكـ بـوـجـهـ عـامـ،ـ لـدـيـنـاـ مـتـخـصـصـونـ مـدـرـبـونـ وـمـؤـهـلـونـ فـيـ الـمـهـرـسـاتـ الـصـحـيـةـ التـكـامـلـيـةـ مـثـلـ:

- العلاج بالتدليل
- العلاج بالموسيقى
- العلاج بالرقص
- اليوجا
- التأمل
- اللياقة العقلية والبدنية
- العلاج بالإبر الصينية

ستـتـحـدـثـ مـعـ مـتـخـصـصـ فـيـ الـطـبـ التـكـامـلـيـ.ـ وـسـيـنـاقـشـ مـعـكـ خـدـمـاتـ الـطـبـ التـكـامـلـيـ الـمـتـاحـةـ فـيـ مـرـكـزـ مـيمـوريـالـ سـلوـنـ كـيـتـريـنجـ (MSK).ـ وـسـيـتـحـدـثـ مـعـكـ أـيـضاـ بـشـأنـ:

- الأنواع المختلفة لتقنيات الطب التكميلي والشمولي.
 - كيفية الاستفادة من هذه العلاجات خلال مدة إقامتك.
 - كيف تساعدك أنت وعائلتك قبل الجراحة وخلال فترة التعافي.

إعداد جسمك للجراحة

يمكنك التعافي بشكل أسرع وأسهل إذا قمت بإعداد جسمك ليكون في أفضل حالة ممكناً قبل الجراحة. يضم هذا القسم أمثلة عن الأنشطة التي يمكنك ممارستها لإعداد جسمك للجراحة. وسيساعدك فريق الرعاية في اتخاذ القرار بشأن الأنشطة

ممارسة تمارين التنفس والسعال

مَرِسْ تَمَرِينِ أَخْذِ أَنفَاسِ عُمَيقَةٍ وَالسُّعَالِ قَبْلَ الْجَرَاحَةِ. وَيُمْكِنُكَ الْقِيَامُ بِذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ:

- المشي أو اللعب.
 - نفح الواقع أو نفح منديل ورقي في الهواء.
 - استخدام مقياس التنفس المحقق إذا أعطاك فريق الرعاية واحداً.

أكثر من الحركة واحرص على زيادة مستوى نشاطك

ـ ول مـرة النشاط البدني كل يوم. ومن بين الأمثلة على ذلك المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة. يقدم مركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) فصول مجانية عبر الإنترنـت لجميع الأعـمـر تسـعدك في زيادة معدل نشاطك. اطلب من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الحصول على مزيد من المعلومات.

مارس التأمل واليقطة

يمكنك أيضًا ممارسة تمرين التنفس اليقظ والتأمل والحركة والتدليك وأسلوب العلاج بالإبر التي تمنحك الدعم خلال فترة استعدادك للجراحة.

شاهد مقاطع الفيديو لخدمة الرعاية الطبية التكاملية الخاصة بنا، والتي تسعدك في العثور على الأنشطة المناسبة لإضافتها إلى أنشطتك الاعتيادية قبل الجراحة. تفضل بزيارة الموقع www.msk.org/integrative-medicine-multimedia للعثور على مقاطع الفيديو. يمكنك أيضًا زيارة الموقع www.msk.org/meditation لمشاهدة مقاطع فيديو عن التأمل الموجّه، يقدمها خبراء متخصصون في اللياقة العقلية والبدنية.

اتباع نظام غذائي صحي

يمكنك مناقشة كيفية الاستعداد للجراحة مع أحد أخصائي التغذية السريرية بمركز ميموريال سلون كيترینج للأطفال. يمكنك تعلم كيفية التأكد من حصولك على أفضل تغذية ممكنة.

إذا كنت تتلقى علاجات السرطان الأخرى قبل الجراحة، فقد تسبب في تغيير حسّة التذوق لديك وفقدان الشهية إلى جانب صعوبة في الهضم. وقد يؤدي ذلك لصعوبة تناول الكمية الكافية من الطعام، مما يؤدي بدوره إلى فقدان الوزن. يمكن أن يتبعون معك أخصائي التغذية السريرية للأطفال مرضى العيادات الخارجية في مركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) لوضع خطة تسعد في مواجهة صعوبات تناول الطعام.

ومن المفيد أيضًا اتباع التوجيهات العامة التالية:

- تناول وجبات صغيرة بعدد أكبر. فيمكنك على سبيل المثال تناول نصف وجبة كل ساعتين أو ساعتين. حاول أن تتناول 6 إلى 8 وجبات صغيرة يومياً بدلاً من 3 وجبات كبيرة.
 - ضع جدول مواعيد للوجبات واحرص على اتباعه. لا تنتظر حتى تشعر بالجوع. ضع جدول المواعيد في مكان واضح للجميع.
 - احتفظ بطعامك المفضل في المنزل بحيث يمكنك الوصول إليه بسهولة.
 - اشتري الأطعمة ذات الحصة الواحدة والتي يمكنك تناولها بسهولة، مثل عصائر الزبادي القابلة للشرب أو أصبع الجبن.
 - احرص على طهي الوجبات على دفعات بحيث يتبقى بعضها لتناوله في وقت لاحق.
 - احتفظ بوجبة واحدة إضافية في ثلاجتك لليوم التالي، وليس بعد ذلك.
 - وقم بتجميد الوجبات الأخرى الإضافية. وعندما تكون مستعداً لتناول الوجبة، قم بإذابتها في الثلاجة أو الميكروويف وليس على طاولة المطبخ. ثم أعد تسخينها حتى يصدر منها البخار.
 - أضف العديد من المجموعات الغذائية وأنواع الطعام إلى نظامك الغذائي ما لم يمنعك الطبيب أو أخصائي التغذية السريرية من ذلك.
 - قد يكون الشرب أحياناً أسهل من تناول الطعام. حاول الحصول على المزيد من السعرات الحرارية من المشروبات عوضاً عن السوائل الصلبة. على سبيل المثال، تناول مخفوق الحليب أو المكمّلات الغذائية مثل Pediasure® أو Carnation Breakfast Essentials®.
 - اجعل تجربة تناول الطعام ممتعة وخالية من أي توتر. جرب تناول الطعام في أوقات الوجبات العائلية أو الوجبات الخفيفة الجماعية مع أفراد العائلة.
 - اعتذر أن التغذية تحظر ، بنفس ، أهمية الأدوية.

تذكر اختيار الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والغنية بالبروتين. استشر أخصائي التغذية السريرية بمركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) للأطفال بشأن أنساب الأطعمة بناءً على أطعمتك المفضلة أو أنهـط تناوا ، الوجبات الخاصة بك.

تناول مشروبات غنية بالكريوهيدرات في صباح يوم الجراحة.

سيقدم لك أحد مقدمي الرعاية الصحية زجاجة Preop® CF أو Ensure® قبل الجراحة لتناوله في صباح يوم الجراحة. وهي مشروبات غنية بالكريوهيدرات تخفف الشعور بالإجهاد الناجم عن الصيام (الامتناع عن تناول الطعام) قبل الجراحة. وهي تساعد في التئام الجروح والتعافي بعد الجراحة بشكل أفضل.

التقى متخصصي الرعاية الصحية الآخرين عند اللزوم.

يضم مركز MSK العديد من متخصصي الرعاية الصحية الذين يمكنهم مساعدتك قبل تلقي علاج السرطان وأثناءه وبعده.

- فيما يقدم الاختصاصيون الاجتماعيون المساعدة بشأن الجوانب العاطفية والاجتماعية والجسدية المرتبطة بتشخيص الإصابة بالسرطان. يقدم اختصاصيون الاجتماعيون المشورة والمساعدة العملية. وهم يساعدون العائلات في التعامل مع مرض طفلهم ويعملون على تحسين التواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء ومشاركة المعلومات حول الموارد المجتمعية إلى جانب المساعدة في التأقلم على العلاج الطبي.
- اختصاصيو حياة الأطفال هم متخصصون مدربون خبراء في النمو والتطور البشري. إذا كنت تشعر بالقلق أو التوتر بشأن الجراحة التي ستتعرض لها، فيمكنهم مساعدتك في إيجاد الطرق التي تمنحك الراحة والاسترخاء. يتميز اختصاصيو حياة الأطفال في مركز MSK بخلفيات واهتمامات عديدة في جوانب مختلفة مثل التعليم وعلم النفس والفنون الجميلة والعلاج بالفن. وتتوفر مجموعة المهرات والمؤهلات الكبيرة لدينا مجتمعةً باقة متكاملة من خدمات حياة الأطفال التي تعلم على تثقيف وتمكين المرضى وعائلاتهم خلال مرحلة المرض.
- يمكن للمستشارين والمعالجين مقابلتك أنت وأفراد عائلتك وتقديم المشورة بشأن المشكلات العاطفية المرتبطة بالتعامل مع مرض السرطان. ويضم مركز تقديم المشورة بمركز MSK أيضًا مجموعات دعم تعقد الاجتماعات بشكل دوري.

قد يعرض مقدم الرعاية الصحية إحالتك إلى هذه الخدمات. ويمكنك أيضًا طلب الإحالة إذا كنت مهتمًا بذلك.

تحدث مع الأخصائي الاجتماعي بشأن السكن إذا لزم الأمر ذلك.

توفر منشأة Ronald McDonald House مسكن مؤقتة خارج المدينة للأطفال مرضى السرطان وعائلاتهم.

ويجري مركز MSK أيضًا الترتيبات مع العديد من الفنادق والمنشآت السكنية المحلية التي قد تقدم لك تخفيضات خاصة. ويوسع الاختصاصي الاجتماعي مناقشة الخيارات المتاحة لك ومساعدتك في إجراء الحجوزات. كما يمكنك الاتصال برقم 212-639-8315 للتحدث مع منسق خدمات الأطفال المرضى.

استكمال بيانات نموذج وكيل الرعاية الصحية عند اللزوم

إذا كنت في عمر 18 عاماً أو أكثر ولم تكن قد استكملت بالفعل بيانات نموذج وكيل الرعاية الصحية، فإننا نوصيك بذلك الآن. وإذا كنت قد استكملت واحداً بالفعل، أو كانت لديك أي توجيهات مسبقة أخرى، فأحضرها معك في الموعد التالي.

نموذج وكيل الرعاية الصحية هو مستند قانوني. وهو يحدد الشخص الذي تريد منه التحدث بالنيابة عنك إذا لم تتمكن من التواصل بنفسك. ويُعرف هذا الشخص بوكيل الرعاية الصحية.

- للاطلاع على معلومات حول وكلاء الرعاية الصحية والتوجيهات الأخرى المسبقة، اقرأ *Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning).
- للاطلاع على معلومات حول الأضطلاع بدور وكيل الرعاية الصحية، اقرأ *How to Be a Health Care Agent* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent).

تحدث مع أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أسئلة حول ملء بيانات نموذج وكيل الرعاية الصحية.

7 أيام قبل جراحتك

اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن تناول الأسبيرين

قد يسبب الأسبيرين نزيفاً. إذا كنت تتناول الأسبيرين أو دواءً يحتوي على الأسبيرين، فقد تحتاج إلى تغيير جرعتك أو التوقف عن تناوله 7 أيام قبل الجراحة الخاصة بك. اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. لا تتوقف عن تناول الأسبيرين إلا إذا طلب منك ذلك.

لمعرفة المزيد، اقرأ *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids).

توقف عن تناول فيتامين هـ والفيتامينات المتعددة والعلاجات العشبية والمكملات الغذائية الأخرى

قد يسبب فيتامين هـ والفيتامينات المتعددة والعلاجات العشبية وغيرها من المكملات الغذائية الأخرى النزيف. فتوقف عن تناوله قبل 7 أيام من الجراحة. إذا أعطيتك مقدم الرعاية الصحية تعليمات أخرى، فاحرص على اتباعها بدلاً من تلك التعليمات.

لمعرفة المزيد، اقرأ *Herbal Remedies and Cancer Treatment* (www.mskcc.org/cancer-herbal-remedies-and-cancer-treatment).

اصطحاب صور الأشعة عند اللزوم

سيتعين عليك اصطحاب صور الأشعة لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية في التخطيط للجراحة الخاصة بك. وإذا كنت قد أجريتها في مكان آخر بخلاف مركز MSK، فقد يطلب منك مقدم الرعاية الصحية إحضار القرص الذي يضم نسخاً من صور الأشعة عند حضور أحد المواجهات المقررة.

يومان قبل جراحتك

التوقف عن تناول الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID)، مثل ايبيوبروفين (أدوليل® وموترین®) ونابروكسين (أليف®)، قد تسبب النزيف. فتوقف عن تناوله قبل يومين من الجراحة. إذا أعطاك مقدم الرعاية الصحية تعليمات أخرى، فاحرص على اتباعه بدلاً من تلك التعليمات.

How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)

يوم واحد قبل جراحتك

سجل الوقت المحدد لجراحتك

سيتصل بك أحد العاملين في مكتب الإدخال للمستشفى بعد الساعة 2 مساءً في اليوم السابق للجراحة. فإذا كان موعد جراحتك مقرراً يوم الإثنين، فسيتصل بك يوم الجمعة السابق له. إذا لم تلتق أي مكلمة بحلول الساعة 4 عصراً، فاتصل برقم 7002-639-212.

سيخبرك أحد العاملين بموعده وصولك إلى المستشفى لإجراء الجراحة. وسيذكرك أيضاً بالموقع الذي ستتوجه إليه. للحصول على معلومات عن موقع مركز MSK، وتشمل الاتجاهات وخيارات إيقاف السيارة، تفضل بزيارة دليل المواقع الخاص بنا.

استحم أو اغتسل بمحلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% المطهر والمنظف للجلد (مثل محلول هيبكلينس [Hibiclens®]).

محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% هو منظف للبشرة يقتل الجراثيم لمدة 24 ساعة بعد استخدامه. سيساعد الاستحمام أو الاغتسال به قبل الجراحة على تقليل خطر الإصابة بالعدوى بعد الجراحة.

سيعطيك مقدم الرعاية الصحية زجاجة محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% خلال أحد المواجهات المقررة لك قبل الجراحة. ويمكنك شراؤها من الصيدلية المحلية دون الحاجة إلى وصفة طبية. استحم أو

اغتسل به في الليلة السابقة للجراحة أو صباح يوم الجراحة.

1. استخدم الشامبو المعتمد لديك لغسل شعرك. اشطف رأسك جيداً.
2. استخدم الصابون المعتمد لديك لغسل وجهك والمنطقة التناسلية. اشطف جسمك جيداً بالماء الدافئ.
3. افتح زجاجة محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4%. صب القليل منه في يدك أو في قطعة قماش نظيفة. وتجنب تخفيفه (خلطه بالماء).
4. ابتعد عن تيار الدش أو قف في حوض الاستحمام. افرك محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% برفق على جسمك من رقبتك إلى قدميك. لا تضعيه على وجهك أو منطقتك التناسلية.
5. اشطف محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% بالماء الدافئ.

بعد الاستحمام أو الاغتسال، جفف جسمك بمنشفة نظيفة. ارتدي بيجامة أو ملابس نظيفة. تجنب وضع أي غسول أو كريم أو مزيل عرق أو مكياج أو بودرة أو عطر أو كولونيا.

تعليمات تناول الطعام والشراب قبل الجراحة الخاصة بك

- توقف عن تناول الطعام قبل 8 ساعات من موعد وصولك المحدد.
 - قد يطلب منك مقدم الرعاية الصحية التوقف عن تناول الطعام قبل هذا الوقت. وفي هذه الحالة، يتبعين عليك اتباع تعليماته.
 - لا تتناول أي طعام أو مشروبات فيما عدا السوائل الصافية التالية قبل 8 ساعات من موعد وصولك:
 - الماء.
 - الصودا.
 - العصائر الصافية، مثل عصير الليموناده والتفاح والتوت البري. تجنب تناول عصير البرتقال أو العصائر ذات اللب.
 - القهوة السوداء أو الشاي (بدون أي نوع من الحليب أو مبيض القهوة).
 - المشروبات الرياضية، مثل [®]Gatorade.
 - مشروب [®]Ensure أو ClearFast قبل الجراحة.
 - الجيلاتين، مثل [®]O-Jell.
- يمكنك تناولها حتى ساعتين قبل موعد وصولك.

صباح يوم جراحتك

تعليمات الشرب قبل الجراحة الخاصة بك

يمكنك الاستمرار في تناول الحليب الصناعي أو حليب الثدي والسوائل الشفافة بعد منتصف الليل. اتبع التعليمات الواردة في الجدول التالي. لا بأس بغسل أسنانك وتناول أدويتك مع رشبة ماء صغيرة.

متى يجب التوقف	الكمية التي يمكن شربها	نوع السائل
يجب التوقف عن شرب الحليب الصناعي قبل 6 ساعات من موعد الوصول المحدد.	أي كمية	الحليب الصناعي
يجب إيقاف الرضاعة الطبيعية قبل 4 ساعات من وقت الوصول المحدد.	أي كمية	حليب الثدي
يجب إيقاف تناول السوائل الصافية قبل ساعتين من وقت الوصول المحدد.	<ul style="list-style-type: none"> • الأطفال في عمر 0 إلى 3 سنوات: حتى 4 أونصات (120 ملي لتر) • الأطفال في عمر 4 إلى 8 سنوات: حتى 6 أونصات (180 ملي لتر) • الأطفال في عمر 9 إلى 13 سنة: حتى 8 أونصات (240 ملي لتر) • الأطفال في عمر 13 سنة وأكثر: حتى 12 أونصة (360 ملي لتر) 	السوائل الصافية، مثل الماء وعصائر الفاكهة بدون اللب، والمشروبات الغازية، والشاي بدون حليب، والقهوة بدون حليب

تعليمات الشرب قبل الجراحة الخاصة بك

تناول مشروب الكريوهيدرات الذي قدمه لك مقدم الرعاية الصحية عن آخره قبل ساعتين من موعد وصولك المحدد. سيخبرك مقدم الرعاية الصحية بالكمية التي يمكنك تناولها.



لا تتناول أي مشروب قبل ساعتين من موعد وصولك المحدد. ويشمل ذلك الحليب الصناعي وحليب الثدي والماء وأي سوائل صافية أخرى.

تناول الأدوية الخاصة بك حسب التعليمات

سيخبرك أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك بالأدوية التي ستتناولها صباح يوم الجراحة. فتناول تلك الأدوية فقط مع رشبة من الماء. وتبعاً للأدوية التي تتناولها عدداً، فإنه قد يُسمح لك بتناول كل الأدوية التي تتناولها بشكل معتاد في الصباح أو بعضها أو لا يُسمح لك بتناول أي منها.

نقاط يجب تذكرها

- إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فارتد نظاراتك بدلاً منها. قد يؤدي ارتداء العدسات الاصقة أثناء الجراحة إلى الإضرار بعينيك.

ما ينبغي إحضاره

- أحد كائنات الراحة (مثل بطانية الأمان أو الدمية).
 - جهاز إلكتروني محمول واحد أو اثنين (مثلاً الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي) والشاحن الخاص به.
 - جميع الأدوية التي تتناولها، وتشمل الأدوية الموصوفة وتلك التي تُصرف بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، إلى جانب أي لصقات وكريمات.
 - مقياس التنفس المحفّز إذا كنت تستخدم واحداً.
 - نموذج وكيل الرعاية الصحية الخاص بك والتوجيهات المسبقة الأخرى، إذا قمت بإكماله.
 - هذا الدليل .. سيسخدمه فريق الرعاية الصحية لعلامك ب كيفية الاعتناء بنفسك بعد الراحة.

بمفرد دخولك المستشفى

عندما تتجه إلى المستشفى، استقل المصعد B إلى الطابق السادس. قم بتسجيل الوصول على المكتب الموجود في غرفة الانتظار بمركزرعاية م قبل الجراحة (PSC).

سيطلب منك العديد من أعضاء فريق الرعاية الصحية ذكر اسمك وتاريخ ميلادك وتهجي حروفهم. وهذا الأمر حفاظاً على سلامتك. فقد يكون هناك أشخاص لهم أسماء مماثلة سيخضعون للجراحة في نفس اليوم.

عندما يحين وقت تغيير الملابس لإجراء الجراحة، سترتدين سرير المرضى، ورداء وجوارب غير قابلة للانزلاق.

مقالات الممرض

ستقابل الممرضة قبل الجراحة. أخبرها بجرعة أي أدوية تناولتهاً بعد منتصف الليل (الساعة 12 منتصف الليل) والوقت الذي تناولتهاً فيه. واحرص على ذكر الأدوية الموصوفة وتلك التي تُصرف بدون وصفة طيبة، إلى جانب أي لصقات وكريمة.

قد تدخل الممرضة قُنِيَّةً وribidie (IV) في أحد أوردة ذراعك أو يدك غالباً. وإذا لم تدخل الممرضة قُنِيَّةً وribidie، فستول، طب السخدر فعل ذلك في غرفة العمليات.

مقالة طب التخدير

ستقابل أيضًا طبيب التخدير قبل الجراحة. وسيقوم بهـ يلي:

- مراجعة سجلك الطبي معك.
- سؤالك عمـ إذا كنت قد واجهت أية مشكلات بخصوص التخدير فيمـ مضـ. وهذا يشمل الغثيان (الشعور بالرغبة في القيء) أو الألم.
- التحدث معك بشأن راحتـك وسلامـتك أثناء الجراحة الخاصة بكـ.
- التحدث معك بشأن نوع التخدير الذي ستلقـاهـ.
- الرد على أسئلـتكـ بشأن التخـديرـ.

الاستعداد للجراحة

وعندـمـ يحين وقت الجـراـحةـ، ستـتـوجهـ إـلـىـ غـرـفـةـ الـعـمـلـيـاتـ إـمـ سـيـرـاـ علىـ قـدـمـيـكـ أوـ سـيـأـخـذـكـ إـلـيـهــ أحـدـ أـعـضـاءـ الفـرـيقـ عـلـىـ نـقـالـةـ. وسيـسـعدـكـ أحـدـ أـعـضـاءـ فـرـيقـ غـرـفـةـ الـعـمـلـيـاتـ عـلـىـ اـعـتـلـاءـ سـرـيرـ الـعـمـلـيـةـ.

بـمـجـرـدـ أـنـ تـشـعـرـ بـالـرـاحـةـ، سيـقـومـ طـبـيـبـ التـخـدـيرـ بـتـخـدـيرـكـ وـسـتـخـلـدـ إـلـىـ النـوـمـ. سـتـحـصـلـ أـيـضـاـ عـلـىـ السـوـاـئـلـ عـنـ طـرـيـقـ الـمـنـفـذـ الـوـرـيـديـ الـمـغـرـوسـ أـوـ الـقـسـطـرـةـ الـوـرـيـدـيـةـ الـمـرـكـزـيـةـ أـوـ الـقـنـيـيـةـ الـوـرـيـدـيـةـ (IV)ـ أـنـثـاءـ الـجـراـحةـ وـبـعـدـهــ.

أـنـثـاءـ الـجـراـحةـ

بعدـ أنـ يـتـمـ تـخـدـيرـكـ تمـمـاـ، سـيـوـضـعـ أـنـبـوبـ تـنـفـسـ دـاـخـلـ مـجـرـىـ التـنـفـسـ لـمـسـعـدـتـكـ عـلـىـ التـنـفـسـ. وسيـتـمـ أـيـضـاـ تـرـكـيـبـ قـسـطـرـةـ بـولـيـةـ (Foley)ـ لـنـزـحـ الـبـولـ مـنـ مـثـانـتـكـ.

بعدـ الـإـنـتـهـاءـ مـنـ الـجـراـحةـ، سـيـتـمـ إـغـلاقـ الشـقـ (الـشـقـوقـ)ـ الـجـراـحيـ بـالـغـرـزـ الـجـراـحـيـ (الـخـيـاطـةـ)ـ أـوـ مـادـةـ جـراـحـيـ لـاصـقـةـ (Steri-Strips™)ـ أوـ Dernabond®ـ (قطـعـ رـفـيـعـةـ مـنـ شـرـيطـ لـاصـقـ). وـسـتـتـمـ تـغـطـيـتـهــ أـيـضـاـ بـضـمـمـةــ.

بعدـ الـجـراـحةـ الصـدـرـيـةـ الـبـطـنـيـةـ الـخـاصـةـ بـكـ

ستـتـوضـحـ لـكـ الـمـعـلـومـاتـ الـوـارـدـةـ فـيـ هـذـاـ الـقـسـمـ مـمـكـنـكـ تـوـقـعـهـ بـعـدـ الـجـراـحةـ، أـنـثـاءـ الـإـقـامـةـ فـيـ الـمـسـتـشـفـىـ وـبـعـدـ مـغـارـتـهــ. سـتـتـعـلـمـ كـيـفـيـةـ التـعـافـيـ بـشـكـلـ آـمـنـ مـنـ الـجـراـحةـ.

أـنـثـاءـ قـرـاءـةـ هـذـاـ الـقـسـمـ، دـوـّـنـيـ أيـ أـسـئـلـةـ تـرـيـدـيـنـ الـاسـتـفـسـرـ عـنـهــ مـنـ مـقـدـمـ الرـعـيـةـ الـصـحـيـةـ.

فيـ وـحدـةـ الرـعـيـةـ الـمـركـزـةـ لـلـأـطـفالـ (PICU)ـ أـوـ وـحدـةـ رـعـيـةـ ماـ بـعـدـ التـخـدـيرـ (PACU)

عـنـدـمـ تـسـتـيقـظـ بـعـدـ الـجـراـحةـ، سـتـكـونـ فـيـ وـحدـةـ الرـعـيـةـ الـمـركـزـةـ لـلـأـطـفالـ (PICU)ـ أـوـ وـحدـةـ رـعـيـةـ مـمـ بـعـدـ

التخدير (PACU). إذا كنت في وحدة رعاية ما بعد التخدير، فسينقلك أحد أعضاء الطاقم الطبي إلى وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمجرد توافر سرير جاهز.

وستراقب ممرضة درجة حرارتكم ونبضكم وضغط دمكم ومستويات الأكسجين لديك. وربما يظل أنبوب التنفس مركباً لديك. إلا، فقد تحصل على الأكسجين عن طريق أنبوب رفيع يستقر أسفل أنفك أو قناع يغطي أنفك وفمك.

الدواء المسكن للألم

بعد الجراحة مباشرةً، سيتم إعطاؤك دواءً مسكنًا للألم عن طريق المنفذ الوريدي المغروس أو القسطرة الوريدية المركزية أو القنية الوريدية. وقد تحصل على دواء إضافي مسكن للألم عن طريق قسطرة الحيز فوق الجافية أو قسطرة العصب المحيطي (تخدير العصب). أبلغ مقدمي الرعاية الصحية إذا شعرت بألم.

سيكون بوسنك التحكم في الدواء المسكن للألم باستخدام زر يسمى جهاز التحكم الذاتي بمسكن الألم (PCA). لمزيد من المعلومات، اقرأ المصدر جهاز التحكم الذاتي بمسكن الألم (PCA) (www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/patient-controlled-analgesia-pca).

الأنباب وأجهزة النزح

سيتم تركيب واحد أو أكثر من الأنابيب وأجهزة النزح التالية لك بعد الجراحة. سيخبرك فريق الرعاية بما يمكنك توقعه.

- أنبوب صدر. يساعد في تصريف الهواء ونزح الماء من المنطقة المحيطة برئتك.
- أجهزة نزح السوائل من البطن. تساعد في نزح السوائل من بطنك. وهي تبرز من الشق الجراحي ويتم تثبيتها بالغرز في مكانها.
- أنبوب تغذية. يستخدم لإعطاءك العناصر الغذائية.
- أنبوب تنفس. يساعدك على التنفس.
- أنبوب شرياني. يتبع ضغط الدم لديك.
- القسطرة البولية تُستخدم هذه القسطرة لنزح البول من المثانة. وهذا يساعد فريق الرعاية الصحية لديك في تتبع كمية البول التي ينتجه جسمك.

سيعتني مقدمو الرعاية الصحية بالأنباب وأجهزة النزح أثناء إقامتك في المستشفى. ويتم نزع أي أنابيب أو أجهزة نزح لدى معظم الأشخاص عندما يكونون مستعدين لمغادرة المستشفى. وسيظل لديك أنبوب أو جهاز نزح مركب عند مغادرتك، وسيعلمك مقدمو الرعاية الصحية كيفية الاعتناء به في المنزل.

وسيتأكدون أيضًا من حصولك على المستلزمات التي تحتاجها.

العلاج الطبيعي والمهني

إذا كنت تحتاج إلى المساعدة بشأن الحركة أو الحبو أو المشي على قدميك أو اللعب أو أداء مهم الرعاية الذاتية بعد الجراحة، فقد يزورك اختصاصي علاج طبيعي أو علاج مهني أو قد يزورك كلًا هم.

- يمكن أن يساعدك اختصاصي العلاج الطبيعي في الحركة وأداء المهام بشكل أفضل بعد الجراحة. وهو يساعدك على استعادة القوة والاتزان وتنسيق الحركات المطلوب لفعل أشياء مثل الحبو والمشي وصعود الدرج واللعب وممارسة الرياضة.

- فيما يساعدك اختصاصي العلاج المهني في تحسين مهاراتك المطلوبة للقيام بالأنشطة اليومية المهمة. فهو يساعدك على مواجهة مشكلات بشأن مهم الرعاية الذاتية (مثل ارتداء ملابسك وغسل أسنانك)، إلى جانب أنشطة اللعب أو المهام المطلوبة للدراسة أو العمل.

وسيخبرك اختصاصي العلاج الطبيعي والمهني بعدد مرات أداء تمرين العلاج الطبيعي أو العلاج المهني أو كليهما. للحصول على المزيد من المعلومات، اقرأ المورد *Staying Active Before and After Surgery for Pediatric Patients* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/staying-active-peds).

الانتقال إلى غرفة المستشفى

تعتمد مدة إقامتك في وحدة الرعاية المركزية للأطفال على سرعة تعافيك. يقيم أغلب الأشخاص لمدة يوم واحد أو يومين. ستقيم في وحدة الرعاية المركزية للأطفال حتى:

- يتم نزع أنبوب التنفس والأنبوب الشرياني في دلة تركيبهما.
- تستطيع النهوض من السرير والحركة.
- تستطيع ممارسة تمرين التنفس (مثل استخدام مقياس التنفس المحفز أو العجلة الهوائية).
- إذا كانت علاماتك الحيوية في النطاق المقبول.

بمجرد أن تكون مستعدًا، سيصطحبك أحد أعضاء الفريق إلى غرفة المرضى الداخليين بالمستشفى.

في غرفة المستشفى

تتوقف المدة التي تقضيه في المستشفى بعد الجراحة على تعافيك وعلى خطة العلاج الفردية الخاصة بك. سيخبرك فريق الرعاية بما يمكنك توقعه.

عند انتقالك إلى غرفة المستشفى، ستلتقي بإحدى الممرضات التي تقدم لك الرعاية أثناء إقامتك في المستشفى. أثناء وجودك في المستشفى، سيعلمك مقدمو الرعاية الصحية بكيفية الاعتناء بنفسك

خلال فترة التعافي من الجراحة.

يمكنك تعزيز قدرتك على التعافي بشكل أسرع باتباع الخطوات التالية:

- اقرأ مسراً رئيسيًّا على الرئتين الخاص بك. سيقدم لك مقدم الرئيسيَّة الصحية مسراً يتضمن أهداف التعافي الخاصة بك، فإذا لم تكن قد حصلت على واحد بالفعل. وهو يساعدك في معرفة ما يجب أن تفعله وتتوقعه كل يوم أثناء فترة التعافي.
- ابدأ الحركة بمجرد أن تستطع ذلك. فبمجرد أن تنھض من السرير وتحريك أو تحبو أو تمشي على قدميك، ستتمكن من العودة لممارسة أنشطتك المعتادة بسرعة أكبر.
- مارس تمرين الرئتين. استخدم مقاييس التنفس المحقق أو العجلة الهوائية لمساعدة رئتيك على التمدد بالكامل. حيث يساعد ذلك في منع الإصابة بالالتهاب الرئوي (عدوى الرئة).
- مارس التمرين الرياضية. سيعملك اختصار العلاج الطبيعي والمهني بالأنشطة والتمرين التي تساعد في بناء قوتك.

يمكنك استخدام القائمة المرجعية لأهداف الخروج من المستشفى على حساب MyMSK لتبني مستوى تقدمك خلال مدة التعافي. للحصول على المزيد من المعلومات، اقرأ المورد *Frequently Asked Questions About the MyMSK Goals to Discharge Checklist* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-mymsk-goals-discharge-checklist).

وسيتبع فريق الرئيسيَّة الصحية كمية السوائل التي يتم نزعها من الأنابيب الصدر وجهاً زنزح السوائل من البطن لديك. وعندما تصبح كمية السوائل منخفضة بما يكفي، فسيزيلون الأنابيب أو جهاز النزح.

السيطرة على الألم

ستشعر ببعض الألم بعد الجراحة. وسيضع مقدم الرئيسيَّة الصحية خطة للسيطرة على الألم لمنحك أكبر قدر ممكن من الراحة.

- ستحصل أيضًا على الأدوية المسكينة للألم الأفيونية (المخدّرة) لمدة وجيزة لعلاج الألم بعد الجراحة. ستحصل على أقل جرعة من هذه الأدوية وتتناولها لأقصر مدة ممكنة مطلوبة.
- ستتلقي بعض الأنواع الأخرى للأدوية المسكينة للألم لمنحك الشعور بالراحة وحتى تستهلك جرعتين أقل من الدواء الأفيوني.
- وقد تحصل على التخدير في الحيز فوق الجافية أو تخدير العصب.

سيتحدث إليك فريق تخفيف الألم والرئيسيَّة التلطيفية للأطفال وطبيب التخدير الخاص بك بشأن خطة السيطرة على الألم الخاصة بك ويردون على أسئلتك.

وسيقوم مقدمو الرعاية الصحية بزيارتكم كل يوم للتأكد من السيطرة على الألم بشكل جيد قدر الإمكان. إذا كنت تعاني من الألم، فأخبر أحد مقدمي الرعاية الصحية بذلك. فمن المهم السيطرة على الألم حتى يكون بوسرك مدرسة تمارين التنفس والحركة. كما أن السيطرة على الألم تساعدك في التعافي بشكل أفضل.

ستحصل على وصفة طبية للأدوية الفموية المُسكنة للألم (التي يتم بلعها) قبل مغادرة المستشفى. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الأعراض الجانبية المحتملة ومتى تبدأ التحول إلى استخدام الأدوية المُسكنة للألم التي تُصرف بدون وصفة طبية. اصطحب الدواء الموصوف المُسكن للألم معك خلال زيارة المتابعة في العيادة.

السيطرة على الألم عن طريق الرعاية الطبية التكاملية

بوسع اختصاصيو الرعاية الطبية التكاملية تقديم الدعم لك إذا كنت تشعر بالألم بعد الجراحة. يمكننا مساعدتك في مدرسة التأمل واليقظة عن طريق تمارين التنفس والحركة القائمة على اليقظة واستخدام أسلوب التخييل الموجه. وقد يوفر التدليل والعلاج بالموسيقى بعض الراحة لك. يمكن اتباع الأسلوب المرحة عن طريق الرقص لتحسين حالتك المزاجية وتشتت انتباحك عن الألم. إذا كنت مهتماً بالسيطرة على الألم من خلال الرعاية الطبية التكاملية، فاسأله أحد أعضاء فريق الرعاية عن مستشار الرعاية الطبية التكاملية.

الحركة والمشي

تساعدك الحركة والمشي في تخفيف مخاطر حدوث الجلطات الدموية والالتهاب الرئوي. كما تساعدك في إخراج الريح وتسهيل حركة الأمعاء (التبز) مرة أخرى. يجب أن تتبرز قبل خروجك من المستشفى.

يمكنك الحركة من خلال المشي إلى الحوض أو المرحاض أو المشي في أرجاء الوحدة. ستساعدك الممرضة أو أخصائي العلاج الطبيعي أو أخصائي العلاج المهني على الحركة عند اللزوم. توفر أيضاً أنواع العلاج بالحركة القائمة على اليقظة، مثل العلاج بالرقص ومدرسة رياضة تاي تشي واليوغا. إذا كنت مهتماً بالعلاج بالحركة القائمة على اليقظة، فاسأله أحد أعضاء فريق الرعاية عن مستشار الرعاية الطبية التكاملية.

ممارسة تمارين الرئتين

يجدر بك مدرسة تمارين الرئتين حتى تتمددا بالكامل. حيث يساعد ذلك في منع الإصابة بالالتهاب الرئوي.

- استخدم مقياس التنفس المحفز أو العجلة الهوائية 10 مرات كل ساعة أثناء الاستيقاظ. لمزيد من المعلومات، اقرأ كيفية استخدام مقياس التنفس المحفز (www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer).

- مـرس تـرين السـعال والتنفس العميق. وسيعلمك أحد أعضاء فريق الرعاية بكيفية مـرسـتهـ. من الأفضل مـرسـة تلك التـرينـة مباشرةً بعد تناول الدواء المـسكن لـلـأـلمـ. ومن المـفـيد وضع وسـدة على الشـقـ الجـراحيـ أثناء مـرسـة التـرينـ.

يمكن لأحد مقدمي الرعاية الطبية التكميلية بمركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) مـسـعدـتكـ أيـضاـ في مـرسـةـ تـرينـ الرـئـتينـ من خـلـالـ تـوجـيهـكـ لـأسـلـيبـ التنـفـسـ أوـ الدـوـاءـ.

تناول الأطعمة والمشروبات

لن يكون بإمكانك تناول أي طعام أو مشروبات لمدة 3 أيام على الأقل بعد الجراحة. وستحصل على التغذية بالكامل عن طريق تركيبة غذائية سائلة تُعطى لك عبر أنبوب التغذية. وهذه التركيبة الغذائية سهلة الهضم ويستطيع الجسم امتصاصـهاـ بـسهـولةـ. وهي تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجـهـ جـسـمـكـ.

التغذية عن طريق الأنابيب بعد الجراحة

مـعـدـلـ التـغـذـيةـ عـبـرـ الأنـبـوبـ هوـ كـمـيـةـ التـرـكـيـبـةـ الغـذـائـيـةـ الـتـيـ تـحـصـلـ عـلـيـهـ عـنـ طـرـيـقـ أـنـبـوبـ التـغـذـيةـ كـلـ سـاعـةـ. وهي تـقـاسـ بـعـدـ وـحدـاتـ مـلـيـ لـتـرـ كـلـ سـاعـةـ.

جدول التغذية المستهدف هو معدل التغذية عبر الأنابيب وعدد الساعات التي تعطيك الكمية المناسبة من السعرات الحرارية والبروتين والسوائل.

وسيحسب خبير تغذية الأطفال المرضى الداخليين في مركز MSK جدول التغذية المستهدف الخاص بك بناءً على طولك وزنك. سيكون معدل تغذيتك عبر الأنابيب منخفضاً في البداية. وستتم زيادة معدل التغذية عبر الأنابيب ببطء حتى تصل إلى المعدل أو الجدول المستهدف.

ربما تستمر في الحصول على بعض التغذية عن طريق أنابيب التغذية بعد مغادرة المستشفى. وفي هذه الحالة، سيعلم خبير تغذية الأطفال المرضى الداخليين في مركز MSK مدير حـلـتكـ بالـتـرـكـيـبـةـ الغـذـائـيـةـ والمـسـتـلـزـمـاتـ الـتـيـ سـتـحـاجـهـ فـيـ المـنـزـلـ. وسيتعلـمـونـ مدـيرـ حـلـتكـ معـ إـحـدىـ شـرـكـاتـ الرـعـاـيةـ المـنـزـلـيةـ لإـرـسـالـ التـرـكـيـبـةـ الغـذـائـيـةـ الـتـيـ سـتـحـصـلـ عـلـيـهـ عـبـرـ أـنـبـوبـ التـغـذـيةـ فـضـلـاـ عـنـ المـسـتـلـزـمـاتـ المـطلـوبـةـ إـلـىـ مـنـزـلـكـ.

إذا كنت ستحصل على التغذية عبر الأنابيب بعد مغادرة المستشفى، فستتعلم كيفية استخدام مضخة التغذية عبر الأنابيب أثناء إقامتك في المستشفى. تأكد من استخدامها بشكل مريح قبل مغادرة المستشفى.

تناول الطعام بعد الجراحة

سيحدد لك فريق الجراحة الوقت حيث يمكنك البدء في تناول الطعام والمشروبات. ويكون غالباً بعد

بضعة أيام من الجراحة. ستبدأ أولاً بشرب السوائل فقط. وبعد ذلك، تبدأ تدريجياً في تناول الأطعمة الصلبة عندما تستعيد قدرتك على تناول كمية أكبر منه.

سيلتقيك خبير تغذية الأطفال المرضى الداخليين في مركز MSK للتحدث بشأن أنواع الطعام التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي بعد الجراحة. ومن الأفضل اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين حتى يحصل الجسم على العناصر الغذائية المطلوبة للتعافي بعد الجراحة بشكل أفضل. بعد أن تبدأ في تناول كمية أكبر من الأطعمة الصلبة، فسيتحدث إليك خبير تغذية الأطفال المرضى الداخليين في مركز MSK. وسيحدد لك أهدافاً لتناول الطعام ويناقش معك كمية السعرات الحرارية التي يمكنك تناولها لتقليل كمية التغذية عبر الأنابيب.

السيطرة على التغييرات في وظائف الأمعاء

يصاب بعض الأشخاص بالإسهال (براز رخو أو ملحي) أثناء إقامتهم في المستشفى بعد الجراحة. إذا كنت مصاباً بالإسهال، فسيساعدك فريق الرعاية الصحية في السيطرة عليه.

الاستحمام

اغسل وجهك وأسنانك وقم بتغيير ملابسك كل يوم. اطلب المساعدة من أحد مقدمي الرعاية الصحية عند اللزوم.

سيكون بإمكانك الاستحمام بمساعدة شخص آخر بعد مرور 48 ساعة (يومين) من نزع آخر أنبوب أو جهاز نزح.

الخضوع للعلاج الكيماوي

إذا كنت ستتلقى العلاج الكيماوي في إطار برنامج علاج السرطان، فقد تتلقى العلاج الكيماوي أثناء إقامتك في المستشفى. سيناقش معك فريق الرعاية الصحية ما يمكنه توقعه. إذا كان فريق الرعاية الأقرب إلى منزلك يدير برنامج خصوصك للعلاج الكيماوي، فسيتعاونون معهم فريق الرعاية الخاص بك في مركز MSK للتخطيط للعلاج الذي تلقاه وإدارته.

مغادرة المستشفى

عندما تكون مستعداً لمغادرة المستشفى، فسيكون الشق الجراحي لديك قد بدأ في الالتفام. قبل المغادرة، ألق نظرة على الشق الجراحي مع متعدد الرعاية وأحد مقدمي الرعاية الصحية. حيث إن ذلك يساعدك على ملاحظة أي تغييرات لاحقاً.

قبل مغادرة المستشفى، سيُدون أحد مقدمي الرعاية الصحية الخاص بك أوامر الخروج من المستشفى والوصفات الطبية. وستحصل أيضاً على تعليمات الخروج من المستشفى مكتوبة. وسيراجع أحد مقدمي الرعاية الصحية هذه التعليمات معك قبل المغادرة.

في المنزل إكمال نموذج تتبع التعافي

نود الاطمئنان على وضعك بعد مغادرتك المستشفى. وحتى تساعدنا على توفير الرعاية لك، سنرسل إليك بعض الأسئلة إلى حساب MyMSK الخاص بك. وسنرسل هذه الأسئلة كل يوم لمدة 10 أيام بعد الجراحة. وتُعرف هذه الأسئلة بنموذج تتبع التعافي.

أكمل نموذج تتبع التعافي كل يوم قبل منتصف الليل (12 صباحاً). علماً بأن ذلك يستغرق فقط دقيقتين أو 3 دقائق. ستساعدنا الإجابات عن هذه الأسئلة في التعرف على مشاعرك والوقوف على احتياجاتك.

بناءً على إجاباتك، ربما نتواصل معك لإفادتنا بمزيد من المعلومات. وأحياناً قد نطلب منك الاتصال بعيادة الجراح الخاص بك. يمكنك دوماً الاتصال بمكتب الجراح إذا كنت لديك أي أسئلة.

لمعرفة المزيد، اقرأ *Common Questions About MSK's Recovery Tracker*.
www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker

السيطرة على الألم

يعني المرضى من الألم أو عدم الراحة لفترات زمنية مختلفة. قد يستمر شعورك ببعض الألم بعد عودتك إلى المنزل وسيزول غالباً بتناول الدواء المسكن للألم. وقد يشعر البعض بالألم أو الشد أو ألم العضلات حول الشق الجراحي لمدة شهر أو شهرين. ولا ينبغي أن يثير هذا الكثير من القلق.

اتبع الإرشادات التالية للمساعدة في السيطرة على الألم في المنزل.

- تناول دوائلك حسب التوجيهات وعند اللزوم.
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا لم يؤدي تناول الدواء الموصوف لك لتسكين الألم.
- خلال فترة التئام الشق الجراحي، سيقل شعورك بالألم ومن ثم تحتاج إلى قدر أقل من الأدوية المسكنة للألم. يساعد مسكن الألم المتاح دون وصفة طبية مثل أسيتامينوفين (Tylenol®) أو إيبوبروفين (Advil®) في تخفيف الشعور بالألم والانزعاج.
- اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن التوقف عن تناول الدواء المسكن للألم الموصوف.
- لا تتناول جرعة أكبر من تلك المقررة على الملصق الخاص بأي دواء أو تلك التي حددها مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
- اقرأ الملصقات على جميع الأدوية التي تتناولها، لا سيما إن كنت تتناول دواء أسيتامينوفين. يُعد دواء أسيتامينوفين مكوناً أساسياً في العديد من الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية.

وكذلك الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية. فتناول الكثير منه يُمكن أن يُسبب ضرراً للكبد. لا تتناول أكثر من دواء واحد يحتوي على أسيتامينوفين بدون التحدث إلى أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية.

- يجب أن يسـعدك الدواء المـسكن للألم في استئناف أنشطتك المعتادة. تناول الجرعة الكافية من الدواء لأداء أنشطتك وتمـرينك الرياضية بشكل مريح. من الطبيعي أن يزيد الشعور بالألم قليلاً مع زيادة النشاط البدني.
- سـجـل أوقات تناول الدواء المـسكن للألم. ويظهر أفضل تأثير له بعد 30 إلى 45 دقيقة من تناوله. ويكون تناوله في بداية شعورك بالألم أفضل من الانتظار حتى يتفاقم الألم.
وقد تسبب بعض الأدوية الموصوفة المـسكنة للألم (مثل الأفيونات) الإمسـك.

منع حدوث الإمسـك والسيطرة عليه

تحـدـثـتـ معـ مـقـدـمـ الرـعـيـةـ الصـحـيـةـ بشـأنـ كـيفـيـةـ منـعـ حدـوـثـ الإـمـسـكـ وـالـسـيـطـرـةـ عـلـيـهـ. وـيمـكـنـكـ أـيـضـاـ اـتـبـاعـ التـوـجـيهـاتـ الوـارـدـةـ أدـنـاهـ.

- «ـولـ التـبـرـزـ فيـ نـفـسـ الـوقـتـ كـلـ يـوـمـ. وـسيـعـتـادـ الـجـسـمـ عـلـىـ التـبـرـزـ فيـ ذـلـكـ الـوقـتـ. إـذـاـ شـعـرـتـ بـالـحـاجـةـ لـلـتـبـرـزـ فيـ وـقـتـ آـخـرـ، فـلـ تـجـبـسـ الـبـرـازـ.
- «ـولـ التـبـرـزـ بـعـدـ 5ـ إـلـىـ 15ـ دـقـيـقـةـ مـنـ تـنـاـولـ الـوجـبـاتـ. وـيـفـضـلـ مـحـوـلـةـ التـبـرـزـ بـعـدـ الـإـفـطـارـ. حـيـثـ تـكـوـنـ مـنـعـكـسـتـ الـقـوـلـوـنـ فـيـ أـقـوـيـ <ـلـاـتـهـ>ـ فـيـ هـذـاـ الـوقـتـ.
- اـبـذـلـ النـشـاطـ الـبـدـنـيـ قـدـرـ اـسـتـطـعـتـكـ.
- نـاقـشـ مـعـ خـبـيرـ التـغـذـيـةـ السـرـيرـيـ الـخـاصـ بـكـ كـمـيـةـ السـوـاـئـلـ الـتـيـ يـنـبـغـيـ لـكـ تـنـاـولـهـ كـلـ يـوـمـ. اـسـتـهـدـفـ تـنـاـولـ أـكـبـرـ قـدـرـ مـمـكـنـ مـنـ السـوـاـئـلـ كـلـ يـوـمـ قـدـرـ الـإـمـكـانـ.
- اـخـتـرـ السـوـاـئـلـ مـثـلـ الـمـاءـ وـالـعـصـمـ (ـمـثـلـ عـصـيرـ الـبـرـقـوـقـ الـمـجـفـفـ أـوـ الـعـنـبـ أـوـ الـكـمـثـرـ)ـ وـالـمـرـقـ وـالـآـيـسـ كـرـيمـ الـمـخـفـوقـ.
- تـجـبـ السـوـاـئـلـ الـمـحـتـوـيـةـ عـلـىـ الـكـافـيـنـ (ـمـثـلـ الـقـهـوةـ وـالـصـوـدـاـ). وـذـلـكـ لـأـنـ هـذـهـ الـمـشـرـوبـاتـ تـطـرـدـ السـوـاـئـلـ خـارـجـ الـجـسـمـ.
- أـكـثـرـ تـدـريـجيـاـ مـنـ الـأـلـيـافـ فـيـ نـظـامـكـ الـغـذـائـيـ. تـحـدـثـ مـعـ خـبـيرـ التـغـذـيـةـ السـرـيرـيـ بـشـأنـ مـقـدـارـ الـأـلـيـافـ الـتـيـ يـمـكـنـكـ تـنـاـولـهـ كـلـ يـوـمـ. إـذـاـ كـانـتـ قـدـ أـجـرـيـتـ لـكـ فـغـرـةـ أـوـ خـضـعـتـ مـؤـخـراـ لـجـراـحةـ فـيـ الـأـمـعـاءـ، فـنـاقـشـ ذـلـكـ مـعـ مـقـدـمـ الرـعـيـةـ الصـحـيـةـ قـبـلـ إـجـرـاءـ أـيـ تـغـيـرـاتـ عـلـىـ نـظـامـكـ الـغـذـائـيـ.

فـيـهـ يـلـيـ الـأـطـعـمـةـ الـغـنـيـةـ بـالـأـلـيـافـ:

- خـبـزـ النـخـالـةـ أـوـ مـقـرـمـشـاتـ أـوـ وـجـبـاتـ الـقـمـحـ الـكـاملـ الـأـخـرىـ

- الحبوب الكاملة والخبز
- الخضروات والفواكه غير المقشرة
- السلطة الخضراء
- المشمش والتين والزيت المجفف
- تتوفر الأدوية التي تُصرف مع أو بدون وصفة طبية لعلاج الإمساك. ناقش تلك المسألة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تناول أي أدوية لعلاج الإمساك، لا سيما إن كانت قد أجريت لك فحرة أو خضعت لجراحة في الأمعاء.

العناية بالشق الجراحي

ستتم تغطية الشق الجراحي بصمغ جراحي يُسمى Dermabond®. تجنب لمس أو تقشير الصمغ الجراحي Dermabond. فسيسقط من تلقاء نفسه.

إذا تم نزع جهة النزح قبل مغادرتك المستشفى مباشرةً، فقد توضع ضمادة فوق هذا الموضع. ويمكنك نزع الضمادة بعد مرور 24 ساعة إلى 48 ساعة (يوم إلى يومين). اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاصة بك.

اتصل بعيادة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في الحالات التالية:

- احمرار الجلد المحيط بالشق الجراحي بشدة.
- احمرار الجلد المحيط بالشق الجراحي بشكل آخر في التزايد.
- إذا لاحظت نزحاً مثل الصديد (كتيف ويшибه الحليب).
- انبعث رائحة كريهة من الشق الجراحي.

الاستحمام أو الاغتسال

يمكنك اتباعك نظامك المعتاد في الاستحمام ما لم تكن قد غادرت المستشفى ولا يزال جهة نزح مركباً في مكانه لديك. إذا كان لديك جهة نزح، فلا تستحم حتى تتم إزالته.

تجنب غمر الشق الجراحي في الماء (مثل حوض الاستحمام أو حمام السباحة) لمدة 14 يوماً بعد الجراحة.

تناول الأطعمة والمشروبات

سيساعدك خبير تغذية الأطفال المرضى الداخليين في مركز MSK على إدارة نظامك الغذائي والتغذية بعد مغادرة المستشفى. وسيناقشه معك، الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لمساعدتك

على التعافي بعد الجراحة، أو اكتساب الوزن، أو كلّيّهم. وإذا كنت تحصل على التغذية عبر أنبوب في المنزل، فسيناقشه معك جدول ومُعدل التغذية عبر الأنبوب.

اتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا لم ترجع شهيتها إلى طبيعتها بعد بضعة أيام أو إذا أصبت بالقيء.

النشاط البدني والتمارين

يمكنك معاودة ممارسة أغلب أنشطتك المعتادة بمجرد رجوعك إلى المنزل. تجنب ممارسة الرياضات الجماعية التي تتضمن الاحتكاك والأعمال المنزلية الشاقة لمدة 6 أسابيع تقريباً بعد الجراحة. فهذه هي المدة التي يستغرقها الشق الجراحي.

العودة إلى المدرسة

يمكنك العودة إلى المدرسة بمجرد شعورك بأنك مستعد لذلك.

السفر

لا يحتاج أغلب الأشخاص لاتباع أي إرشادات خاصة بشأن السفر. ولا بأس بالسفر بالطائرة.

موعد المتابعة

قد تُرتب عيادة الجراح موعد المتابعة الخاص بك قبل مغادرتك المستشفى. أو قد يتم الاتصال بك لتحديد هذا الموعد بعد رجوعك إلى المنزل. يمكن تحديد موعد المتابعة إما بشكل شخصي أو عبر التطبيق عن بعد.

متى يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية

اتصل بمقدم الرعاية الصحية في الحالات التالية:

- عندما يبدو الشق الجراحي أحمر اللون.
- عندما يزداد الاحمرار حول موضع الشق الجراحي.
- نزح سائل من الشق الجراحي.
- بدء تورم الموضع المحيط بالشق الجراحي.
- تفاقم حالة التورم حول موضع الشق الجراحي.
- إذا شعرت بفقدان الشهية (عدم الرغبة في تناول الطعام).
- القيء.
- كانت لديك أية أسئلة أو شواغل.

معلومات الاتصال

يمكنك الاتصال بمكتب مقدم الرعاية الصحية أيام الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.

بعد الساعة 5 مساءً وخلال عطلة نهاية الأسبوع وفي العطلات الرسمية، اتصل بـ 212-639-2000. اطلب التحدث إلى مناوب مقدم الرعاية الصحية.

خدمات الدعم

يضم هذا القسم قائمة بخدمات الدعم. ومن شأن هذه الخدمات مساعدتك في الاستعداد للجراحة والتعافي منها.

أثناء قراءة هذا القسم، دوّن أي أسئلة تريدين الاستفسر عنها من مقدم الرعاية الصحية.

خدمات دعم مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK)

تفضل بزيارة قسم أنواع السرطان على الموقع الإلكتروني لمركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) وعنوانه www.msk.org/types للحصول على مزيد من المعلومات.

مكتب الإدخال للمستشفى
212-639-7606

اتصل بهذا الرقم إذا كانت لديك أسئلة متعلقة بإدخالك للمستشفى، مثل طلب غرفة خاصة.

التخدير
212-639-6840
اتصل بهذا الرقم إذا كنت لديك أسئلة متعلقة بالتخدير.

غرفة المتبوعين بالدم (Blood Donor Room)
212-639-7643
اتصل بهذا الرقم للحصول على معلومات إذا كنت مهتماً بالطبع بالدم أو الصفائح الدموية.

Bobst International Center
888-675-7722

نرحب بالمرضى من جميع أنحاء العالم ونقدم العديد من الخدمات لمساعدتهم. إذا كنت مريضاً دولياً، فاطلب المساعدة في إجراء الترتيبات الازمة لرعايتك.

مركز المشورة
www.msk.org/counseling
646-888-0200

يستفيد الكثير من الأشخاص من المشورة. يقدم مركز تقديم المشورة لدينا الاستشارات للأفراد والأزواج والعائلات والمجموعات. ويمكننا أيضًا وصف الأدوية لمساعدتك حل شعور بالقلق أو الاكتئاب. لتحديد موعد، اطلب من مقدم الرعاية الصحية إحلالك أو اتصل بالرقم الوارد أعلاه.

برنامج مخزن الطعام (Food Pantry)
646-888-8055

نوفر الطعام للمحتاجين خلال تلقيهم علاج السرطان. للحصول على المزيد من المعلومات، تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو اتصل بالرقم الوارد أعلاه.

الخدمات الطبية التكاملية (Integrative Medicine Service) www.msk.org/integrativemedicine

تقديم الخدمات الطبية التكاملية لدينا العديد من المكملة للرعاية الطبية التقليدية (والتي تتوافق معها)، وتشمل العلاج بالموسيقى، والعلاجات العقلية/البدنية والعلاج بالرقص والحركة واليوجا والعلاج باللمس. لتحديد موعد لتلقي هذه الخدمات، اتصل برقم 1010-449-646.

يمكنك أيضًا حجز استشارة مع أحد مقدمي الرعاية الصحية في قسم الخدمات الطبية التكاملية. سنتعلّم معك لوضع خطة تساعدك في اتباع أسلوب حياة صحي والسيطرة على الأعراض الجانبية. لتحديد موعد، اتصل برقم 8550-608-646.

مكتبة ميموريال سلون كيترينج (MSK)
library.mskcc.org
212-639-7439

يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للمكتبة أو الاتصال للتحدث إلى الفريق المرجعي بالمكتبة. فيمكنهم مساعدتك في العثور على المزيد من المعلومات عن نوع محدد من السرطان. يمكنك أيضًا زيارة [دليل تثقيف المرض ومتعبدي الرعاية الصحية والمستهلكين](#) في الموقع الإلكتروني للمكتبة.

موقع تثقيف المريض ومتعبدي الرعاية (Patient and Caregiver Education) www.msk.org/pe

تفضل بزيارة موقع تثقيف المريض ومتعبدي الرعاية الإلكتروني للبحث عن موارد تعليمية ومقاطع فيديو وبرامج إلكترونية.

فواتير المرضى
646-227-3378

اتصل بهذا الرقم إذا كنت لديك أسئلة حول التفويض المسبق مع شركة التأمين الخاصة بك. وهذا ممّا يسمى أيضًا بالموافقة المسبقة.

مكتب تمثيل المرضى

212-639-7202

اتصل بهذا الرقم إذا كانت لديك أسئلة حول نموذج وكيل الرعاية الصحية أو إذا كانت لديك مخاوف بشأن رعيتك.

منسق التمريض خلال الفترة المحيطة بالجراحة

212-639-5935

اتصل بهذا الرقم إذا كانت لديك أي أسئلة متعلقة بإصدار ميموريال سلون كيترينج (MSK) أي معلومات أثناء خضوعك للجراحة.

مكتب التمريض الخاص المناوب والمراقبين

917-862-6373

يمكنك طلب رقم تمريض خاص أو مراقبين لتقديم الرعاية لك في المستشفى والمنزل. اتصل لمزيد من المعلومات.

(Resources for Life After Cancer - RLAC)

646-888-8106

لا تنتهي الرعاية التي نقدمها في مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) بانتهاء العلاج الذي تتلقاه. يُعد برنامج موارد الحياة بعد السرطان (RLAC) مخصصاً للمرضى وعائلاتهم الذين أنهوا العلاج.

يقدم هذا البرنامج العديد من الخدمات. حيث نوفر الندوات وورش العمل ومجموعات الدعم وتقديم المشورة بشأن الحياة بعد العلاج. نستطيع أيضاً المساعدة في حل مشكلات التأمين والوظيفة.

إدارة الخدمة الاجتماعية (Social Work)

www.msk.org/socialwork

212-639-7020

يسعد الأخصائيون الاجتماعيون المرضى والأسر والأصدقاء في التعامل مع المشكلات الشائعة لمرضى السرطان. وهم يقدمون المشورة الفردية ومجموعات الدعم خلال فترة العلاج. ويمكنهم مساعدتك في التواصل مع الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين.

كم يمكن للأخصائيين الاجتماعيين لدينا إلتقاك إلى الوكالات والبرامج المجتمعية. هذا، ويمكنهم تقديم معلومات عن الموارد المحلية، إذا كنت تواجه مشكلات في دفع الفواتير.

الرعاية الروحانية

212-639-5982

يتوفر رجال الدين للاستماع، والمساعدة في دعم أفراد الأسرة، والصلادة. والتواصل مع رجال الدين أو

المجموعات الدينية المجتمعية، أو ليكونوا رفقاء باعثين على الاطمئنان والحضور الروحي. يمكن لأي شخص طلب الدعم الروحي. فليس من الضروري أن يكون لك انتفاء ديني أو تعتنق ديناً معيناً.

توجد دار العبادة بمركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) بالقرب من الردهة الرئيسية بمستشفى Memorial Hospital. وهي مفتوحة 24 ساعة يومياً. إذا كانت لديك حالة طوارئ، فيرجى الاتصال برقم 212-639-2000. اطلب التحدث إلى رجل الدين المناوب.

موقع البرامج الافتراضية (Virtual Programs)
www.mskcc.org/vp

يوفر موقع البرامج الافتراضية موارد التعليم والدعم عبر الإنترن特 للمرضى ومتعبدي الرعاية. وهي جلسات عبر الإنترن特 يمكنك التحدث أو الاستماع لها. يمكنك التعرف على تشخيصك، وما يمكن توقعه أثناء العلاج، وكيفية الاستعداد لرعاية مرضى السرطان.

هذه الجلسات سرية ومجانية ويعمل على إدارتها خبراء متخصصون. تفضل بزيارة موقعنا على الإنترن特 للحصول على المزيد من المعلومات حول موقع البرامج الافتراضية (Virtual Programs) أو للتسجيل.

خدمات الدعم الخارجية

Access-A-Ride

web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm

877-337-2017

في مدينة نيويورك، توفر هيئة نقل متروبوليتان (MTA) رحلات مشتركة وخدمة التوصيل من الباب إلى الباب لذوي الإعاقات الذين لا يستطيعون ركوب الحافلات العامة أو مترو الأنفاق.

Air Charity Network

www.aircharitynetwork.org

877-621-7177

توفر خدمة الانتقال إلى مراكز العلاج.

(American Cancer Society) الجمعية الأمريكية للسرطان

www.cancer.org

(ACS-2345) (800-227-2345-800)

تقدم معلومات وخدمات متنوعة، ومنها خدمة هوب لودج (Hope Lodge)، والتي توفر مجاناً مراكزاً مجانية يقيم فيه المرضى ومتعبدي رعايتهم أثناء علاج السرطان.

(Cancer and Careers) السرطان وفرص العمل

www.cancerandcareers

org.646-929-8032

مصدر للتحقيق والأدوات والفعاليات الخاصة بالموظفين المصـبين بالسرطان.

CancerCare

www.cancercare.org

800-813-4673

(West 25th & 26th (بين شارعي Seventh Avenue 275

New York, NY 10001

تقديم المشورة ومجموعـات الدعم وورش العمل والمنشورات والمسـاعدة المـالية.

مجتمع دعم مرضى السرطـان (Cancer Support Community)

www.cancersupportcommunity.org

يقدم الدعم والمعلومات التـثـيقـيفـية لـمرضـى السـرـطـان وذـويـهـمـ.

شبـكة عمل مـقدمـي الرـعـاـية (Caregiver Action Network)

www.caregiveraction.org

800-896-3650

توفر التـثـيقـ والـدـعـمـ لـمـقـدـمـي الرـعـاـيةـ لـأـحـبـائـهـمـ المـصـبـينـ بـأـمـراضـ مـزـمـنةـ أوـ إـعـاقـاتـ.

Corporate Angel Network

www.corpangelnetwork.org

866-328-1313

توفر الـانتـقالـ المـجـانـيـ إـلـىـ مـراـكـزـ العـلاـجـ فـيـ جـمـيعـ أـنـحـاءـ الـدـوـلـةـ باـسـتـخـادـ المـقـاعـدـ الـفـارـغـةـ عـلـىـ مـتنـ طـئـرـاتـ الـأـعـمـالـ.

Good Days

www.mygooddays.org

877-968-7233

تقـدمـ الـمـسـعـدةـ الـمـالـيـةـ لـسـدـادـ الرـسـومـ الـمـشـترـكـةـ خـلـالـ فـتـرـةـ الـعـلاـجـ.ـ وـيـجـبـ أـنـ يـكـونـ الـمـرـضـ مـشـمـولـينـ بـالـتـأـمـيـنـ الـطـبـيـ،ـ وـيـسـتـوفـونـ الـمـعـاـيـرـ الـمـتـعـلـقـةـ بـالـدـخـلـ،ـ وـأـنـ تـوـصـفـ لـهـمـ أـدـوـيـةـ تـمـثـلـ جـزـءـاـ مـنـ مـجـمـوعـةـ Good Daysـ الـعـلاـجـيةـ.

HealthWell Foundation

www.healthwellfoundation.org

800-675-8416

تـقـدمـ الـمـسـعـدةـ الـمـالـيـةـ لـسـدـادـ الـمـدـفـوـعـاتـ الـمـشـترـكـةـ وـأـقـسـطـ الرـعـاـيةـ الـصـحـيـةـ وـالـمـبـالـغـ الـمـقـطـعـةـ لـأـدـوـيـةـ

وعلاجات معينة.

Joe's House

www.joeshouse.org

877-563-7468

تقدم قائمة بأماكن الإقامة الموجودة على مقرية من مراكز العلاج للمصابين بالسرطان وأسرهم.

LGBT Cancer Project

www.lgbtcancer.com

يوفر الدعم والمناصرة لمجتمع المصابين بانحرافات جنسية، بهـ في ذلك مجموعـات الدعم عبر الإنترنـت وقاعدة بيانات تضم التجارب السريرـية المناسبـة لهذه الحالـات.

LIVESTRONG Fertility

www.livestrong.org/we-can-help/fertility-services

855-744-7777

تقدم المعلومات والدعم في المسـائل الإيجـابـية لمرضـى السـرطـان والنـاجـين مـمـن تـنـطـوي عـلـاجـاتـهـم الطـبـيـة عـلـى مـخـاطـر مـرـتبـطة بـالـعـقـمـ.

Look Good Feel Better Program

www.lookgoodfeelbetter.org

(LOOK) 800-395-5665-800-395

يوفر هذا البرنامج ورش العمل لتعلم الأشياء التي يمكنك القيام بهاـ لمسـعدتك في اكتـسـاب شـعـور أـفـضل بـشـأن مـظـهـرـكـ. للـحـصـول عـلـى المـزـيد مـن المـعـلومـات أو للـتـسـجـيل فـي إـحدـى وـرـشـ الـعـلـمـ، اـتـصـلـ بـالـرـقـمـ الـوـارـدـ أـعـلـاهـ أو تـوـجـهـ لـزـيـارـةـ مـوـقـعـ الـبـرـنـامـجـ.

المعهد الوطني للسرطان (National Cancer Institute)

www.cancer.gov

(CANCER) 800-422-6237-800-4

الشبكة الوطنية للمصابين بالسرطان ذوي الانحرافات الجنسية (National LGBT Cancer Network)

www.cancer-network.org

توفر التـثـقـيفـ وـالـتـدـريـبـ وـالـدـعـمـ لـلـنـاجـينـ مـنـ السـرـطـانـ ذـوـيـ الـانـحرـافـاتـ الـجـنـسـيـةـ وـهـؤـلـاءـ الـمـعـرـضـينـ لـمـخـاطـرـهـ.

Needy Meds

www.needymeds.org

تسرد برامج مساعدة المرضى بشأن الأدوية ذات الأسماء العامة والأسماء التجارية.

NYRx

www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm

توفر مزايا الوصفات الطبية للموظفين والمتقاعدين المؤهلين من موظفي القطاع العام في ولاية نيويورك.

Patient Access Network (PAN) Foundation

www.panfoundation.org

866-316-7263

توفر المساعدة بشأن المدفوعات المشتركة للمرضى المشمولين بالتغطية التأمينية.

(Patient Advocate Foundation) مؤسسة دعم المرضى

www.patientadvocate.org

800-532-5274

تبني الحصول على الرعاية والمساعدة المالية والمساعدة بشأن التأمين والمساعدة بشأن الاحتفاظ بالوظيفة فضلاً عن الوصول إلى دليل الموارد الوطني لذوي التأمين الصحي المنخفض.

Professional Prescription Advice

www.pparx.org

888-477-2669

تسعد في تأهيل المرضى الذين لا يحظون بتغطية تكفل لهم الحصول على الأدوية الموصوفة للحصول على الأدوية المجانية ومنخفضة التكلفة.

(Gilda's Club Red Door Community) المعروفة سابقاً باسم

www.reddoorcommunity.org

212-647-9700

مكان يقدم الدعم الاجتماعي والعاطفي للرجال والنساء والأطفال المصابة بالسرطان عن طريق التواصل وورش العمل والمحاضرات والأنشطة الاجتماعية.

RxHope

www.rxhope.com

877-267-0517

توفر المساعدة للأشخاص بهدف الحصول على الأدوية التي يجدون صعوبة في تدبير تكلفتها.

Triage Cancer

برنامج يوفر المعلومات والموارد القانونية والطبية والمحلية لمرضى السرطان ومقدمي الرعاية.

الموارد التعليمية

يعرض هذا القسم الموارد التعليمية المذكورة في هذا الدليل. ستساعدك هذه الموارد في الاستعداد للجراحة والتعافي بعد الجراحة.

أثناء قراءة هذه الموارد، دُون أي أسئلة للاستفسر عنها من مقدم الرعاية الصحية.

Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones •
(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning)

How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)

Herbal Remedies and Cancer Treatment (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment)

How to Be a Health Care Agent (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent)

How to Enroll in MyMSK: Memorial Sloan Kettering's Patient Portal •
(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/how-enroll-mymsk-patient-portal)

كيفية استخدام مقياس التنفس المحفز (www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer)

Frequently Asked Questions About the MyMSK Goals to Discharge Checklist •
(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-mymsk-goals-discharge-checklist)

جزء التحكم الذاتي بمسكن الألم (www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/patient-controlled-analgesia-pca)

Staying Active Before and After Surgery for Pediatric Patients •
(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/staying-active-peds)

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

About Your Thoracoabdominal Surgery at MSK Kids - Last updated on July 29, 2024
جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركزMemorial Sloan Kettering لعلاج السرطان



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center