

الأدوية شائعة الاستخدام خلال عمليات زرع الخلايا الجذعية للأطفال

تسرد هذه المعلومات الأدوية المُستخدمة غالبًا قبل عملية زرع الخلايا الجذعية للأطفال أو أثناءها أو بعدها. سيتحدث معك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن الأدوية التي تتناولها، وتشمل أسماء هذه الأدوية والسبب في تناولها. في هذا المورد، يكون الخطاب موجه لك أنت أو طفلك.

المُكملات الغذائية

- حمض الفوليك: فيتامين يحتاجه الجسم لُصنع خلايا الدم العادية.
- كلوريد البوتاسيوم/فوسفور البوتاسيوم: أحد مكملات البوتاسيوم. يحتاج الجسم للبوتاسيوم حتى تؤدي العضلات (بما فيها القلب) وظيفتها على نحو سليم.
- أكسيد المغنيسيوم/صويا المغنيسيوم: مكملات المغنيسيوم. يحتاج القلب للمغنيسيوم لأداء وظائفه على نحو سليم.
- الفيتامينات المتعددة: مكملات فيتامينات قد تحتوي أو لا تحتوي على الحديد.
- فيتامين ك: فيتامين يحتاجه الجسم للمساعدة على تخثر الدم.

الوقاية من داء الطعم حيال الثوي (GVHD)

تُستخدم هذه الأدوية للوقاية من داء الطعم حيال الثوي أو علاجه. فيما يلي بعض الأمثلة:

- ميكوفينولات موفيتيل (CellCept®)
- سيكلوسبورين (Neoral®)
- تاكروليموس (Prograf®)
- سيروليموس (Rapamune®)
- ميثوتركسيت (بجرعة منخفضة)

مضادات الفيروسات

تُستخدم هذه الأدوية للوقاية من أنواع العدوى الفيروسية أو علاجها (مثل جدري الماء والقوباء المنطقية). تحدث أحياناً الإصابة بأنواع العدوى الفيروسية الأخرى أثناء عملية الزرع ومنها الفيروس المُضخم للخلايا (CMV)، وفيروس الهربس البشري (HHV6)، وفيروسات الغدد، وفيروس البكيتيه. فيما يلي بعض الأمثلة:

- أسيكلوفير (®Zovirax)
- فوسكارنيت (®Foscavir)
- غانسيكلوفير (®Cytovene)
- سيدوفوفير (®Vistide)
- ليتيرموفير (®Prevymis)
- فالجانسيلوفير (®Valcyte)

مضادات الفطريات

تُستخدم هذه الأدوية للوقاية من أنواع العدوى الفطرية أو علاجها. فيما يلي بعض الأمثلة:

- فلوكونازول (®Diflucan)
- أمفوتيريسين (®AmBisome)
- فوريكونازول (®Vfend)
- ميكافانجين (®Mycamine)
- بوساكونازول (®Noxafil)
- إيزوفاكونازونيوم (®Cresemba)

مضادات الغثيان

تُستخدم هذه الأدوية للوقاية من الغثيان (الشعور بالرغبة في التقيؤ) والقيء وعلاجهما. فيما يلي بعض الأمثلة:

- أوندانسيرون (®Zofran)
- هيدروكسيزين (®Vistaril)

- ميتوكلوبراميد (®Reglan)
- جرانيسترون (®Kytril)
- لورازيبام (®Ativan)
- درونابينول (®Marinol)
- فوسابريبيتانت (®Emend)
- ديفينهيدرامين (®Benadryl)

مضادات الحموضة

تُستخدم هذه الأدوية لخفض الإفرازات المعدية الحمضية. فيما يلي بعض الأمثلة:

- بانتوبرازول (®Protonix)
- لانزوبرازول (®Prevacid)
- رانيتيدين (®Zantac)
- أوميبرازول (®Prilosec)
- إيزومبيرازول مغنيسيوم (®Nexium)

الهرمونات (للإناث)

تُستخدم هذه الأدوية لمنع النزيف المهبلي عند انخفاض تعداد الصفائح الدموية بدرجة كبيرة. فيما يلي بعض الأمثلة:

- نورجيستريل (®Ovral)
- نورجيستريل وإيثينيل إستراديول (®Lo-Ovral)
- أسيتات ميدروكسي بروجستيرون (®Provera)
- ليوبروليد (®Lupron)
- أسيتات ميدروكسي بروجستيرون (®Depo-Provera)

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

Commonly Used Medications During Pediatric Stem Cell Transplants - Last updated on
December 12, 2022

جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Memorial Sloan Kettering لعلاج السرطان



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center