



تعليم المريض / مقدم الرعاية

الاستعداد للجراحة

ستساعدك هذه المعلومات على الاستعداد للجراحة في مستشفى مركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) أو مركز خوسيه روبرتسون للجراحة (JRSC - Josie Robertson Surgery Center) أو مركز ميموريال سلون كيترینج مونموث (MSK Monmouth). راجع هذه التعليمات قبل 10 أيام من إجراء الجراحة.

قبل إجراء الجراحة

استفسر عن الأدوية الخاصة بك

قد يتغير عليك التوقف عن تناول بعض الأدوية قبل إجراء الجراحة. سيتحدث معك مقدم الرعاية *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-Herbal Remedies) (aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids-and-Cancer-Treatment) (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment) سيقدم لك مقدم الرعاية الصحية نسخة.

أبلغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تتناول أي أدوية مسكنة للألم أو أدوية للقلق. من المهم الاستمرار في تناول هذه الأدوية في موعدها المحدد، حتى أثناء العلاج. وقد تتمكن من تناولها في صباح يوم الجراحة، إذا لزم الأمر.

نبذة عن انقطاع التنفس أثناء النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم هو مشكلة شائعة أثناء النوم. إذا كنت مصاباً بانقطاع التنفس أثناء النوم، فسيتوقف التنفس لديك لفترات زمنية قصيرة أثناء النوم. والنوع الأكثر شيوعاً هو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA). وفي هذه الحالة، يحدث انسداد تام لمجرى التنفس أثناء النوم.

قد يسبب انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم مشكلات خطيرة أثناء وبعد الجراحة. أخبرنا إذا كنت تعتقد أنك مصاب بانقطاع التنفس أثناء النوم. إذا كنت تستخدم جهاز تنفس، مثل جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، فأحضره معك في يوم الجراحة.

الاتفاق مع أحد الأشخاص لإعادتك إلى منزلك

يجب أن يكون لديك شريك رعاية مسؤول عن إعادتك إلى منزلك بعد الإجراء. ويُقصد بشريك الرعاية المسؤول شخص يُمكنه مساعدتك في العودة إلى المنزل بأمان. ويجب أن يكون قادرًا على الاتصال بفريق الرعاية الخاص بك في حالة وجود أي شواغل. ويمكنك الترتيب لذلك قبل الإجراء بيوم واحد.

إذا لم يكن لديك شريك رعاية مسؤول ليُعيديك إلى منزلك، فيمكنك الاتصال بأيٍ من الوكالات الواردة أدناه. وسوف يرسلون لك أحد الأشخاص لاصطحابك إلى منزلك. تتوفر هذه الخدمة نظير رسوم وسيتوجب عليك توفير وسيلة انتقال. ولا بأس باستخدام سيارة أجرة أو خدمة سيارات، ولكنك لا تزال بحاجة إلى شريك رعاية مسؤول لمراقبتك.

الوكالات الموجودة في نيو جيرسي

مختصو الرعاية: 877-227-4649

الوكالات الموجودة في نيويورك

مؤسسة VNS Health: 888-735-8913

مختصو الرعاية: 877-227-4649

نوصيك بتدبير شخص مساعدتك في المنزل خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الجراحة.

ملء بيانات نموذج وكيل الرعاية الصحية

إذا لم تكن قد استكملت بالفعل بيانات نموذج وكيل الرعاية الصحية، فإننا نوصيك بذلك الآن. وإذا كنت قد استكملت واحدًا بالفعل، أو كانت لديك أي توجيهات مسبقة أخرى، فأحضرها معك في الموعد التالي.

نموذج وكيل الرعاية الصحية هو مستند قانوني. وهو يحدد الشخص الذي تريد منه التحدث بالنيابة عنك إذا لم تتمكن من التواصل بنفسك. ويُعرف هذا الشخص بوكيل الرعاية الصحية.

● للاطلاع على معلومات حول وكلاء الرعاية الصحية والتوجيهات الأخرى المسبقة، اقرأ *Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones*.

.((www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning)).

● للاطلاع على معلومات حول الاضطلاع بدور وكيل الرعاية الصحية، اقرأ *How to Be a Health Care Agent* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent).

تحدث مع أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أسئلة حول ملء بيانات نموذج وكيل الرعاية الصحية.

شراء المستلزمات

محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% (CHG) مطهر ومنظف للجلد (مثل محلول هيبكلينس [Hibiclens®])

قد يتعين عليك الاستحمام بمحلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% المطهر والمنظف للجلد قبل الجراحة. وسيوصي لك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بذلك عند الضرورة.

محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% هو منظف للبشرة يقتل الجراثيم لمدة 24 ساعة بعد استخدامه. سيساعد الاستحمام به قبل الجراحة على تقليل خطر الإصابة بالعدوى بعد الجراحة. يمكنك شراء محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% المطهر والمنظف للجلد من الصيدلية المحلية لديك دون وصفة طبية.

مستلزمات تفريغ الأمعاء

قد يتعين عليك تفريغ الأمعاء قبل الجراحة. ويعني تفريغ الأمعاء إفراغها من البراز.

سيخبرك مقدم الرعاية الصحية إذا كان يتعين عليك تفريغ الأمعاء. لا تتطلب جميع العمليات الجراحية تفريغ الأمعاء.

إذا كنت بحاجة إلى تفريغ الأمعاء قبل الجراحة، فسيخبرك مقدم الرعاية الصحية بكيفية القيام بذلك. وسيخبرك أيضاً بالمستلزمات التي تحتاجها. قد تود أيضاً شراء سوائل صافية لشربها في اليوم السابق للجراحة. اقرأ - *Clear Liquid Diet* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/clear-liquid-diet) لمعرفة أمثلة على تلك السوائل.

اليوم السابق للجراحة

سجل الوقت المحدد لجراحتك

سيتصل بك أحد أعضاء الفريق بعد الساعة 2 ظهراً في اليوم السابق للجراحة. إذا كان موعد الجراحة المقرر هو يوم الاثنين، فسيتصل بك يوم الجمعة السابق له. إذا لم تلتقي أي مكلمة بحلول الساعة 7 مساءً، فاتصل برقم 212-639-5014.

سيخبرك أحد أعضاء الفريق بموعده وصولك إلى المستشفى لإجراء الجراحة. وسيذكرك أيضاً بالموقع الذي ستتوجه إليه.

وسينكون أحد المواقع التالية.

في نيويورك:

- مركز رعاية ما قبل الجراحة (PSC) في الطابق الثاني (East 67th و East 68th York Ave 1275) بين شارعي 67th و 68th. استقل المصعد M إلى الطابق الثاني.

- مركز رعائية مـ قبل الجراحة (PSC) في الطابق السادس (East 67th York Ave 1275) بين شارعي East 68th و East 67th. استقل المصعد B إلى الطابق السادس.
- مركز خوسيه روبرتسون للجراحة (Josie Robertson Surgery Center - JRSC) (East 62nd و East 61st York Avenue 1133) بين شارعي East 62nd و East 61st.

في نيو جيرسي:

● MSK Monmouth
Red Hill Rd 480
Middletown, NJ 07748

تفصل بزيارة الموقع www.msk.org/parking للتعرف على معلومات حول إيقاف السيارة والاتجاهات لجميع مواقع مركز MSK.

إذا طرأت لديك أية تغيرات على حلتكم الصحية أو اضطررت إلى إلغاء الجراحة لأي سبب، فاتصل بالجراح الخاص بك. تفتح المقرات أبوابها عادةً أيام الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحاً إلى 5 مساءً. وبعد الساعة 5 مساءً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي أيام الإجازات، اتصل بالرقم 212-639-2000. اسأل الطبيب المناوب عن الجراح.

الليلة السابقة للجراحة

اتبع أية تعليمات خاصة قدمها لك مقدم الرعاية الصحية حول نظامك الغذائي أو أدويتك.

ابدأ تفريغ الأمعاء عند اللزوم

إذا أوصاك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن تقوم بتفريغ الأمعاء، فسيتعين عليك البدء في ذلك قبل الجراحة بيوم واحد. التزم بالتعليمات التي قدمها لك.

استحم بمحلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% المطهر والمنظف للجلد (مثل محلول هيبكلينس [®Hibiclens])، إذا لزم الأمر

إذا أوصاك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالاستحمام بمحلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% المطهر والمنظف للجلد قبل الجراحة، فقم بذلك في الليلة السابقة للجراحة وفي صباح يوم الجراحة. اتبع هذه التعليمات.

1. اغسل شعرك باستخدام الشامبو والمُنعم المعتادين. اشطف رأسك جيداً.

2. اغسل وجهك ومنطقة الأعضاء التناسلية (الأربية) بالصابون المعتمد. اشطف جسمك جيداً بالماء الدافئ.
 3. افتح زجاجة محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4%. صب القليل منه في يدك أو في قطعة قميش نظيفة.
 4. ابتعد عن تيار الدش. افرك محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% برفق على جسمك من رقبتك إلى قدميك. تجنب وضعه على وجهك أو منطقة التناسلية.
 5. عد إلى تيار الدش لشطف محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4%. استخدم الماء الدافئ.
 6. جفف نفسك بمنشفة نظيفة.
- لا تضع أي غسول أو كريم أو مزيل عرق أو بودرة أو عطر أو كولونيا بعد الاستحمام.

النوم

اخذ إلى النوم مبكراً واحصل على قسط كافٍ من النوم طوال الليل.

تعليمات تناول الطعام



توقف عن تناول أي طعام بعد منتصف الليل (الساعة 12 منتصف الليل) في الليلة السابقة للإجراء. وهذا يشمل الحلوي الصلبة والعلكة.

إذا أوصاك مقدم الرعاية الصحية بالتوقف عن تناول الطعام في وقت سابق منتصف الليل، فاحرص على اتباع تعليماته. يتبعن على بعض الأشخاص الصيام (عدم تناول أي طعام) لمدة أطول قبل الإجراء.

يوم الجراحة

اتبع أية تعليمات خاصة قدّمه لك مقدم الرعاية الصحية حول نظامك الغذائي.

تعليمات الشرب

تناول فقط السوائل المدرجة في القائمة التالية بين منتصف الليل (الساعة 12 منتصف الليل) وحتى ساعتين قبل موعد وصولك. ولا تتناول أي طعام أو مشروب آخر. توقف عن تناول المشروبات قبل ساعتين من موعد وصولك المحدد.

- الماء.
- عصير التفاح الصافي، عصير العنب الصافي، أو عصير التوت البري الصافي.
- مشروب Gatorade أو Powerade.
- القهوة أو الشاي السادة. ولا بأس بإضافة السكر. تجنب إضافة أي شيء آخر.
- تجنب إضافة أي كمية من أي نوع من أنواع الحليب أو مُبيضات القهوة. وهذا يشمل أنواع الحليب ومُبيضات القهوة النباتية.
- تجنب إضافة عسل النحل.
- تجنب إضافة شراب ذي نكهة.

إذا كنت مصراً بالسكرى، فانتبه إلى كمية السكر في هذه المشروبات. سيكون من الأسهل التحكم في مستويات سكر الدم لديك إذا تناولت أصنافاً خالية من السكر أو منخفضة السكر أو لا تحتوي على سكر مضاف من هذه المشروبات.

من المفيد المحافظة على ترطيب الجسم قبل الإجراء، لذا نوصيك بشرب السوائل لإرواء عطشك. ولا تتناول أكثر من احتياجك. ستتلقى السوائل الوريدية أثناء الإجراء.



توقف عن تناول المشروبات قبل ساعتين من موعد وصولك المحدد. وهذا يشمل الماء.

تناول الأدوية الخاصة بك حسب التعليمات

إذا أخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتناول بعض الأدوية في صباح يوم الجراحة، فتناول تلك الأدوية فقط مع رشقة من الماء.

استحم بمحلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% المطهر والمنظف للجلد (مثل محلول هيبكلينس [Hibiclens®]), إذا لزم الأمر

إذا أوصاك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالاستحمام بمحلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% المطهر والمنظف للجلد، فقم بذلك قبل أن تغادر إلى المستشفى. استخدمه بنفس الطريقة التي استخدمته في الليلة السابقة.

ما ينبغي إحضاره

- قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية، واللصقات، والكريمة.
- جهاز التنفس الخاص بك لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم (مثل جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)), إذا كان لديك.
- نموذج وكيل الرعاية الصحية الخاص بك والتوجيهات المسبقة الأخرى، إذا قمت بإكماله.
- الهاتف المحمول والشاحن.
- حفظة للأغراض الشخصية الخاصة بك (مثل النظارات، وسماعات الأذن الطبية، وأطقم الأسنان، والأجهزة التعويضية، والشعر المستعار، والمعتقدات الدينية)، إذا كنت لديك.

نقاط يجب تذكرها

- إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فارتد نظارتك بدلاً منها. قد يؤدي ارتداء العدسات الاصقة أثناء الجراحة إلى الإضرار بعينيك.
- لا ترتدي أية أشياء معدنية. انزع عن جميع المجوهرات، بما في ذلك أقراط الجسم. قد تتسبب المعدات المستخدمة أثناء الجراحة في إصباتك بحرق أو إذا لامست المعدن.
- تجنب وضع أي غسول أو كريم أو مزيل عرق أو مكياج أو بودرة أو عطر أو كولونيا.
- اتركي الأشياء الثمينة (مثل بطاقات الائتمان والمجوهرات ودفتر الشيكlets الخاص بك) في المنزل.
- إذا كنت في فترة الحيض (دورتك الشهرية)، استخدمي فوطة صحية وليس سداداً قطنية. ستحصل على ملابس داخلية وفوتو، إذا لزم الأمر.

استعد للجراحة

- عندما يحين وقت تغيير الملابس لإجراء الجراحة، سترتدي سرير بالمستشفى، ورداء، وجوارب غير قابلة للانزلاق.
- قد يعتمد وقت البدء الدقيق للجراحة على طول مدة الجراحة المقرر قبل الجراحة. سوف تتحدث ممرضتك معك إذا كان هناك أي تأخير غير متوقع.
- قبل أن يتم اصطحبك إلى غرفة العمليات، سيتعين عليك نزع سماعات الأذن الطبية، طقم الأسنان، الأجهزة التعويضية، الشعر المستعار، والمعتقدات الدينية.

الزوار

نقوم في بعض الأحيان بتحديث سياسة الزوار الخاصة بنا للمحافظة على صحة وسلامة المرضى والموظفين لدينا. انتقل إلى الموقع www.msk.org/visit للاطلاع على أحدث المعلومات.



أرقام الهاتف المفيدة

التخدير

212-639-6840

اتصل بهذا الرقم إذا كانت لديك أسئلة حول التخدير (دواء يجعلك تنام أثناء الجراحة).

Bobst International Center

888-675-7722

يرحب مركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) بالمرضى من جميع أنحاء العالم. إذا كنت مريضاً دولياً، فاطلب المساعدة في ترتيب رعيتك.

فواتير المرضي

646-227-3378

اتصل بهذا الرقم إذا كانت لديك أسئلة حول التفويض المسبق مع شركة التأمين الخاصة بك. وهذا مسمى أيضاً بالموافقة المسبقة.

مكتب تمثيل المرضى

212-639-7202

اتصل بهذا الرقم إذا كانت لديك أسئلة حول نموذج وكيل الرعاية الصحية أو إذا كانت لديك مخاوف بشأن رعيتك.

مكتب التمريض الخاص المناوب والمراقبين

917-862-6373

يمكنك طلب رقم تمريض خاص أو مراقبين لتقديم الرعاية لك في المستشفى والمنزل. اتصل لمزيد من المعلومات.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

Getting Ready for Surgery - Last updated on July 2, 2024
جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركزMemorial Sloan Kettering لعلاج السرطان