



تعليم المريض / مقدم الرعاية

كيف تستعد لإجراء تنظير القولون باستخدام ®MiraLAX

سوف تساعدك هذه المعلومات في الاستعداد لإجراء تنظير القولون باستخدام بولي إيثيلين غليكول (polyethylene glycol) (MiraLAX).

نبذة عن إجراء تنظير القولون الخاص بك

تنظير القولون هو اختبار يسمح لطبيبك بفحص الجزء الداخلي من القولون (الأمعاء الغليظة). سيستخدم الطبيب منظار قولون لرؤية القولون من الداخل. وهو عبارة عن أنبوب مرن يحمل كاميرا على طرفه. وتحتاج الصور على شاشة فيديو.

أثناء هذا الإجراء، سيتمكن الطبيب من:

- الحصول على عينة صغيرة من النسيج (خزعة) لاختبارها.
- إزالة سليلة (نسيج نام).
- التقط صور للقولون من الداخل.

سيتعين تفريغ القولون قبل خضوعك للإجراء. فقد لا يمكن الطبيب من رؤية السلاسل أو رصد أي مشكلات أخرى إذا وجد براز داخل القولون. وقد تضطر إلى الخضوع للإجراء مرة أخرى إذا حدث ذلك.

اتبع هذه التعليمات بعناية. إذا كنت لديك أي استفسارات، فاتصل بعيادة الطبيب.

أسبوع واحد قبل إجراء تنظير القولون استفسر عن الأدوية الخاصة بك

قد يتطلب عليك التوقف عن تناول بعض أدويةك المعتادة قبل الخضوع للإجراء. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن الأدوية التي يجب عليك التوقف عن تناولها لسلامتك.

قمنا بتضمين بعض الأمثلة الشائعة فيما يلي، على سبيل المثال وليس الحصر. تأكد من إعلام فريق

الرعاية الخاصة بك بجميع الأدوية الموصوفة والتي تُصرف بدون وصفة طبية التي تتناولها. يُقصد بالدواء بوصفة طبية ذلك الذي يمكنك الحصول عليه فقط بوصفة طبية من مقدم الرعاية الصحية. يُقصد بالدواء بدون وصفة طبية ذلك الذي يمكنك شرائه بدون الحصول على وصفة طبية.



من المهم أن تتناول أدويتك بطريقة صحيحة خلال الأيام التي تسبق الإجراء. وإنما، فربما نضطر للإلغاء الإجراء المقرر لك.

مضادات التخثر (مضادات تجلط الدم)

مضادات تخثر الدم هي أدوية تؤثر على طريقة تجلط الدم لديك. إذا كنت تتناول دواءً مضاداً لتجلط الدم لعلاج الجلطات الدموية أو لمنع الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، فاسأْل طبيبك الذي وصفه لك عن توقيت التوقف عن تناولها.

فيما يلي بعض الأمثلة على مضادات تجلط الدم. وهناك أدوية أخرى مضادة لتجلط الدم، لذا احرص على إعلام فريق الرعاية الصحية بجميع الأدوية التي تتناولها. لا تتوارد عن تناول الدواء المضاد لتجلط الدم دون استشارة أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية.

- عقار ميلوكسيكـام (®Mobic)
- الأدوية المضادة للالتهاب غير السترويدية، مثل ايوبروفين (أدفـيل®، موـرين®) ونابروكسـين (أـلـيف®)
- عقار بنتوكسيـفين (®Trental)
- عقار بـراـسوـغـرـيل (®Effient)
- عقار رـيفـارـوكـسـيـبـان (®Xarelto)
- عقار سـلـفـاسـلاـزـين (®Azulfidine) و (®Sulfazine)
- عقار تـيـكـجـرـيلـور (®Brilinta)
- عقار تـينـزاـبـارـين (®Innohep)
- عقار وـارـفـارـين (®Coumadin) و (®Jantoven)
- عقار أبيـكـسـيـبـان (®Eliquis)
- عقار أـسـبـرـين
- عقار سـيلـيكـوـكـسـيـب (®Celebrex)
- عقار سـيلـوـسـتاـزـول (®Pletal)
- عقار كـلـوـبـيـدـوـغـرـيل (®Plavix)
- عقار دـاـبـيـجـاتـرـان (®Pradaxa)
- عقار دـالـتـيـبـارـين (®Fragmin)
- عقار دـيـبـيـرـيدـامـول (®Persantine)
- عقار إـدـوكـسـيـبـان (®Savaysa)
- عقار إـينـوكـسـيـبـارـين (®Lovenox)
- عقار فـونـدـاـبـارـينـوكـس (®Arixtra)
- عقار هـيـبـارـين (حقنة تحت الجلد)

Medicines for diabetes

If you take insulin or other medicines for diabetes, you may need to change the

dose. Ask the doctor who prescribes your diabetes medicine what to do the day before and the morning of your procedure

:Do not take these medicines the day before or the day of your procedure

.®Metformin, such as Glucophage® or Glumetza •

.®Medicine that contains metformin, such as Janumet •

الاتفاق مع أحد الأشخاص لإعادتك إلى منزلك

يجب أن يكون لديك شريك رعاية مسؤول عن إعادتك إلى منزلك بعد الإجراء. ويُقصد بشريك الرعاية المسؤول شخص يُمكنه مساعدتك في العودة إلى المنزل بأمان. ويجب أن يكون قادرًا على الاتصال بفريق الرعاية الخاص بك في حالة وجود أي شواغل. ويمكنك الترتيب لذلك قبل الإجراء بيوم واحد.

إذا لم يكن لديك شريك رعاية مسؤول ليعدك إلى منزلك، فيمكنك الاتصال بأي من الوكالات الواردة أدناه. وسوف يرسلون لك أحد الأشخاص لاصطحابك إلى منزلك. تتوفر هذه الخدمة نظير رسوم وسيتوجب عليك توفير وسيلة انتقال. ولا بأس باستخدام سيارة أجرة أو خدمة سيارات، ولكنك لا تزال بحاجة إلى شريك رعاية مسؤول لمرافقتك.

الوكالات الموجودة في نيو جيرسي
مختصو الرعاية: 877-227-4649

الوكالات الموجودة في نيويورك
مؤسسة VNS Health: 888-735-8913
مختصو الرعاية: 877-227-4649

احصل على خطاب من الطبيب إذا اقتضت الضرورة

وربما تقتضي الضرورة الحصول على خطاب إخلاء طرف قبل الخضوع للإجراء. خطاب إخلاء الطرف هو خطاب يفيد بإمكانية خضوعك للإجراء بأمان. يجب أن يتلقى مكتب طبيب مركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) الخاص بك خطاب إخلاء الطرف قبل يوم واحد على الأقل من خضوعك للإجراء.

مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع (AICD)

أخبر طبيبك في مركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) هل استخدامك لمقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع. سيتوجب عليك الحصول على خطاب إخلاء طرف من طبيب القلب الخاص بك.

الأعراض الأخرى

سيتوجب عليك الحصول على خطاب إخلاء طرف من طبيبك إذا شعرت بأي من الأعراض التالية خلال الأسابيع الستة الماضية:

• ألم في الصدر.

- صعوبة في التنفس مستجدة أو متفاقمة.
- الإغماء.

شراء المستلزمات

سيتعين عليك شراء هذه المستلزمات لتفريغ الأمعاء: تفريغ الأمعاء.

- 4 أقراص (5 ملг) من عقار بيسـكوديل (Dulcolax®) تُباع غالباًعلبة تحتوي على 10 أقراص.
- زجاجة واحدة (238 غرام) من بولي إيثيلين غليوكول (MiraLAX®).
- 64 أونصة من أي سائل شفاف لا يكون أحمر أو قرمزي أو برتقالي. حيث ستحتاج إلى خلطه مع MiraLAX.
- تعتبر المشروبات الرياضية، مثل Gatorade® أو Powerade®، خياراً جيداً. إذ تساعد المشروبات الرياضية على تعويض الشوارد التي تفقدتها خلال تفريغ الأمعاء.
- إذا كنت مصدراً بالسكري، فاحرص على تناول السوائل الصافية الخالية من السكر.

شراء مستلزمات إضافية عند اللزوم

قد تحتاج لشراء مستلزمات إضافية إذا أجبت بنعم على أي من الأسئلة التالية:

- هل تصاب كثيراً بالإمساك (تواجه صعوبة في التبرز) أو تبرز أقل من 3 مرات أسبوعياً؟
- هل تتناول أدوية مخدرة (أفيونية)؟ إذا لم تكن متأكداً، فاسأل مقدم الرعاية الصحية. تشمل الأدوية الأفيونية:
 - فيتانيل (Subsys®) وDuragesic®.
 - مورفين (DepoDur®) وDuramorph®.
 - هيدروكودون (Vicodin®).
 - أوكسيكودون (Percocet®) وOxycontin®.
- هل أجريت من قبل تنظير قولون بتفریغ أمعاء سبع (من البراز) فيم سبق؟

إذا كانت إجابتك "نعم" على أي من هذه الأسئلة، فيجب عليك شراء MiraLAX® مرة أخرى. يمكنك شراء علبة تحتوي على 10 عبوات (17 جرام) أو زجاجة مسحوق (119 جرام).

ستحتاج كذلك لشراء المزيد من السوائل حتى يكون النظام الغذائي غنياً بالسوائل. اقرأ القسم "يؤمن قبل تنظير القولون" للتعرف على أمثلة على المشروبات التي يمكنك تناولها.

قبل الإجراء بخمسة أيام

يرجى التوقف عن تناول مكملات الحديد

إذا كنت تتناول أحد مكملات الحديد، فيجب عليك التوقف عن تناوله قبل 5 أيام من العملية. قد تسبب مكملات الحديد تغيرات في لون البراز لديك، الأمر الذي قد يصعب معه على طبيبك رؤية القولون بوضوح.

3 أيام قبل تنظير القولون

النظام الغذائي قليل الألياف

اتبع نظاماً غذائياً قليلاً من الألياف قبل 3 أيام من إجراء تنظير القولون. خلال هذه المدة، لا تتناول:

- الفواكه والخضروات النيئة (غير المطهوة).
- حبات الذرة الكاملة، وتشمل الذرة المُعلبة.
- الحبوب الكاملة (مثل الشوفان والأرز البني والكينوا وخبز القمح).
- البذور(مثل الخشخاش أو السمسم).
- المكسرات.

تحدث مع ممرضة التنظير الداخلي

قبل الإجراء ببضعة أيام، ستلتقي اتصلاً من ممرضة التنظير الداخلي. وستقوم بمراجعة الإرشادات الواردة في هذا الدليل معك وتطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بسجلك الطبي.

كم ستراجع الممرضة أيضاً الأدوية التي تتناولها وتخبرك بالأدوية التي يمكنك تناولها صباح يوم الإجراء.

استخدم المساحة التالية لكتابية هذه الأدوية.

يومان قبل تنظير القولون

وأصل اتباع نظام غذائي قليل الألياف إلا في الحالات التالية:

- تكرار إصبعك بالإمساك.
- تناول أدوية مخدرة.
- خضوعك لإجراء تنظير القولون بتغريغ أمعاء سيء فيمسبق.

إذا كانت أيٌ من هذه الأمور تنطبق عليك، فتوقف عن اتباع نظام غذائي قليل الألياف واتبع تلك التعليمات:

- تناول جرعة واحدة (17 جرام) من MiraLAX 3 مرات يومياً. اخلط جرعة واحدة مع 8 أونصات من السائل في كل مرة. يمكنك تناول جرعة واحدة على الإفطار والغداء والعشاء.
- اتبع النظام الغذائي المكون من السوائل فقط. أثناء التزامك بهذا النظام، يكون مسموحاً لك بتناول ماء يلي:
 - الزبادي (دون قطع الفواكه).
 - عصائر الفاكهة بدون اللب.
 - الصودا.
 - المرق أو حساء الكريمة التي تمت تصفيتها بحيث لا تحتوي على أي قطع خضروات.
 - المكمّلات الغذائية.
 - الآيس كريم وثلج الفاكهة. لا يجب أن تحتوي هذه الأصناف على أي قطع فاكهة أو مكسرات أو فadge أو زبدة فول سوداني مختلطة بها.

يوم واحد قبل تنظير القولون

تحضير خليط MiraLAX لتغريغ الأمعاء

في صباح اليوم السابق للإجراء، اخلط كل كمية مسحوق MiraLAX البالغة 238 غرام مع 64 أونصة من سائل شفاف بدرجة حرارة الغرفة حتى يذوب المسحوق تماماً.

وبمجرد ذوبان MiraLAX، يمكنك وضع الخليط في الثلاجة. وهذا الأمر اختياري.

لا تخلط MiraLAX في وقت سابق لصباح اليوم السابق للإجراء.

الالتزام بنظام غذائي بالسوائل الصافية

سيتعين عليك اتباع نظام غذائي بالسوائل الصافية قبل الإجراء بيوم واحد. يشمل النظام الغذائي بالسوائل الصافية السوائل الشفافة فقط. يمكنك العثور على أمثلة في جدول "النظام الغذائي بالسوائل

الصـافية".

أثناء اتباع النظام الغذائي بالسوائل الصـافية:

- لا تتناول أي أطعمة صلبة.
- لا تتناول أي سوائل حمراء أو قرمذية أو برتقالية.
- «ول تناول كوب واحد (8 أونصـات) من السوائل على الأقل كل ساعـة أثناء فترة استيقاظك.
- تناول أنواعـاً مختلفة من السوائل الصـافية. ولا تكتفي بشرب المـاء والقهوة والشـاي. حيث إن ذلك يساعد في حصولك على السـعرات الحرارية الكـافية وهذا جـزء مهم من عملية الاستعداد لتنـظير القـولون.
- إذا كنت مريضاً بالسكـري، فتناول فقط السـوائل الصـافية الخـالية من السـكر وافحـص مستوى سـكر الدـم بشـكل منـظم. إذا كانت لديك أيـة أسـئلة، فاتصل بمـقدم الرـعاية الصـحيـة.

النظام الغذائي بالسوائل الصـافية	
لا يمكن تناولـه	يمكن تناولـه
<ul style="list-style-type: none"> ● أيـ شيء يحتـوي على أـجزاء من الأـطعـمة المـجفـفة أو التـوابـل. 	<ul style="list-style-type: none"> ● مرق الدـجاج أو مرق لـحم الـبـقر أو حـسـاء السـمـك الصـافيـ.
<ul style="list-style-type: none"> ● أيـ سـوائل حـمرـاء أو قـرمـذـية أو بـرـتـقـالـية. ● جـمـيع الـحلـويـات الـأـخـرى. 	<ul style="list-style-type: none"> ● الجـيلـاتـين، مثل O-Jell®. ● الثـلـوج ذات النـكـهة. ● السـكـرـ الصـلـبـ، مثل Life Savers®. ● وـحلـوى الـليمـونـ.
<ul style="list-style-type: none"> ● أيـ سـوائل حـمرـاء أو قـرمـذـية أو بـرـتـقـالـية. ● وـتشـمل العـصـائرـ والمـشـروـبـاتـ الغـازـيةـ ● والمـشـروـبـاتـ الـرـياـضـيـةـ الـحـمـرـاءـ وـالـقـرمـذـيةـ ● وـالـبـرـتـقـالـيةـ. ● العـصـائرـ ذاتـ اللـبـ. ● النـكـtarـ. ● عـصـائرـ الفـاكـهـةـ الـمـثـلـجـةـ أوـ المـشـروـبـاتـ الـمـخـفـقـةـ. ● الـحـلـيـبـ وـالـكـرـيمـةـ وـأـيـ منـتجـاتـ الـأـلـبـانـ أـخـرىـ. ● حـلـيـبـ الـمـكـسـرـاتـ وـالـحـلـيـبـ النـبـاتـيـ ● وـمـبـيـضـاتـ الـقـهـوةـ غـيرـ الـأـلـبـانـ، وـغـيرـهـ منـ بـدـائـلـ منـتجـاتـ الـأـلـبـانـ الـأـخـرىـ. ● المـشـروـبـاتـ الـكـحـولـيـةـ. 	<ul style="list-style-type: none"> ● عـصـائرـ الفـاكـهـةـ الصـافـيـةـ، مثل عـصـائرـ الـلـيـمـونـادـةـ وـالـتفـاحـ وـالـتوـتـ الـبـرـيـ الـأـبـيـضـ ● وـالـعـنـبـ الـأـبـيـضـ. ● الصـودـاـ، مثل الـزنـجـيـبـ وـسـفـنـ آـبـ®. ● وـسـبـرـايـتـ® وـالـمـيـاهـ الـمـكـرـبـنةـ. ● المـشـروـبـاتـ الـرـياـضـيـةـ، مثل Gatorade®. ● وـPowerade®. ● الـقـهـوةـ بـدـونـ حـلـيـبـ أوـ مـبـيـضـ قـهـوةـ. ● الـشـايـ بـدـونـ حـلـيـبـ أوـ مـبـيـضـ قـهـوةـ. ● المـاءـ، وـيـشـمـلـ الـمـيـاهـ الـغـازـيـةـ (ـالـفـوارـةـ) ● وـالـمـنـكـهـةـ.

ملاحظة وقت الإجراء

سيتصل بك أحد العاملين في مكتب الإدخال للمستشفى ظهراً (الساعة 12 ظهراً) في اليوم السابق للإجراء، إذا تقرر موعد إجرائك ليوم الاثنين، فسوف يتصل بك يوم الجمعة السابق للإجراء.

سيخبرك أحد أفراد فريق العمل بموعده وصولك إلى المستشفى لإجراء عمليتك. وسيذكرك أيضاً بالموقع الذي ستتوجه إليه. وإذا لم تتلق أي اتصال، فاتصل بعيادة الطبيب.

إذا كنت بحاجة لإنفاس الإجراء، فاتصل بالطبيب الذي حدد لك الموعد.

بدء تفريغ الأمعاء

الخطوة الأولى: في الساعة 4 مساءً في اليوم السابق للإجراء، تناول قرصين بيسكوديل (5 ملجم) مع كوب من الماء.

الخطوة الثانية: في الساعة 4:15 مساءً، ابدأ في تناول خليط MiraLAX.

1. في الساعة 4:15 مساءً، تناول كوباً واحداً (8 أونصات) من الخليط.
2. في الساعة 4:30 مساءً، تناول كوباً واحداً (8 أونصات) من الخليط.
3. في الساعة 4:45 مساءً، تناول كوباً واحداً (8 أونصات) من الخليط.
4. في الساعة 5:00 مساءً، تناول كوباً واحداً (8 أونصات) من الخليط.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الأكواب التي تتناولها 4 أكواب.

● عندما تنتهي من ذلك، ستبقى نصف كمية خليط MiraLAX. يتوقف وقت تناول النصف الثاني من خليط MiraLAX على موعد وصولك المحدد. اتبع التعليمات الواردة في الخطوة 3.

● تبدأ حركة الأمعاء غالباً في غضون ساعة واحدة من تناول الجرعة الأولى، ولكنه قد تستغرق وقتاً أطول لدى البعض.

○ ولا داعي للقلق إذا لم تبدأ حركة الأمعاء بعد تناول النصف الأول من كمية MiraLAX. استمر في تناول السوائل الصافية وابدأ في تناول النصف الثاني من كمية MiraLAX حسب الإرشادات.

● ضع جيل سائل/فازلين (([®]Vaseline)) أو مرهم D & A [®] على الجلد المحيط بفتحة الشرج بعد كل حركة للأمعاء. إذ يساعد ذلك في منع حدوث تهيج الجلد.

● استمر في شرب السوائل الصافية للمحافظة على ترطيب جسمك ولتنظيف القولون.

الخطوة الثالثة (إذا طلب منك الحضور للخضوع للإجراء قبل الساعة 11 صباحاً):

إذا طلب منك الحضور للخضوع للإجراء قبل الساعة 11 صباحاً، فاتبع هذه الإرشادات في الليلة السابقة للإجراء:

في الساعة 11 صباحاً، تناول قرصين بيسـكوديل بالفم مع كوب من الماء. ثم ابدأ تناول النصف الثاني من خليط MiraLAX.

1. في الساعة 11:15 مساءً، تناول كوبًا واحدًا (8 أونصات) من الخليط.
2. في الساعة 11:30 مساءً، تناول كوبًا واحدًا (8 أونصات) من الخليط.
3. في الساعة 11:45 مساءً، تناول كوبًا واحدًا (8 أونصات) من الخليط.
4. في الساعة 12 صباحاً (منتصف الليل)، تناول كوبًا واحدًا (8 أونصات) من الخليط.

احرص على استهلاك خليط MiraLAX بالكامل.

- يمكنك الاستمرار في تناول السوائل الصافية حتى 4 ساعات قبل وقت وصولك المقرر.
- لا تتناول أي طعام حتى إتمام الإجراء.

يوم إجراء تنظير القولون

الخطوة الثالثة (إذا طلب منك الحضور للخضوع للإجراء في الساعة 11 صباحاً أو بعد ذلك):

إذا طلب منك الحضور للخضوع للإجراء في الساعة 11 صباحاً أو بعد ذلك، فاتبع هذه الإرشادات صباح يوم الإجراء:

في الساعة 6 صباحاً، تناول قرصين بيسـكوديل بالفم مع كوب من الماء. ثم ابدأ تناول النصف الثاني من خليط MiraLAX.

1. في الساعة 6:15 صباحاً، تناول كوبًا واحدًا (8 أونصات) من الخليط.
2. في الساعة 6:30 صباحاً، تناول كوبًا واحدًا (8 أونصات) من الخليط.
3. في الساعة 6:45 صباحاً، تناول كوبًا واحدًا (8 أونصات) من الخليط.
4. في الساعة 7 صباحاً، تناول كوبًا واحدًا (8 أونصات) من الخليط.

احرص على استهلاك الكمية الكلية من خليط MiraLAX.

- يمكنك الاستمرار في تناول السوائل الصافية حتى 4 ساعات قبل وقت الوصول المقرر.

- لا تتناول أي طعام حتى إتمام الإجراء.

نعاط يحب تذكرها

- تناول فقط الأدوية التي تم إرشادك لتناولها صباح يوم الإجراء. تناولها مع القليل من رشفات الماء.
- لا تضع أي مُرطبات أو كريمات أو مسحوق على صدرك أو ذراعيك.
- انزع أي مجوهرات، بما في ذلك الأقراط.
- اترك جميع مقتنياتك القيمة، مثل بطاقات الائتمان والمجوهرات، في المنزل. فليست لدينا خزانات لحفظ مقتنياتك القيمة.
- إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فارتدي النظارات بدلاً منها.

ما ينبغي إحضاره

- بطاقة المحفظة الخاصة بك، إذا كنت تستخدم مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع ولم تكن بطاقة مدرجة بالفعل في الملف الخاص بك بالمستشفى.
- جهاز الاستنشاق (مثل albuterol لعلاج الربو)، إذا كنت تستخدمه.
- حفظة لنظاراتك أو طقم أسنانك إن كنت تستخدمها.
- نموذج وكيل الرعاية الصحية الخاص بك، إذا كنت قد أكمنته.

إلى أين تتجه

ستخضع للإجراء في أحد الأماكن التالية:

- جناح التنظير الداخلي في مستشفى Memorial Hospital (مستشفى MSK الرئيسي)
East 67th York Avenue 1275
New York, NY 10065
استقل المصعد B إلى الطابق الثاني. انعطف يميناً ثم ادخل مركز الجراحة والإجراءات بالمستشفى عبر الأبواب الزجاجية.

David H. Koch Center □

.East 74th St 530

New York, NY 10021

استقل المصعد إلى الطابق الثامن.

MSK Monmouth □

تفصل بزيارة الموقع www.msk.org/parking للتعرف على معلومات حول إيقاف السيارة في هذه المواقف.

ما الإجراءات المتوقعة

سيطلب منك العديد من أعضاء فريق الرعاية الصحية ذكر اسمك وتاريخ ميلادك وتهجي حروفهم. وهذا الأمر حفاظاً على سلامتك. علماً بأنه قد يخضع الأشخاص ذوي الأسماء المماثلة للإجراءات في نفس اليوم.

عندما يحين وقت تغيير ملابسك للخضوع للإجراء، ستحصل على سرير المستشفى وروب وجوارب مضادة للتزلق لارتدائه.

ستلتقي بطبيبك قبل الإجراء. وسيوضح لك الإجراء ويجيب على أيهـة أسئلة تطرحـهـ.

ستقابل أيضاً طبيب التخدير الخاص بك. وسيراجع سجلك الطبي معك ويتناقض معك بشأن نوع التخدير (الدواء المُنـوـم) الذي ستتلـقاـهـ.

وسيصطحبك أحد أعضاء الفريق لغرفة الإجراء عندما يحين وقت إجراء تنظير القولون. سوف تستلقي على جانبك الأيسر مع ثني ركبتيك.

وسيدخل مقدم الرعاية الصحية قُنية وريدية في أحد الأوردة لديك، تكون غالباً في ذراعك أو يدك. وستحصل على التخدير عبر هذه القُنية الوريدية ثم تخلد إلى النوم. بعد أن تصبح تحت تأثير المخدر، سيبدأ طبيبك في عمل الإجراء.

سيدخل الطبيب منظار القولون في منطقة المستقيم لديك. ويتصـلـ منظار القولون بشـاشـةـ فيديـوـ. وهذا يتيح للطبيب رؤية القولون من الداخل. وسيستخدم الطبيب الهواء والسائل لتحرـيكـ منظارـ القولـونـ عبرـ القـولـونـ وفيـ الوقتـ ذاتـهـ يـبحثـ عنـ أيـ شـيءـ غيرـ مـعتـادـ قدـ يـظـهـرـ علىـ شـاشـةـ الفـيديـوـ.

يستغرق هذا الإجراء عـدةـ أقلـ منـ 60ـ ثـانيةـ (سـاعةـ وـاحـدةـ).

الأسئلة الشائعة المكررة

أتناول خليط تفريغ الأمعاء وقد بدأت أصـبـ بالإـسهـلـ والـبرـازـ المـئـيـ قبلـ الـانتـهـاءـ منـ الخليـطـ. هلـ أناـ بـحـاجـةـ لـتـناـولـ باـقـيـ الخليـطـ؟

نعم. يجب عليك تناول كمية الخليط بالكامل لتنظيف القولون تماماً من أجل إجراء تنظير القولون بشكل آمن وكمال.

أشعر بالرغبة في التقيؤ (الغثيان) أو تقيّات بالفعل بعد تناول خليط تفريغ الأمعاء. ماذا ينبغي عليّ فعله؟

قد يصـاب البعض بالغثيان أثناء تناول خليط تفريغ الأمعاء. لمسـاعدتك في التغلب على ذلك، جرب خلط مسحوق MiraLAX بالسوائل الشفافة التي تحب تناولـها.

وإذا شعرت بالقيء، فيجب عليك تناول الخليط ببطء وأخذ فترة راحة. وهذا يعني أن عليك التوقف عن تناول السـائل لمدة 30 إلى 45 دقيقة للسمـاح بإفراغ معدتك. وخلال فترة الراحة، يمكنك وضع سـائل تفريغ الأمعاء في الثلاجة إن كنت تفضل تناولـه بارداً. بعد فترة الراحة، حول تناول السـائل ببطء مرة أخرى. استخدم شفاطة إن أمكن ذلك.

إذا تقيـيات بالفعل، فانتظر لمدة 30 إلى 45 دقيقة. إذا كان لديك دواء مضاد للغثيان في المنزل، فيمكنك تناول جرعة واحدة قبل بدء تناول سـائل تفريغ الأمعاء مجدداً. ويمكنك تناول أي سـوائل شفافة تحب تناولـها للحفاظة على ترتيب جسمك. من المهم أن تتناول كمية السـائل بالكامل لتنظيف القولون تماماً من أجل إجراء تنظير القولون بشكل آمن وكمال.

بعد إجراء تنظير القولون

سوف تستمر الممرضة في مراقبة معدل نبض القلب والتنفس وضغط الدم لديك. يشعر الكثيرون بانتفاخ ويصـابون بتشنجات معدية بعد إجراء تنظير القولون. وهذا أمر طبيعي ولسوف يزول بخروج الريح.

بمجرد أن تفيق تماماً، ستندفع الممرضة القـنية الوريدية. إذا كان هناك شخص ينتظر بصحبتك، فستوضح الممرضة إرشادات الخروج من المستشفى لكليكمـ قبل التوجه إلى المنزل.

في المنزل

- قد يُسمح لك بالبدء بتناول الأطعمة الخفيفة بمجرد خروجك من المستشفى. تجنب الأطعمة الحريفة والغنية بالدهون والمقلية في باـدي الأمر. انتقل تدريجياً إلى نظامك الغذائي المعـتاد. قد يتطلب منك الطبيب التقيـيد بنظام غذائي معين لمدة معينة.
- تجنب تناول أي مشروبات كحولية لمدة 24 ساعة بعد الإجراء.
- ويمكنك العودة لأداء أنشـطـتك المعتـادـة بعد مرور 24 ساعة على خضـوعـك للـإجراء.

إذا كان الطبيب قد حصل على خـزـعة، فمن الطبيعي أن يحدث لك بعض النـزـيفـ من المستقيمـ. ولا ينبغي أن تتجاوز كمية النـزـيفـ بـضعـ قطرـاتـ منـ الدـمـ. كـمـ يجب أن يتـوقفـ النـزـيفـ خـلالـ 24ـ ساعـةـ منـ

الإجراء.

بعد إجراء تنظير القولون، من الطبيعي ألا تنتظم حركة الأمعاء أو تكون مختلفة عن اعتدت عليه. وقد تستمر هذه الحالة لمدة أسبوع بحد أقصى بعد الإجراء.

متى يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية

عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية في الحالات التالية:

- إذا ارتفعت درجة حرارتك إلى 101 فهرنheit (38.3 سيلزيوس) أو أعلى.
- إذا شعرت بألم أو انتفاخ شديد في المعدة.
- إذا حدث لك نزيف في المستقيم استمر لمرة تجاوزت 24 ساعة.
- إذا حدث نزيف بين فترات حركة الأمعاء.
- إذا شعرت بالضعف أو الإغماء أو الغثيان.
- إذا حدث لك نزيف غير من المستقيم.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

How To Prepare for Your Colonoscopy Using MiraLAX® - Last updated on May 20, 2024
جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركزMemorial Sloan Kettering لعلاج السرطان