



রোগী এবং শুশরুষাকারীর শিক্ষা

আপনার আপার-এন্ডাসেক্যাপি সম্পর্কের

এই তথ্য আপনাকে আপনার আপার এন্ডাসেক্যাপির জন্য পর্স্তুত হতে সহায়তা করবে। আপার এন্ডাসেক্যাপি হলো আপনার খাদয়নালী (খাদয় পাইপ), পাকস্থলী এবং আপনার ক্ষুদুরান্তের পর্থম অংশটি দেখার জন্য একটি পরীক্ষা।

আপনার আপার এন্ডাসেক্যাপির সময়, আপনার স্বাস্থ্যসেবা পর্দানকারী এন্ডাসেক্যাপ নামে একটি নমনীয় নল ব্যবহার করবেন। এটি তাদের একটি ভিডিও সিক্রেনে আপনার খাদয়নালী, পাকস্থলী এবং ক্ষুদুরান্তের ভিতরের অংশ দেখতে দেয়। এছাড়াও তারা একটি ছোট টিসুয়ার নমুনা নিতে পারে বা একটি পলিপ (টিসুয়ার বৃদ্ধি) অপসারণ করতে পারে। এই পর্কিরয়াটিকে বায়োপসি বলা হয়।

আপনার পর্কিরয়াটি শুরুর 1 সপ্তাহ আগে

আপনার ওষুধ সম্পর্কের জিজ্ঞাসা করুন

পর্কিরয়াটির আগে আপনাকে আপনার নিয়মিত কিছু ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। কোন ওষুধগুলো বন্ধ করলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না সে সম্পর্কের আপনার স্বাস্থ্যসেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন।

নিচে আমরা কিছু সাধারণ উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করেছি, তবে এর পাশাপাশি আরো আছে। আপনার পরিষেবা পর্দানকারী দলের কাছে যেন

আপনি যেসকল ওভার-দয়-কাউন্টার এবং পের্সকির্পশনের ওষুধ গর্হণ করে সেগুলোর সকল তথ্য থাকে তা নিশ্চিত করুন। পের্সকির্পশনের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি শুধুমাত্র একজন সব্স্থিয়েবা পর্দানকারীর পের্সকির্পশনের মাধ্যমে পেতে পারেন। ওভার-দয়-কাউন্টারের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি পের্সকির্পশন ছাড়াই কিনতে পারেন।



সঠিক পদ্ধতিতে আপনার পর্কির্যার আগে আপনার ওষুধ গর্হণ করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি না করেন, তাহলে আমাদেরকে আপনার পর্কির্যা পুনঃনির্ধারণ করতে হতে পারে।

অ্যানিটকোয়াগুলফ্যান্টস (রক্ত পাতলা করে)

ব্লাড থিনার হলো রক্ত পাতলা করার ঔষধ যা আপনার রক্ত জমাট বাঁধার পর্কির্যায় বাঁধা দেয়। হাটৱ অ্যাটাক, স্ট্রাক বা রক্ত জমাট বাঁধা জনিত অন্যান্য সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ব্লাড থিনার দেয়া হয়।

আপনি যদি ব্লাড থিনার সেবন করেন, তবে যারা এই পর্কির্যার সময় নির্ধারণ করেছেন এবং আপনাকে এটা নেয়ার পরামশর দিয়েছেন সেইসব সব্স্থিয়েবা পর্দানকারীকে অবহিত করুন। আপনার পদ্ধতির আগে তাদের কী করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করুন। এই পর্কির্যা শুরুর কিছুদিন পূর্বে তারা হয়তো আপনাকে ঔষধ সেবন বন্ধ করার পরামশর দিতে পারেন। পর্কির্যার ধরন এবং ব্লাড থিনার নেয়ার উদ্দেশ্যের উপর এটা নিভর্র করো।

আমরা নিচে কিছু সাধারণ রক্ত পাতলা করার উদাহরণ তালিকাভুক্ত করেছি। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী

দল আপনার গর্হণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কের জানে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদসেয়ের সাথে কথা না বলে রক্ত পাতল করা গর্হণ বন্ধ করবেন না।

- এপিক্সাবান (Eliquis®)
- অফ্সপিরিন
- সেলেকক্সিব (Celebrex®)
- সিলোস্টাজল (Pletal®)
- ক্লপিডগ্রেল (Plavix®)
- দ্রবিগাতর্ন (Pradaxa®)
- ডালেটপারিন (Fragmin®)
- ডিপাইরিডামোল (Persantine®)
- এডোক্সাবান (Savaysa®)
- এনোক্সাপারিন (Lovenox®)
- ফন্ডাপারিনাক্স (Arixtra®)
- হেপারিন ইনজেকশন (শট)
- মেলোক্সিকাম (Mobic®)
- ননস্টেরয়েডাল অফ্নিট-ইনফেলমেটেরি ডরাগ্স (NSAID), যেমন আইবুপেরাফেন (Advil®, Motrin®) এবং নফ্পেরাকেসন (Aleve®)
- পেন্টক্সফাইলাইন (Trental®)
- পর্সুগের্ল (Effient®)
- রিভারোক্সাবান (Xarelto®)
- সালফাসালাজিন (Azulfidine®, Sulfazine®)
- টিকাগের্লর (Brilinta®)
- টিএজ্জাপারিন (Innohep®)
- ওয়ারফারিন (Jantoven®, Coumadin®)

অন্যান্য ঔষধ এবং সাপিলমেন্টও আপনার রক্ত জমাট বাঁধার পরক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ভিটামিন ই, মাছের তেল, নন-স্টেরইডাল আনিট-ইনফেলময়াটেরি ডরাগ্স (NSAIDs)। আইবুপেরাফেন (Advil®, Motrin®) এবং নফ্পেরাকেসন (Aleve®) হ'ল

NSAIDs-এর উদাহরণ, তবে এমন আরও অনেকগুলি আছে।

How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids) পড়ুন। পর্কিনস্যা শুরুর পূর্বের কোন কোন ঔষধ এবং সাপিলমেন্ট সেবন এড়িয়ে চলতে হবে, সেগুলো জানতে এটা আপনাকে সাহায্য করবে।

ডায়াবেটিসের ওষুধ

যদি আপনি ইনসুলিন বা অন্যান্য ডায়াবেটিসের ওষুধ গর্হণ করেন, তাহলে আপনার পদ্ধতি নির্ধারণকারী সব্স্থিয়সেবা পর্দানকারী এবং এটি নির্ধারণকারী সব্স্থিয়সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনার পদ্ধতির আগে তাদের কী করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করুন। আপনার এটি গর্হণ বন্ধ করতে হতে পারে অথবা সব্ভাবিকের চেয়ে ভিন্ন ডোজ (পরিমাণ) নিতে হতে পারে। আপনার পদ্ধতির আগে আপনাকে বিভিন্ন খাওয়া এবং পানীয়ের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হতে পারে। আপনার সব্স্থিয়সেবা পর্দানকারীর নির্দেশাবলি মেনে চলুন।

আপনার চিকিৎসার সময় আপনার সেবাদানকারী দল আপনার রকেত শক্তির মাত্রা পরীক্ষা করবে।

ওজন হ্রাস করার ওষুধ

যদি আপনি ওজন কমানোর জন্য ওষুধ খান (যেমন GLP-1 ওষুধ), তাহলে আপনার পদ্ধতি নির্ধারণকারী সব্স্থিয়সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনার পদ্ধতির আগে তাদের কী করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করুন। আপনার পদ্ধতির আগে এটি গর্হণ বন্ধ করতে হতে পারে, বিভিন্ন খাওয়া-দাওয়ার নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হতে পারে, অথবা উভয়ই।

আপনার সব্স্থিয়সেবা পর্দানকারীর নির্দেশাবলি মেনে চলুন।

ওজন কমানোর কিছু ওষুধের উদাহরণ আমরা নিচে তালিকাভুক্ত করেছি।
আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল
আপনার গর্হণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কের জানে। এর মধ্যে কিছু
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু
কখনও কখনও শুধুমাত্র ওজন কমানোর জন্য নির্ধারিত হয়।

- Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)
- Dulaglutide (Trulicity®)
- Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®)
- Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)

আপনার AICD থাকলে আপনার সব্স্থিয়সেবা পর্দানকারীকে বলুন
আপনার একটি অটোমেটিক ইমপ্লয়নেটবেল কাডির্ওভাটর্স-
ডিফিবির্লেটর (AICD) থাকলে তা আপনার MSK সব্স্থিয়সেবা
পর্দানকারীকে বলুন।

পর্যোজন হলে, আপনার ডাক্তারের থেকে একটি চিঠি করিয়ে নিন

- আপনার একটি অটোমেটিক ইমপ্লয়নেটবেল কাডির্ওভাটর্স-
ডিফিবির্লেটর (AICD) থাকলে, পর্কির্যাটির আগে আপনাকে
আপনার কাডির্ওলজিস্টের (হাটের ডাক্তার) থেকে একটি ছাড়পত্র
নিতে হবে। ছাড়পত্র হল একটি পত্র যাতে লেখা থাকে যে আপনি
নিরাপদে পর্কির্যাটি করতে পারবেন।
- আপনার কোনো বুকে ব্যাথা, মাথা ঘোরা, শব্সকষ্ট হলে অথবা গত 6
সপ্তাহের মধ্যে আপনি অজ্ঞান হয়ে থাকলে, আপনাকে আপনার

ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং আপনার পর্কিরয়ার আগে আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র সংগরহ করতে হবে।

আপনার MSK ডাক্তারের অফিসে আপনার পর্কিরয়ার অন্তত 1 দিন আগে এই ছাড়পত্রটি পোঁছে যেতে হবে।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে ঠিক করে রাখুন

আপনার পর্কিরয়ার পরে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে অবশ্যই একজন দায়িতব্বান পরিচয়রা সহযোগীকে থাকতে হবে। দায়িতব্বান পরিচয়রা সহযোগী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন। তাদের কোনো উদ্বেগ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচয়রাকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার পর্কিরয়ার আগের দিন নিশ্চিতভাবে বিষয়টির পরিকল্পনা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার যদি দায়িতব্বান পরিচয়রা সহযোগী না থাকে তবে নিচের একটি এজেন্সিকে কল করুন। আপনাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জন্য চাজর করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। ট্যাক্সি বা গাড়ি পরিষেবা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচয়রা সহযোগীকে থাকতে হবে।

নিউ ইয়েকের এজেন্সিসমূহ

VNS হেলথ: 888-735-8913

নিউ জাসিরতে এজেন্সিসমূহ

পরিচয়রাকারী ব্যক্তিবগর: 877-227-4649

পরিচয়রাকারী ব্যক্তিবগর: 877-
227-4649

আপনার পর্কির্যাটি শুরুর 3 দিন আগে

একজন এন্ডোস্কোপি নাসর আপনার পর্কির্যার 3 দিন আগে সকাল 8টা থেকে সন্ধিয়া 6টার মধ্যে আপনাকে কল করবেন। তারা এই গাইডের নির্দেশাবলী আপনার সাথে প্যারালোচনা করবেন এবং আপনার চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে পর্শন জিজ্ঞাসা করবেন। নাসর আপনার ওষুধগুলি ও প্যারালোচনা করবেন। তারা আপনাকে বলে দেবেন পর্কির্যা করার দিন সকালে কোন ওষুধগুলি থেতে হবে।

সেগুলি লিখে রাখতে নিচের জায়গাটি ব্যবহার করুন।

আপনার পর্কির্যাটি শুরুর আগের দিন

আপনার পর্কির্যার সময়টি নোট করুন

আপনার পর্কির্যার আগের দিন দুপুর 12টার পরে একজন কমরী সদস্য আপনাকে ফোন করবেন। আপনার পর্কির্যাটির জন্য আপনাকে কখন আসতে হবে তা সেই কমরী সদস্য আপনাকে বলে দেবেন। কোনো সোমবার আপনার পর্কির্যাটির দিন স্থির হলে, তারা আপনাকে তার আগের শুক্রবার ফোন করবেন। আপনি কল না পেয়ে থাকলে, আপনার সব্স্থিসেবা পর্দানকারীর অফিসে ফোন করুন।

যদি আপনার পর্কিন্যা বাতিল করতে হয়, তাহলে GI সময়সূচী নির্ধারণের অফিসে 212-639-5020 নম্বরে কল করুন।

খাওয়া-দাওয়ার নির্দেশনা



আপনার সাজরারির আগের রাতে, বিশেষ করে মধ্যরাত (রাত 12টা) থেকে খাওয়া বন্ধ করুন। এর মধ্যে শক্ত কষান্ডি এবং গামও অন্তভুরুক্ত।

কখন খাওয়া বন্ধ করবেন, সে ব্যাপারে আপনার সব্স্থসেবা পর্দানকারীরা অন্য নির্দেশনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাদের নির্দেশনা মেনে চলুন। কিছু লোকের ক্ষেত্রে তাদের সাজরারি শুরুর আগে দীঘর সময় ধরে উপবাস (না খাওয়া) থাকতে হয়।

আপনার পর্কিন্যাটি শুরুর দিন

পান করার নির্দেশনা

আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে এবং মধ্যরাতের মধ্যে শুধুমাত্র নিচের তালিকাভুক্ত তরল পান করুন। আর কোনো কিছু খাবেন না বা পান করবেন না। আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে পান করবেন না।

- জল।
- আপেলের সব্চ্ছ জুস, আঙ্গুরের সব্চ্ছ জুস বা কর্যানবেরির সব্চ্ছ জুস।
- Gatorade বা Powerade।
- ব্লয়াক কফি বা সাধারণ চা। চিনি দিলেও কোনো সমস্যা নেই। আর কিছু দেবেন না।
 - কোনো ধরনের দুধ বা কির্মার দেবেন না। এর মধ্যে উদ্ভিজ্জ দুধ

এবং কির্মার অন্তভুর্ক্ত।

- মধু মেশাবেন না।
- সব্দযুক্ত কোনো সিরাপ যোগ করবেন না।

আপনার ডায়াবেটিস থাকলে, পানীয়তে আপনার চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ রাখুন। আপনি যদি এইসব পানীয়ের চিনি-ছাড়া, কম-চিনি বা কোনো চিনি নেই এমন উপাদানগুলো পান করেন তাহলে আপনার রক্তের গ্লুকোজের মাতরা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে।

সাজরারির আগে শরীরে জল থাকা ভালো তাই, ত্বরণ পেলে পান করুন।
পর্যোজনের চাইতে বেশি পান করবেন না। সাজরারির সময় আপনি শিরায় (IV) তরল পাবেন।



আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে পান করবেন না। পানিও এতে অন্তভুর্ক্ত।

কখন পান করা বন্ধ করবেন, সে ব্যাপারে আপনার সব্স্থিসেবা পর্দানকারীরা অন্য নির্দেশনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাদের নির্দেশনা মেনে চলুন।

যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে

- আপনার পর্কির্যার দিন সকালে আপনার সব্স্থিসেবা পর্দানকারী আপনাকে যে ওষুধগুলি খেতে বলেছে শুধু সেগুলিই খান। কয়েক চুমুক জল দিয়ে সেগুলি খান।
- কোনো ধরনের লোশন, কির্ম, পাউডার, মেকআপ, পারফিউম বা কোলোন ব্যবহার করবেন না।

- শরীরে ফুটো করে পরা যে কোনো গহনা সহ সমস্ত গহনা খুলে রাখুন।
- মূলঘ্রান বস্তু (যেমন - কেরডিট কাডর এবং গহনা) বাড়িতে রেখে যান।
- আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন তাহলে তার পরিবর্তে চশমা পরুন।

কী আনতে হবে

- পঞ্চ এবং কির্ম সহ বাড়িতে আপনি যা যা ওষুধ খান তার একটি তালিকা।
- আপনার যদি কোনো রেসকিউ ইনহেলার (যেমন- হাঁপানির জন্য আলবুটেরল) থাকে তাহলে সেটি।
- আপনার চশমার জন্য একটি কেস।
- আপনার হেলথ কেয়ার পর্কিস ফরম, যদি আপনার পূরণ করা থাকে।

কোথায় যাবেন

আপনার আপার এন্ডাসেকাপি এই অবস্থানগুলির মধ্যে একটিতে হবে:

- ডেভিড এইচ. কোচ সেন্টার
530 East 74th সড়ক
নিউ ইয়র্ক, NY 10021
লিফট দিয়ে 8th ফ্লারে যান।
- মেমোরিয়াল হাসপাতালের এন্ডাসকপি সুট (MSK-এর পর্ধান হাসপাতাল)
1275 ইয়র্ক, এভিনিউ (East 67th and East 68th সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে)
নিউ ইয়র্ক, NY 10065
লিফট B দিয়ে 2nd ফ্লারে যান। ডানে বাঁক নিন এবং কাঁচের দরজা

ঠেলে এনেডাসেক্রাপি/সাজির্কয়াল ডে হাসপাতাল সুইটে টুকুন।

- **MSK Monmouth**

480 রেড হিল রোড

মিডল টাউন, NJ 07748

সমস্ত MSK অবস্থানে পাকিরং বিষয়ক তথ্য এবং দিকনিদেরশনা পেতে www.msk.org/parking ভিজিট করুন।

কী আশা করতে পারেন

আপনি পৌঁছলে

আপনি পৌঁছে গেলে, আপনাকে আপনার নাম, নামের বানান এবং জন্ম তারিখ অনেকবার বলতে বলা হবে। এটি আপনার নিরাপত্তার জন্য। একই নামের বা অনুরূপ নামের ব্যক্তিবগের সেই একই দিনে পর্কিংয়া থাকতে পারে।

হাসপাতালের গাউন পরিধান করার পর, আপনি আপনার নামের সাথে দেখা করবেন। তারা আপনার শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) কয়েটার লাগাতে পারে, সাধারণত আপনার হাতে বা বাহুতে। আপনার পর্কিংয়া চলাকালীন আপনাকে অ্যানেস্থেসিয়া (আপনার ঘুমানোর ওষুধ) দিতে IV ব্যবহার করা হবে। আপনার পর্কিংয়াটির আগে আপনি IV এর মাধ্যমে তরলও পেতে পারেন।

আপনার পর্কিংয়ার আগে আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি কথা বলবেন। তারা পর্কিংয়াটি ব্যাখ্যা করবেন এবং আপনার পর্শেন্স উত্তর দেবেন।

আপনার পর্কিংয়াটির সময়

আপনার পর্কিংয়ার সময় হলে, আপনি পর্কিংয়া কক্ষে যাবেন এবং

পরীক্ষার টেবিলের উপর শোয়ানো হবে। আপনার সব্স্থিসেবা
পর্দানকারী আপনার হাটর, শব্সপর্শব্স এবং রক্তচাপ মনিটর করার
জন্য সরঞ্জাম সেট আপ করবেন। আপনি আপনার নাকের নিচে
অবস্থিত একটি পাতলা নলের মাধ্যমে অক্সিজেন পাবেন। আপনার দাঁত
রক্ষা করার জন্য আপনার দাঁতের উপরে মাউথ গাড়ু পরানো হবে।

আপনাকে আপনার IV এর মাধ্যমে অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হবে, যা
আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আপনি ঘুমিয়ে গেলে, আপনার ডাক্তার
আপনার মুখ দিয়ে এন্ডোস্কাপ প্রবেশ করবেন। এটি আপনার
খাদ্যনালীতে, আপনার পাকস্থলী এবং আপনার ক্ষুদ্রনেত্র চলে যাবে।
পর্যোজনে আপনার ডাক্তার টিসুয়ার নমুনা পেতে বায়োপসি করবেন।
তারপর তারা এন্ডোস্কাপ অপসারণ করবেন।

আপনার পর্কির্যাটির পরে

আপনার নাসর আপনার হাটর, শব্সপর্শব্স এবং রক্তচাপ কনিটর করে
যাবেন। আপনি আপনার গলায় বয়থা অনুভব করতে পারেন। আপনি যদি
তা করেন তবে এই বয়থা 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে চলে যাবে।

আপনি পুরোপুরি জেগে ওঠার পরে, আপনার নাসর আপনার IV খুলে
দেবেন। আপনি বাড়িতে যাওয়ার আগে আপনার নাসর আপনাকে আপনার
ডিসচার্জের নিদেরশাবলী বুঝিয়ে দেবেন।

বাড়িতে

আপনার পর্কির্যার পরে 24 ঘণ্টা (1 দিন) কোনো অ্যালকোহলযুক্ত
পানীয় পান করবেন না।

কখন আপনার সব্স্থিসেবা পর্দানকারীকে ফোন করবেন

আপনার নিম্নলিখিত কোনো সমস্যা হলে আপনার সব্স্থিয়্সেবা
পর্দানকারীকে ফোন করুন:

- ১০১ °ফা (৩৮.৩ °সে) বা তার বেশি জব্র
- ঝুকে বয়থা বা শব্সকষ্ট (শব্স নিতে কষ্ট হয়)
- আপনার তলপেটে (পেট) গুরুতর বয়থা, কঠোরতা বা ফোলাভাব
- আপনার বমিতে রক্ত (কোনো কিছু উগরে দিচ্ছন)
- দুর্বলতা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অথবা উভয়ই
- অন্য কোনো পর্শন বা উদেব্গ

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

আরো রিসোসের জন্য www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুর্যাল লাইবেরৰি দেখুন।

About Your Upper Endoscopy - Last updated on November 24, 2025
Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতৃক সবৰ্স্বত্ব সংরক্ষিত