



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

# Πώς να προετοιμαστείτε για την κολonosκόπησή σας με το MiraLAX®

Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για την κολonosκόπησή σας με πολυαιθυλενογλυκόλη (MiraLAX).

## Σχετικά με την κολonosκόπησή σας

Η κολonosκόπηση είναι μία εξέταση που επιτρέπει στον γιατρό σας να δείτε μέσα στο κόλον (παχύ έντερο). Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει ένα κολonosκόπιο για να δει μέσα στο κόλον σας. Πρόκειται για έναν εύκαμπτο σωλήνα με κάμερα στο άκρο. Οι εικόνες θα εμφανίζονται σε ένα μόνιτορ.

Κατά τη διαδικασία σας, ο γιατρός σας μπορεί:

- Να αφαιρέσει ένα μικρό δείγμα ιστού (βιοψία) για εξέταση.
- Να αφαιρέσει έναν πολύποδα (ανάπτυξη ιστού).
- Να βγάλει φωτογραφίες του εσωτερικού στο κόλον σας.

Το κόλον σας πρέπει να είναι κενό για τη διαδικασία σας. Ο γιατρός σας μπορεί να μην είναι σε θέση να δει πολύποδες ή άλλα προβλήματα εάν υπάρχουν κόπρανα (κακά) μέσα στο κόλον σας. Μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε και πάλι στην ίδια διαδικασία εάν συμβεί κάτι τέτοιο.

Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, επικοινωνήστε με το ιατρείο του γιατρού σας.

## 1 εβδομάδα πριν από την

# κολοσκόπησή σας

## Ask about your medicines

You may need to stop taking some of your usual medicines before your procedure. Talk with your healthcare provider about which medicines are safe for you to stop taking.

**We've included some common examples below, but there are others. Make sure your care team knows all the prescription and over-the-counter medicines you take.** A prescription medicine is one you can only get with a prescription from a healthcare provider. An over-the-counter medicine is one you can buy without a prescription.



It is very important to take your medicines the right way in the days leading up to your procedure. If you don't, we may need to cancel your procedure.

### **Αντιπηκτικά (αντιθρομβωτικά αίματος)**

Αντιθρομβωτικά αίματος είναι φάρμακα που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο πήζει το αίμα σας. Εάν λαμβάνετε αντιθρομβωτικό αίματος, όπως για τη θεραπεία θρόμβων αίματος ή για την αποτροπή καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού, ρωτήστε τον γιατρό που το συνταγογράφησε για το πότε μπορείτε να σταματήσετε να το παίρνετε.

Examples of common blood thinners are listed below. There are others, so be sure your care team knows all the medicine you take. **Do not stop taking your blood thinner without talking with a member of your care team.**

- Apixaban (Eliquis®)
- Aspirin
- Celecoxib (Celebrex®)
- Cilostazol (Pletal®)
- Clopidogrel (Plavix®)
- Meloxicam (Mobic®)
- Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), such as ibuprofen (Advil®, Motrin®) and naproxen (Aleve®)

- Dabigatran (Pradaxa®)
- Dalteparin (Fragmin®)
- Dipyridamole (Persantine®)
- Edoxaban (Savaysa®)
- Enoxaparin (Lovenox®)
- Fondaparinux (Arixtra®)
- Heparin (shot under your skin)
- Pentoxifylline (Trental®)
- Prasugrel (Effient®)
- Rivaroxaban (Xarelto®)
- Sulfasalazine (Azulfidine®, Sulfazine®)
- Ticagrelor (Brilinta®)
- Tinzaparin (Innohep®)
- Warfarin (Jantoven®, Coumadin®)

## Medicines for diabetes

If you take insulin or other medicines for diabetes, you may need to change the dose. Ask the doctor who prescribes your diabetes medicine what to do the day before and the morning of your procedure.

Do not take these medicines the day before or the day of your procedure:

- Metformin, such as Glucophage® or Glumetza®.
- Medicine that contains metformin, such as Janumet®.

## Κανονίστε να υπάρχει κάποιος για να σας μεταφέρει στο σπίτι

Πρέπει να έχετε ένα υπεύθυνο άτομο για τη φροντίδα σας για να σας μεταφέρει στο σπίτι μετά τη διαδικασία σας. Ένα υπεύθυνο άτομο για τη φροντίδα σας είναι κάποιος που μπορεί να σας βοηθήσει να φτάσετε στο σπίτι με ασφάλεια. Θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσει με την ομάδα φροντίδας σας εάν έχουν κάποιους προβληματισμούς. Φροντίστε να το έχετε προγραμματίσει πριν από την ημέρα της επέμβασής σας.

Εάν δεν έχετε κάποιο υπεύθυνο άτομο για την φροντίδα σας για να σας πάει στο σπίτι, καλέστε μία από τις παρακάτω υπηρεσίες. Θα στείλουν κάποιον για να έρθει στο σπίτι μαζί σας. Υπάρχει μία χρέωση για αυτή την υπηρεσία και θα χρειαστεί να παρέχετε το μέσο μεταφοράς. Δεν υπάρχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσετε ταξί ή υπηρεσία μεταφοράς, αλλά και πάλι

Θα χρειαστείτε ένα υπεύθυνο άτομο για την φροντίδα σας.

**Υπηρεσίες στη Νέα Υόρκη**

VNS Health: 888-735-8913

Caring People: 877-227-4649

**Υπηρεσίες στο Νιου Τζέρσεϊ**

Caring People: 877-227-4649

## **Λάβετε μία επιστολή από τον ιατρό σας, εάν χρειαστεί**

Μπορεί να χρειαστεί να λάβετε μία επιστολή σχετικά με την καταλληλότητα για τη διαδικασία πριν τη διαδικασία σας. Η επιστολή καταλληλότητας για επέμβαση είναι μία επιστολή η οποία λέει ότι μπορείτε να υποβληθείτε με ασφάλεια στην επέμβαση. Το ιατρείο του γιατρού σας στην MSK πρέπει να λάβει την επιστολή σας σχετικά με την καταλληλότητα για τη διαδικασία τουλάχιστον 1 ημέρα πριν τη διαδικασία σας.

## **Αυτόματος εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτή (AICD)**

Πείτε στον ιατρό σας στην MSK εάν έχετε AICD. Θα χρειαστείτε μία επιστολή καταλληλότητας για επέμβαση από τον καρδιολόγο σας.

## **Άλλα συμπτώματα**

Θα χρειαστείτε μία επιστολή καταλληλότητας για επέμβαση από τον ιατρό σας, εάν έχετε κάποιο από τα παρακάτω κατά τις τελευταίες 6 εβδομάδες:

- Πόνος στο στήθος.
- Δυσκολία στην αναπνοή που είναι καινούργια ή επιδεινώθηκε.
- Λιποθυμία.

## **Αγορά προμηθειών**

Θα χρειαστεί να αγοράσετε αυτές τις προμήθειες για την προετοιμασία εντέρου. Η προετοιμασία εντέρου λέγεται και προετοιμασία.

- 4 (5 mg) δισκία βισακοδύλη (Dulcolax®). Συνήθως πωλούνται ως κουτί των 10 δισκίων.
- 1 φιάλη (238-gram) με πολυαιθυλενογλυκόλη (MiraLAX®).

- 1892 ml κάποιου διαυγούς υγρού που δεν είναι κόκκινο, μοβ ή πορτοκαλί. Θα χρειαστεί να το αναμείξετε με το MiraLAX. Διατηρείτε το σε θερμοκρασία δωματίου.
  - Μια καλή επιλογή είναι ένα αθλητικό ρόφημα, όπως το Gatorade® ή το Powerade®. Τα αθλητικά ροφήματα θα συμβάλλουν στην υποκατάσταση των ηλεκτρολυτών που θα χάσετε κατά την προετοιμασία εντέρου.
  - Εάν πάσχετε από διαβήτη, φροντίστε να λαμβάνετε διαυγή υγρά χωρίς ζάχαρη.

## **Αγοράστε επιπλέον προμήθειες, εάν χρειαστεί**

Μπορεί να χρειαστεί να αγοράσετε επιπλέον προμήθειες, εάν απαντήσετε ναι σε κάποια από τις παρακάτω ερωτήσεις:

- Έχετε την τάση να έχετε δυσκοιλιότητα (δυσκολεύεστε να κάνετε κακά) ή έχετε λιγότερες από 3 κινήσεις εντέρου κάθε εβδομάδα;
- Λαμβάνετε ναρκωτικά (οπιοειδή) φάρμακα; Εάν δεν είστε σίγουροι, ρωτήστε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας. Στα οπιοειδή περιλαμβάνονται:
  - Φαιντανύλη (Duragesic®, Subsys®).
  - Μορφίνη (DepoDur®, Duramorph®).
  - Υδροκωδόνη (Vicodin®).
  - Οξυκωδόνη (Oxycontin®, Percocet®).
- Έχετε υποβληθεί σε κολονοσκόπηση με κακή προετοιμασία (κόπρανα στο κόλον σας) στο παρελθόν;

**Εάν απαντήσετε ναι σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, θα χρειαστεί να αγοράσετε επιπλέον MiraLAX.** Μπορείτε να αγοράσετε ένα κουτί με 10 πακέτα (17 γραμμάρια) ή 1 φιάλη σκόνης (119 γραμμάρια).

Θα χρειαστεί επίσης να αγοράσετε επιπλέον υγρά για πλήρη υδρική δίαιτα. Βλ. ενότητα “2 ημέρες πριν την κολονοσκόπηση σας” για παραδείγματα του τι μπορείτε να πιείτε.

## 5 days before your procedure

### Stop taking iron supplements

If you take an iron supplement, stop taking it 5 days before your procedure. Iron supplements can cause color changes in your stool. This can make it harder for your doctor to see your colon clearly.

## 3 ημέρες πριν την κολonosκόπησή σας

### Ακολουθήστε μια δίαιτα φτωχή σε ίνες

Ακολουθήστε μία δίαιτα φτωχή σε ίνες ξεκινώντας 3 ημέρες πριν την κολonosκόπησή σας. Κατά τον χρόνο αυτό, **μην τρώτε:**

- Ωμά (μη μαγειρεμένα) φρούτα και λαχανικά.
- Ολόκληρο καλαμπόκι, συμπεριλαμβανομένων και των κονσέρβων.
- Καρποί ολικής άλεσης (όπως βρώμη, καστανό ρύζι, κινόα ή ψωμί ολικής άλεσης).
- Σπόροι (όπως παπαρουνόσπορος ή σουσάμι).
- Ξηροί καρποί.

### Μιλήστε με τον νοσηλευτή ενδοσκόπησής σας

Μερικές ημέρες πριν από τη διαδικασία σας, θα λάβετε μία κλήση από έναν νοσηλευτή ενδοσκόπησης. Θα δει μαζί σας τις οδηγίες σε αυτό τον οδηγό και θα σας κάνει ερωτήσεις για το ιατρικό ιστορικό σας.

Ο νοσηλευτής σας θα εξετάσει και τα φάρμακά σας και θα σας πουν ποια να πάρετε το πρωί της επέμβασής σας.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω χώρο για να τα σημειώσετε.

---

---

---

## 2 ημέρες πριν την κολonosκόπησή σας

Συνεχίστε να ακολουθείτε μια δίαιτα φτωχή σε ίνες, εκτός κι αν:

- Έχετε συχνά δυσκοιλιότητα.
- Λαμβάνετε ναρκωτικά φάρμακα.
- Έχετε υποβληθεί σε κολonosκόπηση με κακή προετοιμασία στο παρελθόν.

Εάν ισχύει κάποιο από αυτά, σταματήστε να ακολουθείτε φτωχή σε ίνες και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

- Παίρνετε 1 δόση (17 γραμμαρίων) MiraLAX 3 φορές την ημέρα. Κάθε φορά, αναμειγνύετε 1 δόση με 237 ml υγρού. Μπορείτε να πίνετε 1 δόση με το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό.
- Ακολουθείτε μία πλήρη υδριδική δίαιτα. Με πλήρη υδρική δίαιτα, μπορείτε να τρώτε και να πίνετε τα εξής:
  - Γιαούρτι (χωρίς κομμάτια φρούτων).
  - Φρουτοχυμοί χωρίς πούλπα.
  - Αναψυκτικό.
  - Ζωμός ή κρεμώδεις σούπες που έχουν στραγγιστεί ώστε να μην υπάρχουν κομμάτια λαχανικών.
  - Συμπληρώματα διατροφής.
  - Παγωτό και παγωμένα φρούτα. Δεν πρέπει να έχουν αναμειγμένα κομμάτια φρούτων, ξηρών καρπών, fudge ή φιστικοβούτυρο.

## 1 ημέρα πριν την κολonosκόπησή σας

### Προετοιμάστε το έντερό σας με το MiraLAX

Το πρωινό της ημέρας πριν από τη διαδικασία σας, αναμείξτε και τα 238 γραμμάρια της σκόνης MiraLAX με 1.892 ml διαυγούς υγρού σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να διαλυθεί η σκόνη MiraLAX.

Μόλις διαλυθεί το MiraLAX, μπορείτε να βάλετε το μείγμα στο ψυγείο. Κάτι τέτοιο είναι προαιρετικό.

Μην αναμείξετε το MiraLAX νωρίτερα από το πρωινό της ημέρας πριν τη διαδικασία σας.

## **Ακολουθείτε διαυγή υδρική δίαιτα.**

Θα χρειαστεί να ακολουθείτε μία διαυγή υδρική δίαιτα την ημέρα πριν τη διαδικασία σας. Η διαυγής υδρική δίαιτα περιλαμβάνει μόνον υγρά μέσα από τα οποία μπορείτε να δείτε. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα στον πίνακα “Διαυγής υδρική δίαιτα”.

Όταν ακολουθείτε μια διαυγή υδρική δίαιτα:

- Μην τρώτε συμπαγή τρόφιμα.
- Μην πίνετε τίποτα κόκκινο, μοβ ή πορτοκαλί.
- Προσπαθήστε να πίνετε τουλάχιστον 1 (234 ml) φλιτζάνι υγρού κάθε ώρα όσο είστε ξύπνιος(α).
- Πίνετε διαφορετικούς τύπους διαυγούς υγρού. Μην πίνετε μόνο νερό, καφέ και τσάι. Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε αρκετές θερμίδες και αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για την κολονοσκόπησή σας.
- Εάν πάσχετε από διαβήτη, φροντίστε να πίνετε μόνον διαυγή υγρά χωρίς ζάχαρη και ελέγχετε συχνά το σάκχαρο αίματός σας. Εάν έχετε ερωτήσεις, μιλήστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.

<b>Διαυγής υδρική δίαιτα</b>		
	<b>Μπορείτε να καταναλώσετε</b>	<b>Μην καταναλώσετε</b>
<b>Σούπες</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Διαυγείς ζωμοί, ζωμοί κρέατος ή κουσομέ.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Οτιδήποτε περιέχει ψήγματα αποξηραμένης τροφής ή καρυκεύματος.</li></ul>
<b>Γλυκά</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ζελέδες, όπως το Jell-O®.</li><li>• Αρωματισμένα παγάκια.</li><li>• Σκληρές καραμέλες, όπως Life Savers® και λεμονιού.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Οτιδήποτε κόκκινο, μοβ ή πορτοκαλί.</li><li>• Όλα τα υπόλοιπα γλυκά.</li></ul>



<b>Ροφήματα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαυγείς χυμοί φρούτων, όπως λεμονάδα, χυμός μήλου, λευκών κράνμπερι και σταφυλιού.</li> <li>• Αναψυκτικά, όπως τζιτζιμπέρα, 7UP®, Sprite® και ανθρακούχο νερό με γεύσεις.</li> <li>• Αθλητικά ροφήματα, όπως το Gatorade® και Powerade®.</li> <li>• Καφές χωρίς γάλα ή κρέμα.</li> <li>• Τσάι χωρίς γάλα ή κρέμα.</li> <li>• Νερό, και ανθρακούχο και με γεύσεις.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Οτιδήποτε κόκκινο, μοβ ή πορτοκαλί. Σε αυτά περιλαμβάνονται κόκκινο, μοβ και πορτοκαλί χυμοί, αναψυκτικά και σόδες.</li> <li>• Χυμοί με πούλπα.</li> <li>• Νέκταρ.</li> <li>• Smoothies ή μιλκσέικ.</li> <li>• Γάλα, κρέμα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.</li> <li>• Γάλατα από καρπούς, φυτικά γάλατα, μη γαλακτοκομικές κρέμες και άλλες εναλλακτικές γαλακτοκομικών.</li> <li>• Αλκοολούχα ποτά.</li> </ul>
-----------------	--	---

## Σημειώστε την ώρα της διαδικασίας σας

Ένα μέλος του προσωπικού από το Γραφείο Εισαγωγών θα σας καλέσει μετά το μεσημέρι (12 μ.μ.) την ημέρα πριν τη διαδικασία σας. Εάν η επέμβασή σας έχει προγραμματιστεί για Δευτέρα, θα σας καλέσουν την προηγούμενη Παρασκευή.

Το μέλος του προσωπικού θα σας πει τι ώρα να φτάσετε στο νοσοκομείο για την επέμβασή σας. Θα σας υπενθυμίσουν επίσης που να πάτε. Εάν δεν λάβετε κάποια κλήση, επικοινωνήστε με το ιατρείο του γιατρού σας.

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε τη διαδικασία σας, καλέστε τον ιατρό που την προγραμμάτισε.

## Ξεκινήστε την προετοιμασία του εντέρου σας

**Βήμα 1:** Στις 4 μ.μ. την ημέρα πριν τη διαδικασία σας, καταπιείτε 2 δισκία βισακοδύλης (5mg) με ένα ποτήρι νερού.

**Βήμα 2:** Στις 4:15 μ.μ., ξεκινήστε να πίνετε το μείγμα MiraLAX.

1. Στις 4:15 μ.μ., πείτε 1 φλιτζάνι (237 ml) μείγματος.
2. Στις 4:30 μ.μ., πείτε 1 φλιτζάνι (237 ml) μείγματος.

3. Στις **4:45 μ.μ.**, πείτε 1 φλιτζάνι (237 ml) μείγματος.

4. Στις **5 μ.μ.**, πείτε 1 φλιτζάνι (237 ml) μείγματος.

Συνολικά, θα πείτε 4 φλιτζάνια μείγματος.

- Όταν τελειώσετε, θα απομείνει το μισό μείγμα MiraLAX. Ο χρόνος που θα πείτε το δεύτερο μισό του μείγματος MiraLAX θα εξαρτάται από την προγραμματισμένη ώρα άφιξής σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες στο Βήμα 3σ.
- Οι κινήσεις εντέρου ξεκινούν συνήθως 1 ώρα από την στιγμή που ήπιατε την πρώτη δόση, αλλά μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για κάποιους.
  - Μην ανησυχείτε, εάν δεν ξεκινήσουν οι κινήσεις εντέρου αφού πείτε το πρώτο μισό του MiraLAX. Συνεχίστε να πίνετε διαυγή υγρά και ξεκινήστε το δεύτερο μισό του MiraLAX, σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Βάλτε βαζελίνη (Vaseline®) ή αλοιφή A & D® στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό μετά από κάθε κίνηση εντέρου. Έτσι αποτρέπεται ο ερεθισμός.
- Συνεχίστε να πίνετε διαυγή υγρά για να διατηρήσετε την ενυδάτωσή σας και να εκπλυθεί το κόλον σας.

**Βήμα 3 (εάν σας έχουν πει να φτάσετε για τη διαδικασία σας πριν τις 11 π.μ.):**

Εάν σας έχουν πει να φτάσετε για τη διαδικασία σας πριν τις 11 π.μ., ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες το βράδυ πριν τη διαδικασία σας:

Στις **11 μ.μ.**, καταπιείτε 2 δισκία βισακοδύλης με ένα ποτήρι νερό. Κατόπιν, αρχίστε να πίνετε το δεύτερο μισό από το μείγμα MiraLAX.

1. Στις **11:15 μ.μ.**, πείτε 1 φλιτζάνι (237 ml) μείγματος.

2. Στις **11:30 μ.μ.**, πείτε 1 φλιτζάνι (237 ml) μείγματος.

3. Στις **11:45 μ.μ.**, πείτε 1 φλιτζάνι (237 ml) μείγματος.

4. Στις **12 π.μ. (μεσάνυχτα)**, πείτε 1 φλιτζάνι (237 ml) μείγματος.

Φροντίστε να τελειώνετε όλο το μείγμα του MiraLAX.

- Μπορείτε να συνεχίσετε να πίνετε διαυγή υγρά μέχρι 4 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξής σας.
- Μην φάτε τίποτα μέχρι μετά τη διαδικασία σας.

## Την ημέρα της κολονοσκόπησής σας

**Βήμα 3 (εάν σας έχουν πει να φτάσετε για τη διαδικασία σας στις 11 π.μ. ή αργότερα):**

Εάν σας έχουν πει να φτάσετε για τη διαδικασία σας στις 11 π.μ. ή αργότερα, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες το πρωί πριν τη διαδικασία σας:

Στις **6 π.μ.**, πάρτε 2 δισκία βισακοδύλης με ένα ποτήρι νερό. Κατόπιν, αρχίστε να πίνετε το δεύτερο μισό από το μείγμα MiraLAX.

1. Στις **6:15 π.μ.**, πιείτε 1 ποτήρι (237 ml) μείγματος.
2. Στις **6:30 π.μ.**, πιείτε 1 ποτήρι (237 ml) μείγματος.
3. Στις **6:45 π.μ.**, πιείτε 1 ποτήρι (237 ml) μείγματος.
4. Στις **7 π.μ.**, πιείτε 1 ποτήρι (237 ml) μείγματος.

Φροντίστε να τελειώνετε ολόκληρο το μείγμα του MiraLAX.

- Μπορείτε να συνεχίσετε να πίνετε διαυγή υγρά μέχρι 4 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξής σας.
- Μην φάτε τίποτα μέχρι μετά τη διαδικασία σας.

## Τι πρέπει να θυμάστε

- Πάρτε μόνον τα φάρμακα που σας είπαν να πάρετε το πρωί της ημέρας που θα κάνετε τη διαδικασία. Πάρτε τα με λίγες γουλιές νερό.
- Μην φοράτε λοσιόν, κρέμες ή πούδρα στο στήθος ή τα χέρια σας.
- Βγάλτε τυχόν κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν piercing.
- Αφήστε όλα τα πολύτιμα αντικείμενα, όπως πιστωτικές κάρτες και

κοσμήματα, στο σπίτι. Δεν έχουμε ντουλάπια για να φυλάξετε τα πολύτιμα αντικείμενά σας.

- Εάν φοράτε φακούς επαφής, φορέστε τα γυαλιά σας αντ' αυτών.

## Τι να φέρετε μαζί σας

- Την κάρτα που είναι για το πορτοφόλι σας, εάν έχετε AICD και η κάρτα σας δεν είναι ήδη στο αρχείο του νοσοκομείου.
- Τη συσκευή εισπνοών διάσωσης σας (όπως αλβουτερόλη για το άσθμα), εάν έχετε.
- Μία θήκη για τα γυαλιά ή τις τεχνητές οδοντοστοιχίες σας, εάν τα φοράτε.
- Το Πληρεξούσιο έντυπο Υγείας, εάν συμπληρώσατε τέτοιο έντυπο.

## Πού να πάτε

Η επέμβασή σας θα λάβει χώρα σε έναν από αυτούς τους χώρους:

- Endoscopy Suite at Memorial Hospital (κύριο νοσοκομείο της MSK)**

1275 York Avenue (μεταξύ των οδών East 67<sup>th</sup> και East 68<sup>th</sup>)

New York, NY 10065

Ανεβείτε με το ασανσέρ Β στον 2ο όροφο. Στρίψτε δεξιά και μπείτε στο Surgery and Procedural Center (Κέντρο Εγχειρίσεων και Διαδικασιών) μέσα από τις γυάλινες πόρτες.

- David H. Koch Center**

530 East 74<sup>th</sup> St.

New York, NY 10021

Ανεβείτε με το ασανσέρ στον 8ο όροφο.

- MSKettering Monmouth**

480 Red Hill Road

Middletown, NJ 07748

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.msk.org/parking](http://www.msk.org/parking) για πληροφορίες σχετικά με την στάθμευση σε αυτούς τους χώρους.

## **Τι να περιμένετε**

Πολλά μέλη του προσωπικού θα σας ζητήσουν να πείτε και να συλλαβίσετε το όνομά σας καθώς και την ημερομηνία γέννησης. Και αυτό είναι για τη δική σας ασφάλεια. Άτομα με το ίδιο ή παρόμοιο όνομα μπορεί να υποβάλλονται σε διαδικασίες την ίδια μέρα.

Όταν έρθει η ώρα να αλλάξετε για τη διαδικασία σας, θα βάλετε τη νοσοκομειακή ρόμπα και αντιολισθητικές κάλτσες.

Θα συναντηθείτε με τον γιατρό σας πριν τη διαδικασία σας. Θα σας εξηγήσει τη διαδικασία και θα απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα που μπορεί να έχετε.

Θα συναντηθείτε με τον αναισθησιολόγο σας. Θα δει μαζί σας το ιατρικό ιστορικό σας και θα σας μιλήσει για το είδος της αναισθησίας (το φάρμακο που θα σας κάνει να κοιμηθείτε) που θα λάβετε.

Ένα μέλος του προσωπικού θα σας μεταφέρει στον χώρο της διαδικασίας όταν έρθει η ώρα για την κολονοσκόπησή σας. Θα ξαπλώσετε στην αριστερή πλευρά με λυγισμένα τα γόνατά σας.

Ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης θα σας τοποθετήσει μία ενδοφλέβια (IV) γραμμή σε μία φλέβα, συνήθως στον βραχίονα ή στο χέρι σας. Θα λάβετε την αναισθησία μέσα από τη γραμμή IV που θα σας κάνει να αποκοιμηθείτε. Μόλις κοιμηθείτε, ο ιατρός σας θα ξεκινήσει τη διαδικασία.

Ο γιατρός σας θα τοποθετήσει ένα κολονοσκόπιο στο ορθό σας. Το κολονοσκόπιο συνδέεται με ένα μόνιτορ. Θα δώσει στον γιατρό σας τη δυνατότητα να δει μέσα στο κόλον σας. Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει αέρα και υγρό για να μετακινήσει το κολονοσκόπιο μέσα από το κόλον σας ενώ ψάχνει κάτι ασυνήθιστο στο μόνιτορ.

Η διαδικασία διαρκεί συνήθως λιγότερο από 60 λεπτά (1 ώρα).

## **Συχνές ερωτήσεις (FAQs)**

**Κάνω την προετοιμασία και ξεκίνησα να έχω χαλαρά, υδαρή**

**κόπρανα πριν την τελειώσω. Παρόλ' αυτά πρέπει να πάρω την υπόλοιπη προετοιμασία;**

Ναι. Πρέπει να πιείτε όλη την προετοιμασία για να καθαρίσει εντελώς το κόλον σας για ασφαλή και πλήρη κολονοσκόπηση.

**Έχω την αίσθηση ότι θέλω να κάνω εμετό (ναυτία) ή έκανα εμετό αφού πήρα την προετοιμασία του εντέρου. Τι θα πρέπει να κάνω;**

Πολλοί μπορεί να νιώσουν ναυτία όσο πίνουν την προετοιμασία του εντέρου. Για να βοηθήσετε με αυτό, αναμείξτε τη σκόνη MiraLAX με διαυγή υγρά που σας αρέσει να πίνετε.

Εάν νιώθετε ότι θα κάνετε εμετό, θα πρέπει να το πιείτε πολύ αργά και να κάνετε διαλείμματα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσετε να πίνετε το υγρό για 30 έως 45 λεπτά για να αδειάσει το στομάχι σας. Ενώ κάνετε διάλειμμα, μπορεί να βάλετε το υγρό της προετοιμασίας σας στο ψυγείο, εάν προτιμάτε να είναι κρύο. Μετά το διάλειμμά σας, δοκιμάστε να πιείτε αργά και πάλι το διάλυμα προετοιμασίας σας. Εάν έχετε καλαμάκι, χρησιμοποιήστε το.

Εάν κάνετε πράγματι εμετό, κάντε ένα διάλειμμα 35 με 40 λεπτών. Εάν στο σπίτι έχετε φάρμακο κατά της ναυτίας, μπορείτε να πάρετε μία δόση πριν ξεκινήσετε και πάλι την προετοιμασία. Μπορείτε να πιείτε διαυγή υγρά που θέλετε να πιείτε για να μείνετε ενυδατωμένοι. Είναι σημαντικό να πιείτε όλο το υγρό προετοιμασίας για να καθαρίσει εντελώς το κόλον σας για ασφαλή και πλήρη κολονοσκόπηση.

## **Μετά την κολονοσκόπησή σας**

Ο νοσηλευτής σας θα συνεχίσει να παρακολουθεί την καρδιά, την αναπνοή και την πίεσή σας. Πολλοί νιώθουν πρήξιμο και βιώνουν κράμπες στο στομάχι μετά την κολονοσκόπηση. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και φεύγει με την απελευθέρωση αερίων.

Όταν ξυπνήσετε εντελώς, ο νοσηλευτής σας θα αφαιρέσει την ενδοφλέβια παροχή. Εάν περιμένει κάποιος μαζί σας, ο νοσηλευτής σας θα εξηγήσει και

στους δυο σας τις οδηγίες εξόδου από το νοσοκομείο πριν πάτε σπίτι.

## **Στο σπίτι**

- Μπορείτε να αρχίσετε να τρώτε ελαφριά τρόφιμα μόλις λάβετε εξιτήριο. Αποφύγετε πικάντικα, λιπαρά και τηγανητά φαγητά στην αρχή. Επιστρέψτε σταδιακά στην κανονική σας διατροφή. Εάν ο ιατρός σας θέλει να περιορίσετε τη διατροφή σας για μία χρονική περίοδο, θα σας το πει.
- Μην πιείτε τίποτα με αλκοόλ για 24 ώρες μετά τη διαδικασία σας.
- Μπορείτε να επιστρέψετε στις κανονικές σας δραστηριότητες 24 ώρες μετά τη διαδικασία σας.

Εάν υποβληθείτε σε βιοψία, είναι φυσιολογικό να υπάρχει μία μικρή ποσότητα αιμορραγίας από το ορθό σας. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες από μόνο λίγες σταγόνες αίμα. Η αιμορραγία θα πρέπει να σταματήσει εντός 24 ωρών μετά τη διαδικασία σας.

Μετά την κολονοσκόπηση, είναι φυσιολογικό να μην είναι τακτικές οι κινήσεις του εντέρου σας ή να διαφέρουν από τις συνήθειες σας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως μία εβδομάδα μετά τη διαδικασία σας.

## **Πότε να καλέσετε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης**

Καλέστε τον πάροχο υγειονομικής φροντίδας σας εάν έχετε κάποια από τα εξής:

- Πυρετό 38,3 °C (101 °F) ή υψηλότερο.
- Πολύ έντονο στομαχόπονο ή φούσκωμα.
- Αιμορραγία από το ορθό σας που διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες.
- Αιμορραγία ανάμεσα στις κινήσεις του εντέρου.
- Αδυναμία, λιποθυμία ή ναυτία.
- Έντονη αιμορραγία από το ορθό σας.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Για περισσότερες πηγές, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) για να κάνετε αναζήτηση στην ψηφιακή μας βιβλιοθήκη.

---

How To Prepare for Your Colonoscopy Using MiraLAX® - Last updated on May 20, 2024  
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που ανήκουν στο Κέντρο Αντιμετώπισης του Καρκίνου Memorial Sloan Kettering