



Lista de verificación: disección de ganglios linfáticos axilares con o sin tumorectomía

Siga las instrucciones de su equipo de atención para prepararse para su cirugía y recuperarse después de esta.

Lea *Información sobre la tumorectomía y la cirugía axilar*

(www.msk.org/pe/lumpectomy_axillary_surgery) y *Pautas para manos y brazos después de una disección de ganglios linfáticos axilares* (www.msk.org/pe/hand_arm_guidelines). Un integrante de su equipo de atención le dará una copia. También puede encontrarlas en línea.

Preparación para su cirugía

Qué debe hacer

- Cree una cuenta de MyMSK, si es que no lo ha hecho todavía. Visite www.msk.org/pe/enroll_mymsk para ver las instrucciones.
- Llene un formulario Health Care Proxy. Puede pedir una copia impresa o encontrarlo en www.health.ny.gov/publications/1431.pdf
- Elija a su cuidador.
- Organice que alguien lo lleve a casa luego de la cirugía.
- Siga las instrucciones de su proveedor de cuidados de la salud para tomar los medicamentos.

Qué comprar

- Compre un limpiador dérmico antiséptico que sea una solución de gluconato de clorhexidina (GHC) al 4 %, como por ejemplo Hibiclens®.
- Compre tabletas de acetaminophen 325 miligramos, como Tylenol® Regular Strength.

Cita para las pruebas prequirúrgicas (PST)

- Traiga una lista con todos los medicamentos con y sin receta que toma.
- Traiga todas las notas médicas importantes o los resultados de las pruebas que se realizó fuera de MSK. (Si su equipo de atención de MSK ya los tiene, no necesita traerlos).

Un día antes de su cirugía

Anote la hora de su cirugía

- Un integrante del personal le llamará entre las 2:00 p. m. y las 7:00 p. m. y le dirá a qué hora debe llegar para la cirugía. Si su cirugía está programada para un lunes, entonces le llamará el viernes anterior.
- Si para las 7:00 p. m. no ha recibido una llamada, llame al 212-639-5014.

Cómo tomar los medicamentos

- Siga las instrucciones de su proveedor de cuidados de la salud para tomar los medicamentos.

Duchas

- Dúchese de noche.
 - Lávese el cabello, el rostro y la zona genital como lo hace habitualmente.
 - Lávese desde el cuello hasta los pies con la solución de gluconato de clorhexidina (CHG) al 4 %. Evite la cabeza y la zona genital.
 - Séquese con una toalla limpia. No use loción, crema, desodorante, maquillaje, talco, perfume ni colonia después de esto.

Instrucciones sobre lo que debe comer

- **Deje de comer a la medianoche (12 a. m.) de la noche antes de su cirugía.** Esto incluye caramelos solubles y goma de mascar.
 - Si su proveedor de cuidados de la salud le ha dicho que deje de comer antes de la medianoche, siga sus instrucciones. Algunas personas necesitan ayunar (no comer) durante más tiempo antes de la cirugía.



El día de su cirugía

Instrucciones sobre lo que debe beber

- Entre la medianoche (12 a. m.) y 2 horas antes de su hora de su llegada, beba únicamente los líquidos de la siguiente lista. **No coma ni beba nada más.** Deje de beber 2 horas antes de la hora de llegada.
 - Agua.
 - Jugo de manzana claro, jugo de uva claro o jugo de arándanos claro.
 - Gatorade o Powerade.
 - Café negro o té. Se puede añadir azúcar. No añada nada más.
 - No añada ninguna cantidad de ningún tipo de leche o crema. Esto incluye las leches y cremas vegetales.
 - No añada miel.
 - No añada jarabe aromatizado.
- Si tiene diabetes, preste atención a la cantidad de azúcar que contienen estas bebidas. Será más fácil controlar sus niveles de azúcar en la sangre si incluye versiones de estas bebidas sin azúcar, bajas en azúcar o sin azúcares añadidos.
- **Deje de beber 2 horas antes de la hora de llegada.** Ni siquiera agua.



Cómo tomar los medicamentos

- Solo tome los medicamentos que le haya indicado el proveedor de cuidados de la salud. Tómelos con un pequeño trago de agua.

Duchas

- Dúchese antes de su cirugía. Siga los mismos pasos que la noche anterior.

Algunos aspectos para tener en cuenta

- Si usa lentes de contacto, póngase anteojos en su lugar.
- Quítese todos los objetos de metal y joyas, incluso las que tenga puestas en perforaciones del cuerpo.
- Deje en casa los objetos de valor.
- Póngase una blusa o camisa de botones o que le quede holgada y use zapatos planos y seguros para caminar.
- Traiga su formulario Health Care Proxy y otras directivas anticipadas, si las ha llenado.

En el hospital, después de la cirugía

Aprenda a cuidarse en casa

- Reúnase con su enfermero para revisar:
 - Cómo controlar el dolor.
 - Cómo cuidar de los drenajes y las incisiones.
 - Cómo ducharse.
 - Cuándo podrá conducir.
- Revise los ejercicios de brazo para hacer en casa.

Preparación para el alta

- Asegúrese de contar con un cuidador responsable que le lleve a su casa.

En casa

Recuerde seguir las instrucciones de su equipo de atención mientras se recupera de su cirugía.

Cómo tomar los medicamentos

- Tome los medicamentos según lo necesite y como se lo hayan indicado.
- No maneje ni beba alcohol mientras tome un analgésico de venta con receta.

Cuidado de los drenajes

- Vacíe sus drenajes a la mañana y a la noche. Exprima el tubo todas las veces. Visite www.msk.org/pe/jackson-pratt para ver las instrucciones.
- Siga las instrucciones del cirujano especialista en cirugía de mama para saber cuándo llamar a su consultorio y programar la extracción de los drenajes.

Duchas

- Puede ducharse 24 horas después de su cirugía.

Ejercicio y actividad física

- Siga las indicaciones que se encuentran en el recurso *Ejercicios para hacer después de su tumorectomía o procedimiento de ganglios linfáticos axilares*. Puede encontrarlo en www.msk.org/pe/exercises-lumpectomy-axillary-procedure. Un integrante de su equipo de cuidados también le dará una copia.
- Haga los ejercicios de brazo 3 veces al día hasta que pueda moverlo como lo hacía antes de la cirugía. Después de eso, hágalos una vez al día.

Actividad sexual

- Cuando se sienta listo, puede comenzar con su actividad sexual.

Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud

Llame a su proveedor de cuidados de la salud si:

- Tiene fiebre superior a 101 °F (38.3 °C).
- La piel alrededor de las incisiones está más roja o más caliente de lo habitual.
- Siente más incomodidad en la zona de su cirugía.
- Hay drenaje en las incisiones.
- El brazo o la zona alrededor de la incisión comienza a hincharse o se hincha cada vez más.
- Tiene problemas para respirar.
- Tiene preguntas o inquietudes.



Detalles de contacto

De lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., llame a las siguientes personas:

Médico: _____

Enfermero: _____

Número de teléfono: _____

Después de las 5:00 p. m., los fines de semana y feriados, llame al 212-639-2000. Pida hablar con la persona que esté de guardia reemplazando a su proveedor de cuidados de la salud.