



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Acerca del parche Flector®

En esta información se describe el parche Flector, en particular cómo aplicarlo, las pautas que se deben seguir mientras esté colocado y los efectos secundarios que se deben tener en cuenta.

Acerca del parche Flector

El parche Flector (parche con diclofenac epolamine de uso tópico) es un analgésico. Ayuda a aliviar el dolor y la inflamación (hinchazón) en una pequeña zona del cuerpo. La causa del dolor o la inflamación puede ser, por ejemplo, un esguince, una distensión, un golpe o la artritis. Contiene un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (NSAID).

El parche Flector se coloca sobre la piel. Esto significa que el NSAID se absorbe a través de la piel y el medicamento va directo a la zona que presenta dolor. Otras zonas del cuerpo no reciben tanta cantidad del medicamento.

Antes de aplicar el parche Flector

- Asegúrese de que la piel esté limpia. Limpie con agua cualquier resto de suciedad, loción o hidratante que haya en la zona donde aplicará el parche Flector. Estos restos no permitirán que el parche se adhiera a la piel.
- Si es necesario lavar la zona donde aplicará el parche Flector, lávela con un jabón suave, enjuáguela con agua y séquela por completo con pequeños golpes.
- Si la zona donde aplicará el parche Flector tiene cabellos, recórtelos con una tijera. No afeite la zona.

Cómo aplicar el parche Flector

- No coloque el parche Flector sobre piel que esté dañada, por ejemplo, si tiene quemaduras, heridas, infección, sarpullido o eccema.
- No coloque el parche Flector en una zona que haya recibido radiación.

Para aplicar el parche Flector:

1. Retire la película transparente del parche.
2. Coloque el parche en la zona donde tiene más dolor.
3. Presione firmemente el parche con la mano por unos 20 a 30 segundos. Debe quedar completamente adherido a la piel.
4. Lávese las manos.

Cada paquete contiene más de 1 parche Flector. Asegúrese de volver a cerrar el paquete una vez abierto. Esto impedirá que el resto de los parches se sequen.

Guarde los parches a temperatura ambiente. No los ponga en el refrigerador ni los exponga al calor.

Después de aplicar el parche Flector

- No moje el parche. No se duche ni tome un baño con el parche puesto.
- No coloque compresas frías ni calientes sobre el parche.
- No permita que el parche entre en contacto con los ojos. Si esto ocurre, enjuáguese inmediatamente los ojos con agua y llame al médico.
- Si el parche comienza a despegarse, coloque cinta adhesiva en los bordes.

Use solo la cantidad de parches que le indique el médico.

Cómo retirar el parche Flector

1. Despegue el parche de la piel.
2. Doble el parche de modo que los lados con pegamento se junten.
3. Tire el parche usado a la basura, donde ni los niños ni las mascotas puedan sacarlo.
4. Lávese las manos.

Efectos secundarios

Si presenta alguno de los síntomas que se enumeran a continuación, retire el parche inmediatamente y enjuague la zona con agua.

- Erupción o reacción cutánea en la zona donde está colocado el parche
- Mareo
- Hinchazón en los brazos o las piernas
- Aumento de peso
- Dolor de cabeza
- Empeoramiento de la hipertensión o de alguna enfermedad del riñón, el hígado o el corazón

Precauciones

- No use este medicamento si alguna vez ha tenido erupción, comezón, asma o cualquier tipo de reacción alérgica después de tomar aspirin u otro NSAID.
- No tome ningún NSAID por vía oral mientras esté usando el parche (a menos que el médico lo autorice). Algunos ejemplos de NSAID por vía oral son:
 - Ibuprofen (Advil[®], Motrin[®])
 - Meloxicam (Mobic[®])
 - Celecoxib (Celebrex[®])
 - Naproxen (Aleve[®], Naprosyn[®])

- Diclofenac (Voltaren®)
- Infórmele a su médico si toma otros medicamentos, por ejemplo:
 - Inhibidores de la ECA para controlar la presión arterial
 - Esteroides
 - Aspirin
 - Diuréticos
 - Lithium
 - Methotrexate
 - Anticoagulantes
 - Analgésicos

Llame a su médico o enfermero si tiene:

- Alguno de los síntomas que aparecen en la sección “Efectos secundarios”
- Cambios en la cantidad o el color de la orina
- Algún síntoma nuevo o sin explicación
- Tiene alguna pregunta o inquietud

Si tiene dolor de pecho o problemas para respirar, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

About Flector® Patch - Last updated on September 18, 2019

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center