



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Acetaminophen, Diphenhydramine, and Phenylephrine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Benadryl Allergy and Cold [OTC] [DSC]; Benadryl Allergy and Sinus Headache [OTC] [DSC]; Benadryl Maximum Strength Severe Allergy and Sinus Headache [OTC] [DSC]; Cold Control PE [OTC]; Delsym Children's Cough+Cold Night Time [OTC]; Delsym Cough+Cold Night Time [OTC] [DSC]; Dimetapp Children's Multi-Symptom Cold & Flu [OTC]; GoodSense Nighttime Flu & Severe Cold & Cough [OTC]; GoodSense Severe Allergy Relief Plus Sinus Headache [OTC]; Mucinex Fast-Max Night Time Cold & Flu [OTC]; Mucinex Sinus-Max Night Time Congestion & Cough [OTC]; One Tab Allergy & Sinus [OTC]; One Tab Cold & Flu [OTC]; Robitussin Peak

Cold Nighttime Multi-Symptom Cold [OTC] [DSC]; Robitussin Severe Multi-Symptom Cough Cold + Flu Nighttime [OTC]; Sudafed PE Nighttime Cold [OTC] [DSC]; Sudafed PE Severe Cold [OTC] [DSC]; Theraflu ExpressMax Flu Cough & Sore Throat [OTC]; Theraflu ExpressMax Nighttime Severe Cold & Cough [OTC]; Theraflu Nighttime Severe Cold & Cough [OTC]; Theraflu Nighttime Severe Cold [OTC]; Theraflu Sugar-Free Nighttime Severe Cold & Cough [OTC]; Theraflu Warming Relief Flu & Sore Throat [OTC]; Tylenol Allergy Multi-Symptom Nighttime [OTC]

## **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar la congestión nasal.
- Este medicamento se utiliza para aliviar los síntomas de la alergia.
- Este medicamento se utiliza para aliviar el dolor y la fiebre.

## **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha

presentado.

- Si tiene enfermedad hepática.
- Si tomó ciertos medicamentos para la depresión o la enfermedad de Párkinson en los últimos 14 días. Esto incluye isocarboxazida, fenelzina, tranilcipromina, selegilina o rasagilina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.
- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: linezolida o cloruro de metiltioninio.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

### **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que

toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

- No tome una dosis mayor de la que el médico le indicó que tome. Tomar más de lo indicado puede aumentar la probabilidad de experimentar efectos secundarios graves.
- No tome este medicamento durante más tiempo del que le indicó su médico.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Evite el consumo de alcohol mientras tome este medicamento.
- Consulte con el médico antes de consumir marihuana, otras formas de cannabis o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- No utilice con otros productos que contengan difenhidramina.
- Evite tomar otros productos que contengan acetaminofén. Revise cuidadosamente las etiquetas. Una sobredosis de acetaminofén puede ocasionar problemas hepáticos.
- Este medicamento contiene acetaminofén en su composición. Se produjeron problemas hepáticos con

el consumo de acetaminofén. A veces, esto puede requerir un trasplante de hígado u ocasionar la muerte. La mayoría de las veces, se presentaron problemas hepáticos en personas que tomaban más de 4000 mg (miligramos) de acetaminofén por día. A menudo, las personas también consumían más de 1 medicamento que contenía acetaminofén.

- Siga las instrucciones al pie de la letra. No consuma más acetaminofén de lo indicado en un día. Si no sabe la cantidad de acetaminofén que puede consumir en un día, consulte a su médico o farmacéutico. Algunas personas pueden consumir hasta 4000 mg (miligramos) en un día si así lo indica el médico. Algunas personas (como personas con problemas hepáticos y niños) deben consumir menos acetaminofén. Llame a su médico de inmediato si ha consumido demasiado acetaminofén en un día, incluso si se siente bien.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- Si tiene fenilcetonuria (PKU), hable con el médico. Algunos productos contienen fenilalanina.
- Si está realizando una dieta con bajo contenido de sodio o sin sodio, hable con el médico. Algunos de

estos productos tienen sodio.

- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de sentir excitación puede ser mayor en los niños.
- Las distintas marcas de este medicamento podrían indicar dosis diferentes para los niños. Hable con el médico antes de suministrar este medicamento a un niño.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Puede producirse una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta signos como enrojecimiento, hinchazón, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o llagas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos

secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Mareos o somnolencia.
- Nerviosismo o excitabilidad.
- Problemas para dormir.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Todas las presentaciones:**



- Se puede administrar con o sin alimentos. Se debe administrar con alimentos si provoca malestar estomacal.

### **Líquido:**

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

### **Polvo:**

- Disuelva 1 paquete en agua caliente. Beba mientras está caliente.
- Si utiliza un microondas, disuelva 1 paquete en agua fría. Caliente en microondas hasta que esté caliente. No caliente demasiado. Agite antes y después de calentar.

### **Cápsulas:**

- No quite la lámina de la cápsula antes de consumirla. Coloque la cápsula en la cafetera. Utilice al menos 8 onzas (240 ml) de agua. Luego de usar la cafetera, la cápsula estará caliente y puede gotear. Utilícelas con cuidado.
- Beba mientras está caliente. Beba dentro de los 10 o 15 minutos de prepararla.

- Solo utilice el tipo de cafetera que le indicaron usar. Consulte al médico o farmacéutico si no está seguro del tipo de cafetera que debe usar.

## **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- Si toma este medicamento con regularidad, tome la dosis que falta tan pronto como lo recuerde.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Muchas veces este medicamento se toma según sea necesario. No lo tome con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

## **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja del calor.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan

expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Cápsulas:**

- Guarde en la bolsa protectora hasta que se vaya a usar.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera,

farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso

de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

### **Última fecha de revisión**

2023-02-02

### **Derechos de autor**

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.  
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Acetaminophen, Diphenhydramine, and Phenylephrine - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center