



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Alprostadi

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Caverject; Caverject Impulse; Edex; Muse [DSC]; Prostin VR

### **Nombres comerciales: Canadá**

Caverject; Muse; Prostin VR

### **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Se utiliza para tratar la disfunción eréctil (DE).
- Algunos productos se pueden usar para ayudar a detectar la disfunción eréctil.

### **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su

médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si le han mencionado que no está lo suficientemente saludable como para tener relaciones sexuales.
- Si tiene un pene deforme, un implante peniano u otros problemas en el pene.
- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: policitemia o trombocitemia.
- Si tiene alguno de los problemas de salud siguientes: leucemia, mieloma múltiple, anemia de células falciformes u otros problemas de salud que pueden aumentar el riesgo de tener una erección dolorosa (pene rígido) o una erección que dura más de 4 horas. Pregúntele al médico si no está seguro.
- Si es mujer. Este medicamento no está aprobado para utilizarse en mujeres.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para

usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- Este medicamento no detiene la propagación de enfermedades como el VIH o la hepatitis que se contagian a través de las relaciones sexuales. No tenga relaciones sexuales de ningún tipo sin usar un condón de látex o poliuretano. Si tiene preguntas, consulte al médico.

## **Supositorio uretral:**

- Si su pareja sexual puede quedar embarazada, utilice un método anticonceptivo que considere confiable para evitar un embarazo.
- Si su pareja (sexual) está embarazada, utilice un condón al tener relaciones sexuales.
- Este medicamento no está aprobado para utilizarse en niños. Hable con el médico.

## **Inyección:**

- Existe la probabilidad de que la aguja se rompa al usar la inyección. Las agujas se han roto con parte de la aguja aún dentro del pene. Si la aguja se rompe y puede tomar el extremo roto, sáquelo y llame al médico. Si no puede tomar el extremo roto, llame al médico de inmediato.
- Este medicamento contiene alcohol bencílico en su composición. En los recién nacidos o bebés pueden producirse efectos secundarios graves con algunas dosis de alcohol bencílico, incluso si se administra con otros medicamentos que contengan alcohol bencílico. Este medicamento no está aprobado para su uso en niños. Consulte con el médico.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que**

## **debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Enrojecimiento, bultos, inflamación, sensibilidad o curvatura de la erección (pene rígido).
- Irritación en el lugar en que se aplicó el medicamento.
- Dolor o presión en el pecho, o pulso acelerado.
- Mareos o desmayos.
- Dolor de cabeza intenso.
- Falta de aire.

- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Hinchazón en las venas de las piernas.
- Llame al médico de inmediato si tiene una erección dolorosa (pene duro) o una erección que dura más de 4 horas. Esto puede ocurrir incluso si no está teniendo sexo. Si no se trata de inmediato, puede producir problemas sexuales duraderos y es posible que no pueda tener sexo.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### **Supositorio uretral:**

- Dolor del pene.
- Sensación de calor o ardor en la uretra.
- Dolor en el pene, los testículos, las piernas o en el área entre el pene y el recto.

### **Inyección:**

- Dolor del pene.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Supositorio uretral:**

- Este medicamento se utiliza en la uretra (el tubo por el que pasa la orina).
- Su proveedor de salud médica le enseñará cómo tomar este medicamento.
- Asegúrese de saber cómo utilizar este medicamento. Lea las instrucciones de uso que vienen con este medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si no vienen instrucciones de uso o si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.

- Este medicamento funciona mejor si orina antes de usarlo.
- Lávese las manos antes y después de usar.

## **Inyección:**

- Inyecte en el costado del pene como le haya indicado su médico o lea el prospecto.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- No agitar.
- Antes de cada dosis coloque una nueva aguja.
- No utilice una aguja doblada. No intente enderezar una aguja doblada. Tendrá más posibilidades de romperse.
- Luego de administrar la dosis, aplique una leve presión sobre la zona donde se colocó la inyección para evitar hematomas. Haga esto durante 5 minutos y hasta que pare la hemorragia.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- No utilizar si la solución cambia de color.
- Cada jeringa precargada o vial sirve para un único uso. Deseche cualquier sobrante luego de aplicar la dosis.

- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.
- Administre cada dosis del medicamento en diferentes lados del pene.

### **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- Este medicamento se administra según sea necesario. No lo administre con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

#### **Supositorio uretral:**

- Conserve el sobre de aluminio sin abrir en el refrigerador.
- Proteja del calor y de la luz solar.
- Este medicamento puede estar almacenado a temperatura ambiente hasta 2 semanas después de su uso.

#### **Inyección:**

- Algunas marcas de este medicamento se deben almacenar en el refrigerador. Algunas marcas de este

medicamento se deben almacenar a temperatura ambiente. Si tiene preguntas sobre cómo almacenar este medicamento, hable con su farmacéutico.

- Es posible que algunos productos deban administrarse inmediatamente después de mezclarlos. Otros productos pueden almacenarse durante algún tiempo después de mezclarlos. Asegúrese de saber durante cuánto tiempo el producto está en buen estado y cómo conservarlo después de mezclarlo. Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro.

### **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

### **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la

información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2024-03-14

## **Derechos de autor**

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciados y/o afiliados.  
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Alprostadil - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center