



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Crovalimab

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Piasky

### **Advertencia**

- Este medicamento aumenta el riesgo de infecciones meningocócicas graves. Se han presentado infecciones meningocócicas potencialmente mortales y mortales en personas tratadas con este tipo de medicamento. Estas infecciones pueden tornarse potencialmente mortales o pueden ser mortales muy rápido si no se tratan a tiempo. Deberá aplicarse una vacuna antimeningocócica como mínimo 2 semanas antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, a menos que el médico indique lo contrario. Si ha recibido una vacuna antimeningocócica

anteriormente, es posible que deba recibir otra. Consulte con su médico si tiene preguntas.

- Las vacunas antimeningocócicas reducen el riesgo de infecciones meningocócicas, pero no impiden que se produzcan todas las infecciones de este tipo. Llame inmediatamente a su médico si presenta signos de una infección meningocócica, como dolor de cabeza con malestar estomacal o vómitos, fiebre o rigidez de cuello o espalda, confusión, fiebre con o sin erupciones cutáneas o latidos rápidos, dolores corporales con signos gripales, o si le molesta la luz en los ojos.

## **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar una enfermedad de la sangre denominada hemoglobinuria nocturna paroxística (HNP).

## **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si ha recibido una vacuna meningocócica.
- Si tiene una infección meningocócica.
- Si está siendo o ha sido tratado con otro medicamento como este. Si no lo sabe con seguridad, consulte con su médico o farmacéutico.
- Si está amamantando. No amamante mientras tome este medicamento y hasta 9 meses después de la última dosis.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

### **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos,

enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

- Este medicamento podría aumentar el riesgo de infecciones graves. Esto incluye infecciones causadas por *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria gonorrhoeae* y *Haemophilus influenzae*. Las vacunas pueden ayudar a reducir el riesgo de algunas de estas infecciones. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Lávese las manos con frecuencia. Manténgase alejado de personas que tengan infecciones, resfríos o gripe.
- Asegúrese de estar al día con todas las vacunas antes de comenzar el tratamiento con este medicamento.
- Lleve consigo la tarjeta de seguridad del paciente en todo momento y durante 11 meses después de la última dosis.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Algunos problemas de salud pueden tener lugar después de suspender el uso de este medicamento. Deberán observarlo de cerca durante varias semanas o meses luego de suspender este medicamento. Haga un seguimiento con su médico. Llame al médico de inmediato si presenta un cambio en la cantidad de orina, orina oscura, hinchazón, calor o dolor en

piernas o brazos, dolor o presión en el pecho, tos con sangre, dificultad para respirar o tragar, hematomas o hemorragia sin causa aparente, convulsiones o dolor estomacal grave, mareos graves o desmayos. Llame a su médico de inmediato si se siente confundido, muy cansado o débil, o si tiene debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída en un lado de la cara o cambios en la visión. Si no puede tener o mantener una erección llame al médico de inmediato.

- Si su peso cambia, consulte a su médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de

inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Dolor de pecho.
- Mareos o desmayos.
- Inflamación.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Pueden producirse reacciones del sistema inmunitario al cambiar a este medicamento después del tratamiento con uno similar o al cambiar de este medicamento a otro similar. Estas reacciones pueden ser graves. Si cambia de medicamento, su médico lo vigilará de cerca durante 30 días después del cambio. Llame inmediatamente a su médico si tiene dolor en

las articulaciones, los músculos o los huesos; erupción cutánea u otros problemas de la piel; picor; fiebre, dolor de cabeza; entumecimiento u hormigueo, especialmente en las manos o los pies; dolor de estómago; o signos de problemas renales como dificultad para orinar, sangre en la orina o un gran aumento de peso. Llame a su médico de inmediato si se siente débil, cansado o tiene menos energía.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor, enrojecimiento u otra reacción en el lugar donde se administró este medicamento; dolor de cabeza; o dolor muscular durante o después de la infusión o inyección.
- Signos de un resfrío común.
- Diarrea.
- Náuseas.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían

ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Puede administrarse como una inyección en la parte grasa de la piel o como una infusión en una vena durante un período de tiempo.

### **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- Llame al médico para obtener instrucciones.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.



## Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna

pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su

salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2024-06-28

## **Derechos de autor**

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.  
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Crovalimab - Last updated on July 1, 2024

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center