



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Donepezil

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Adlarity; Aricept

Nombres comerciales: Canadá

ACH-Donepezil; ACT Donepezil ODT [DSC]; AG-
Donepezil; APO-Donepezil; Aricept; Aricept RDT [DSC];
Auro-Donepezil; BIO-Donepezil; JAMP-Donepezil; M-
Donepezil; Mar-Donepezil; MINT-Donepezil; NAT-
Donepezil; NRA-Donepezil; PMS-Donepezil; PRIVA-
Donepezil [DSC]; SANDOZ Donepezil; Septa-Donepezil
[DSC]; TARO-Donepezil; TEVA-Donepezil

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la demencia en personas que tienen la enfermedad de Alzheimer.
- Se le puede recetar este medicamento por otras

razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos,

enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

- Este medicamento no cura la enfermedad de Alzheimer. Siga bajo el cuidado del médico.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Parche cutáneo:

- Evite el uso de fuentes de calor (como lámparas solares, camas solares, almohadillas calientes, mantas eléctricas, lámparas de calor, saunas, jacuzzis, camas de agua caliente, etc.). Evite tomar largos baños calientes y exponerse al sol. Su temperatura podría aumentar y podría ingresar una gran cantidad de medicamento a su organismo.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de

inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Mareos severos o desmayos.
- Ritmo cardíaco lento.
- Pulso que no se siente normal.
- Problemas para orinar.
- Convulsiones.
- Ardor de estómago.
- Dolor estomacal grave.
- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Materia fecal oscura, negra o con sangre.
- Problema para respirar reciente o que empeoró.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen

ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Se siente mareado, cansado o débil.
- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.
- Problemas para dormir.
- Calambres musculares.
- Disminución del apetito.
- Pérdida de peso.
- Dolor de cabeza.

Parche cutáneo:

- Estreñimiento.
- Se han producido reacciones cutáneas con la administración de este medicamento. Esto incluye el enrojecimiento y la picazón. Llame a su médico de inmediato si tiene alguna de estas reacciones cutáneas que no mejoran en los 2 días siguientes al retiro del parche: enrojecimiento o hinchazón graves, descamación o ampollas en la piel, o una reacción cutánea que se haya extendido desde el lugar donde

se está utilizando este medicamento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos orales:

- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- Tome este medicamento antes de acostarse.
- Tome este medicamento con o sin comida.
- Beba mucho líquido que no contenga cafeína, a menos que el médico le indique no beber mucho líquido.

Tabletas de 23 mg:

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.

Tableta de disolución oral:

- Lave y seque sus manos antes de tomar este medicamento. No toque la tableta con las manos mojadas o húmedas.
- Coloque en la lengua y deje que se disuelva.
- No la trague entera.
- No retire el medicamento del blíster hasta que vaya a tomarlo. Una vez abierto el blíster, tome el medicamento de inmediato. No guarde el medicamento que retiró del blíster, para usarlo posteriormente.
- Beba un vaso de agua después de disolver la tableta.

Parche cutáneo:

- No tome este medicamento por la boca. Solo para uso cutáneo.
- Siga usando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- No se ponga un parche frío. Antes de abrir una bolsa,

deje que alcance la temperatura ambiente. No calentar. Ponga el parche justo después de sacarlo de la bolsa.

- No usar si la bolsa que contiene este medicamento está rota, abierta o no está sellada en su totalidad.
- No corte ni divida los parches. No use parches que estén dañados.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Ponga el parche sobre la piel limpia, seca y sana de la espalda. No lo ponga en la columna vertebral. Si no puede ponerlo en la espalda, puede ponerlo en la parte superior de los glúteos o en la parte superior del muslo.
- Si el lugar donde se coloca el parche tiene pelo, mantenga el pelo lo más cerca posible de la piel. No se afeite el pelo.
- No coloque sobre piel en la que recientemente ha aplicado cremas, aceites, lociones, polvo u otros productos para la piel. Es posible que el parche no se adhiera correctamente.
- No lo ponga en la piel que esté dañada, enrojecida o irritada. No lo ponga en la piel que se rozará con la ropa ajustada.
- Cambie la ubicación del parche con cada parche. No

aplique en la misma área por más de 14 días.

- Si el parche se desprende, reemplácelo por uno nuevo. Inicie un nuevo programa en función del momento en que se ponga el nuevo parche.
- No aplique más de un parche a la vez.
- Luego de retirar un parche dérmico, asegúrese de doblarlo con los lados pegajosos unidos. Deseche los parches usados fuera del alcance de niños y mascotas.
- Si este medicamento ingresa en los ojos, lave con agua de inmediato. Si tiene irritación en los ojos que perdura o cambios en la visión, llame a su médico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Todos los productos orales:

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si se salta el medicamento durante 7 días, llame a su médico para pedirle nuevas instrucciones.

Parche cutáneo:

- Aplique el parche saltado lo antes posible luego de retirar el usado.

- Después de ponerse un nuevo parche, inicie un nuevo horario basado en la fecha de colocación del nuevo parche.
- Llame a su médico si ha interrumpido el tratamiento con este medicamento.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todos los productos orales:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

Parche cutáneo:

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Guarde en la bolsa protectora hasta que se vaya a usar.
- Póngase el parche en las 24 horas siguientes a sacar la bolsa del refrigerador.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con

el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de

esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2022-03-31

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Donepezil - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center