



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Epinephrine (Systemic)

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Adrenalin; Adyphren Amp II [DSC]; Adyphren Amp [DSC]; Adyphren II [DSC]; Adyphren [DSC]; Auvi-Q; Epinephrine Professional; EPINEPHrinesnap; EpinephrineSnap-EMS; Epinephrinesnap-v; EpiPen 2-Pak; EpiPen Jr 2-Pak; EPIsnap; Symjepi [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

Adrenalin; Allerject; Anapen; Anapen Junior; Emerade; EpiPen; EpiPen Jr

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar reacciones alérgicas graves.
- Este medicamento se utiliza para tratar la presión baja.
- Este medicamento se utiliza durante una cirugía de los ojos.
- Este medicamento se utiliza cuando el corazón no está latiendo.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- No inyectar en los dedos, manos ni pies. Si lo hace, puede generar un flujo de sangre en esas áreas. Si se administra este medicamento por accidente, busque ayuda médica de inmediato.
- Si es alérgico a los sulfitos, consulte al proveedor de salud médica. Algunos productos contienen sulfitos.
- Si es diabético, vigile cuidadosamente el nivel de azúcar en la sangre.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Para uso en el ojo:

- Las luces brillantes pueden provocar irritación. Use lentes para el sol.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Para todos los usos de este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de niveles bajos de potasio tales como dolor o debilidad en los músculos, calambres musculares o pulso que no se siente normal.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latido cardíaco acelerado.
- Falta de aire.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Este medicamento ha provocado latidos cardíacos anormales graves. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Esto puede ser más probable si ya tiene problemas del corazón o si consume ciertos medicamentos. Informe a su médico inmediatamente si tiene latidos cardíacos anormales.

Por motivos alérgicos:

- En raras ocasiones, se produjeron infecciones en el lugar en el que se administró este medicamento. En algunos casos, estas infecciones pueden ser muy graves. Llame de inmediato a su médico si presenta signos de infección como enrojecimiento que no desaparece, calor, hinchazón, o sensibilidad.

Inyección (si se aplica en la vena):

- Este medicamento puede causar daño en los tejidos si se filtra medicamento de la vena. Informe a la enfermera si tiene enrojecimiento, ardor, dolor, inflamación, ampollas, llagas en la piel o pérdida de líquido en el sitio donde se colocó el medicamento.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Se siente mareado, cansado o débil.
- Nerviosismo o excitabilidad.
- Temblores.
- Náusea o vómito.
- Ansiedad.
- Agitación.
- Sudoración excesiva.
- Piel pálida.
- Piel erizada.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al

médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en

<https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Por motivos alérgicos:

- Este medicamento se administra en forma de inyección en el músculo o en la capa de grasa de la piel.
- Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emergencia. Lea el prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.
- Mantenga este medicamento consigo en todo momento. Puede mantener extras en el trabajo, la escuela y el hogar.
- Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Asegúrese de que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo administrarlo en caso de ser necesario.
- Nunca ponga los dedos o la mano sobre la punta.
- Verifique el dispositivo antes de tener que usarlo para controlar que el seguro esté en su lugar y que puede sacar el dispositivo del envase. No quite el seguro hasta que esté listo para usar el dispositivo.
- Cuando esté listo para usar, saque la jeringa del estuche.
- Sostenga la pluma con la punta hacia abajo.
- Haga un puño alrededor del la jeringa.
- Retire la tapa de seguridad. Deseche la tapa de seguridad

inmediatamente después de usar este medicamento. Puede haber riesgo de asfixia si un niño o un animal doméstico se traga accidentalmente la tapa de seguridad.

- Inyecte directamente sobre la parte externa del muslo según fue indicado. Este medicamento puede administrarse a través de la ropa si es necesario. Inyecte y sostenga durante el tiempo que le indicaron.
- No inyectar en los glúteos.
- Si administra este medicamento a su hijo, sostenga con fuerza su pierna para evitar heridas. Intente limitar el movimiento de su hijo antes y durante la inyección.
- Busque ayuda médica de inmediato después de usar este medicamento.
- Coloque nuevamente en el estuche.
- Llévelo con usted al hospital.
- No utilice este medicamento si la solución cambia de color, está turbida o tiene partículas. Use una nueva.
- Si este medicamento caduca, adquiera más medicamentos antes de necesitar una nueva dosis.
- Si el dispositivo se ha activado por accidente, no lo utilice para una emergencia. Reemplace el dispositivo por uno nuevo.

Por otros motivos:

- El médico le administrará este medicamento.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Obtenga ayuda médica inmediatamente.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Inyección (si se aplica en la vena):

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las demás presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.
- Proteja del calor, del frío y de la luz.

Por motivos alérgicos:

- Guárdelo en el envase que le proporcionaron.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2023-12-05

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Epinephrine (Systemic - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center