



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Fentanyl

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Actiq [DSC]; Duragesic-100 [DSC]; Duragesic-12 [DSC]; Duragesic-25 [DSC]; Duragesic-50 [DSC]; Duragesic-75 [DSC]; Fentora [DSC]; Lazanda [DSC]; Subsys [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

FentaNYL Citrate SDZ; Fentora; PMS-FentaNYL MTX [DSC]; SANDOZ FentaNYL; TEVA-FentaNYL

Advertencia

Todas las presentaciones:

- Se trata de un medicamento opiáceo. Los opiáceos pueden ponerlo en riesgo de padecer un trastorno por consumo de medicamentos. Pueden provocar sobredosis y la muerte. Se le controlará de forma rigurosa después de tomar este medicamento.
- Se pueden presentar problemas respiratorios graves al tomar este medicamento. El riesgo es más alto cuando se empieza a tomar este medicamento o cada vez que se aumenta la dosis. Estos problemas respiratorios pueden ser mortales. Llame a su médico de inmediato si tiene problemas para respirar, respiración lenta o respiración superficial.
- Incluso una dosis de este medicamento puede resultar mortal si la

toma otra persona o si se toma por accidente, especialmente en el caso de los niños. Si otra persona toma este medicamento o si se toma por accidente, busque ayuda médica de inmediato.

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Se han producido efectos secundarios graves cuando se combinan medicamentos opioides con benzodiazepinas, alcohol, marihuana, otras formas de cannabis o drogas callejeras. Esto incluye somnolencia severa, problemas respiratorios y muerte. Los medicamentos con benzodiazepinas incluyen aquellos como alprazolam, diazepam y lorazepam. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Muchos medicamentos interactúan con este medicamento y pueden aumentar la probabilidad de aparición de efectos secundarios, como problemas respiratorios mortales. Hable con el médico y el farmacéutico para asegurarse de que sea seguro utilizar este medicamento junto con los otros medicamentos que toma.
- Obtenga ayuda médica de inmediato si tiene mucho sueño, se siente muy mareado o se desmaya. Los cuidadores y otras personas deben obtener ayuda médica de inmediato si el paciente no responde o no contesta o si reacciona de forma anormal o si no despierta.
- Si está embarazada o está buscando un embarazo, consulte inmediatamente a su médico sobre los beneficios y riesgos de usar este medicamento durante el embarazo. El uso prolongado de este medicamento durante el embarazo puede causar abstinencia en el recién nacido. La abstinencia en el recién nacido puede poner en peligro la vida si no se trata.

Parche dérmico (Duragesic):

- Evite los baños calientes, tomar sol y el uso de fuentes de calor (como camas solares, almohadillas calientes o jacuzzis). Evite realizar actividad física intensa. Dígale a su médico si tiene fiebre. El aumento de la temperatura corporal podría ocasionar el ingreso de

una gran cantidad de medicamento a su organismo. Esto puede causar una sobredosis y ocasionar problemas respiratorios mortales.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para controlar el dolor.

Todos los productos excepto la inyección:

- Este medicamento no es para tratar el dolor leve ni el dolor que solamente dura poco tiempo (como dolores de cabeza, dolores de dientes o el dolor después de una cirugía).
- Este medicamento es solamente para aquellas personas que han estado tomando analgésicos (opioides) y están acostumbrados a sus efectos. Consulte con el médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: problemas respiratorios o de pulmón como asma, problemas para respirar, apnea del sueño, niveles altos de dióxido de carbono en la sangre, u obstrucción o estrechamiento del intestino o del estómago.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: enfermedad renal o enfermedad hepática.
- Si tomó ciertos medicamentos para la depresión o la enfermedad de Párkinson en los últimos 14 días. Esto incluye isocarboxazida, fenelzina, tranilcipromina, selegilina o rasagilina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.

- Si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos: buprenorfina, butorfanol, linezolida, azul de metileno, nalbufina o pentazocina.

Todos los productos orales:

- Si tiene úlceras en la boca, hable con el médico.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Si ha estado consumiendo dosis altas de este medicamento o durante un período largo, es posible que no surta efecto y que deba tomar dosis más altas para lograr el mismo efecto. Esto se conoce como tolerancia. Llame al médico si este medicamento deja de surtir efecto. No consuma más de lo indicado.

- El uso a largo plazo o regular de medicamentos opioides como este medicamento puede llevar a la dependencia. Reducir la dosis o dejar de tomar este medicamento de repente puede causar un mayor riesgo de abstinencia u otros problemas graves. Consulte con el médico antes de reducir la dosis o dejar de tomar este medicamento. Deberá seguir las instrucciones del médico. Consulte con el médico si tiene más dolor, cambios de humor, pensamientos de suicidio o cualquier otro efecto adverso.
- No tome una dosis mayor de la indicada por el médico. No tome este medicamento durante más tiempo del que se le indicó. Si lo hace, podría aumentar el riesgo de padecer efectos secundarios severos.
- No utilice este medicamento junto con otros medicamentos fuertes para aliviar el dolor o si está utilizando un parche para aliviar el dolor. Consulte primero al médico.
- Si el dolor empeora, si está más sensible al dolor o si presenta un dolor nuevo después de tomar este medicamento, llame a su médico de inmediato. No tome más de lo indicado.
- Si bebe jugo de toronja (pomelo) o si come toronjas (pomelos) con frecuencia, consulte con su médico.
- No lo tome con alcohol o productos que contengan alcohol. Es posible que se presenten efectos perjudiciales y hasta mortales.
- Este medicamento puede aumentar las probabilidades de tener convulsiones en algunas personas, incluso en aquellas que ya han tenido convulsiones anteriormente. Hable con su médico para saber si posee un riesgo mayor de tener convulsiones durante la administración de este medicamento.
- El uso a largo plazo de medicamentos opioides puede reducir los niveles de hormonas sexuales. Consulte con el médico si tiene un interés reducido en el sexo, problemas de fertilidad, ausencia de período menstrual o problemas de eyaculación.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.

- Informe a su médico si está amamantando. Este medicamento pasa a la leche materna y podría dañar al bebé. Busque ayuda médica de inmediato si su bebé parece muy somnoliento, está menos activo o tiene problemas para respirar.

Pastilla:

- Cuide sus dientes. Visite regularmente al dentista.
- Si tiene niveles elevados de azúcar en sangre (diabetes), consulte al médico. Algunos de estos productos tienen azúcar.

Parche dérmico (Duragesic):

- El parche puede contener metal conductivo. Quíteselo antes de la resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés).

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de hipoglucemia como vértigo, dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, sacudidas, ritmo cardíaco rápido, confusión, hambre o sudoración.
- Mareos o desmayos graves.

- Confusión.
- Estreñimiento severo o dolor estomacal. Estos pueden ser signos de un problema intestinal grave.
- Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
- Respiración ruidosa.
- Problemas respiratorios durante el sueño (apnea del sueño).
- Dolor de pecho.
- Latidos cardíacos rápidos o lentos.
- Convulsiones.
- Depresión.
- Dificultad para controlar los movimientos del cuerpo.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Cambio en la vista.
- Este medicamento puede provocar un problema grave, y a veces mortal, llamado síndrome de serotonina si se toma con determinados medicamentos. Llame a su médico de inmediato si tiene agitación, problemas de equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o rápidos, enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos o dolor de cabeza muy intenso.
- El uso de medicamentos opioides como este medicamento puede conducir a un problema de las glándulas suprarrenales poco común, pero muy grave. Llame a su médico de inmediato si se siente muy cansado o débil, si se desmaya o si tiene mareos intensos, mucho malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.

Tableta intrabucal:

- Lesiones en la boca.

- Hinchazón en los pies o las manos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Boca seca.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Dolor de cabeza.
- Siente frío.
- Problemas para dormir.
- Sudoración excesiva.
- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.

Tableta intrabucal:

- Hormigueo en la boca.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en

<https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Inyección:

- Este medicamento se administra por inyección.

Parche dérmico (Duragesic):

- Lávese las manos antes y después de usar.
- Toque el lado pegajoso del parche lo menos posible.
- El parche contiene una cantidad elevada de medicamento, incluso después de usarlo. Siga cuidadosamente las instrucciones sobre cómo manipular, almacenar y desechar este medicamento. Consulte con su médico.
- Primero quítese el parche viejo.
- Aplique el parche en la piel limpia, seca y sana, en el pecho, la espalda, la parte superior de la pierna o del brazo.
- Coloque el parche en un área nueva cada vez que lo cambie.
- Si el lugar donde se coloca el parche tiene pelo, mantenga el pelo lo más cerca posible de la piel. No se afeite el pelo.
- No coloque sobre piel en la que recientemente ha aplicado cremas, aceites, lociones u otros productos para la piel.
- No coloque el parche en la zona del cinturón, el bretel del sostén o en los pliegues de piel.
- No es necesario que se coloque el parche cerca de o en la zona del dolor para que este funcione.
- Después de colocarse el parche, usted podrá bañarse, ducharse o nadar por períodos de tiempo cortos. Para ayudar a mantener el parche en su lugar, cúbralo con plástico y cinta adhesiva.
- Si el parche se desprende, reemplácelo por uno nuevo.

- Si tiene un problema con el parche que no se pega, puede poner cinta de primeros auxilios en los bordes del parche para mantenerlo en su lugar. Si el parche todavía no se pega, puede colocar una gasa transparente (como Bioclusive o Askina Derm) sobre el parche. Asegúrese de saber qué tipo de gasa transparente puede usar. **No** cubra el parche con otros vendajes o cinta.
- No corte ni divida los parches. No use parches que estén dañados.
- No permita que el área donde se colocó el parche tenga contacto con la piel de otra persona.
- Si el parche entra en contacto con la piel de otra persona, quíteselo inmediatamente. Lave la zona con agua y consiga asistencia médica para esa persona de inmediato. El ingreso de este medicamento en la piel de otra persona puede causar efectos secundarios graves e incluso la muerte.
- El uso indebido o el abuso de este medicamento colocándose en la boca o masticándolo, tragándolo, inyectándolo o inhalándolo puede provocar una sobredosis y la muerte.

Pastilla:

- Coloque la gragea en la boca entre la mejilla y la encía inferior. Muévela de un lado a otro en su boca usando el asa.
- Chupe la pastilla oral. No las mastique, parta ni triture. No la trague entera.
- Después de una dosis, tire el mango a la basura fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si quedara algo de medicamento en el mango, échele agua caliente antes de tirarlo para asegurarse de que el medicamento se disuelva.

Tableta intrabucal:

- Úsese inmediatamente después de abrir.
- Coloque la tableta en la boca por encima de un molar posterior, entre la parte superior de la mejilla y la encía, y deje que se disuelva. También

puede colocarla debajo de la lengua y dejar que se disuelva.

- No las mastique, parta ni triture.
- No coma ni beba hasta que el medicamento se haya disuelto por completo.
- Si el medicamento no se disolvió completamente en 30 minutos, puede tragar el resto con agua.
- Cambie el lado de la boca con cada dosis.

Pulverizador nasal:

- Solo para nariz.
- Prepare la bomba antes de utilizarla por primera vez rociando 4 veces en la bolsita incluida. Si no lo ha usado los últimos 5 días, vuelva a preparar el medicamento rociando 1 vez.
- Cierre uno de los orificios nasales.
- Coloque el aerosol $\frac{1}{2}$ pulgada dentro de la fosa nasal. Presione hacia abajo en el gatillo. Oirá un chasquido que le indica que se administró la dosis.
- Este inhalador tiene un contador de dosis para registrar las dosis restantes. Cuando el contador de dosis muestre un 8, rocíe el resto de medicamento en la bolsa. No intente pulverizar más de 8 pulverizaciones de un frasco. Ponga la bolsa y el frasco vacío en el contenedor de almacenamiento y deséchelo.
- Luego de haber sostenido la bolsa, lave sus manos de inmediato.

Aerosol o pulverizador para debajo de la lengua (sublingual):

- Rocíe dentro de la boca, debajo de la lengua.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Parche dérmico (Duragesic):

- Aplique el parche saltado lo antes posible luego de retirar el usado.
- No aplique doble dosis ni dosis adicionales.

Inyección:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

Todas las demás presentaciones:

- Si usa este medicamento con regularidad, use la dosis que saltó tan pronto como lo recuerde.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome 2 dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Muchas veces este medicamento se toma según sea necesario. No lo tome con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Inyección:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las demás presentaciones:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

Pulverizador nasal:

- Luego de cada uso, vuelva a colocar la botella en el contenedor de almacenamiento que viene con este medicamento.
- Proteja de la luz.
- Después de abierto, deseche la porción que no utilice luego de 60 días.

Parche dérmico (Duragesic):

- Luego de retirar un parche dérmico, asegúrese de doblarlo con los lados pegajosos unidos. Deseche los parches usados fuera del alcance de niños y mascotas.

Todas las presentaciones:

- Guarde este medicamento en un lugar seguro donde los niños no puedan verlo ni alcanzarlo, y donde otras personas no puedan alcanzarlo. Una caja o área cerrada puede ayudar a mantener este medicamento seguro. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Se puede usar un medicamento llamado naloxona para ayudar a tratar una sobredosis de este medicamento. Hable con su médico o farmacéutico sobre cómo obtener o tomar naloxona. Si cree que ha habido una sobredosis, busque atención médica de inmediato, incluso si se ha utilizado naloxona. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-01-17

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Fentanyl - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center