



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Lansoprazole

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## **Nombres comerciales: EE. UU.**

FT Acid Reducer [OTC]; GoodSense Lansoprazole [OTC]; Prevacid; Prevacid SoluTab

## **Nombres comerciales: Canadá**

APO-Lansoprazole; M-Lansoprazole; MYLAN-Lansoprazole; PMS-Lansoprazole [DSC]; Prevacid; Prevacid FasTab; RIVA-Lansoprazole; SANDOZ Lansoprazole; TARO-Lansoprazole; TEVA-Lansoprazole

## **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar o evitar úlceras gastrointestinales provocadas por una infección.
- Se utiliza para tratar o evitar las úlceras gástricas asociadas con los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en pacientes con antecedentes de úlcera. Algunos ejemplos de AINE son el ibuprofeno y el naproxeno.
- Se utiliza para tratar la enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE, reflujo de ácido).
- Este medicamento se utiliza para tratar el ardor de estómago.
- Este medicamento se utiliza para tratar los síndromes provocados por la cantidad elevada de ácidos estomacales.
- Este medicamento se utiliza para tratar o evitar úlceras en el esófago.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su

médico.

## **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: heces de color negro o con sangre; ardor estomacal con aturdimiento, sudoración, mareos o sibilancia; dolor de pecho; dolor en los hombros con dificultad para respirar; dolor que se extiende a los brazos, cuello u hombros; aturdimiento; abundante sudoración; vómitos con sangre; o problemas o dolor al tragar alimentos.
- Si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: Atazanavir, metotrexato, nelfinavir, rilpivirina o warfarina.
- Si está tomando algunos de los siguientes medicamentos: rifampina o hierba de San Juan.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

### **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y

dentistas.

- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de fracturas de cadera, columna vertebral o muñeca en personas con huesos débiles (osteoporosis). El riesgo puede ser mayor si toma este medicamento en grandes dosis o si lo toma durante más de un año, o si es mayor de 50 años.
- Tenga cuidado si está en riesgo por huesos blandos y frágiles (osteoporosis). Algunos de estos riesgos incluyen consumir alcohol, fumar, tomar esteroides, tomar medicamentos para tratar convulsiones o tener familiares con osteoporosis. Hable con el médico acerca de los riesgos de la osteoporosis.
- En pocas ocasiones, las personas que consumieron medicamentos como este durante al menos 3 meses han experimentado niveles bajos de magnesio. La mayoría de las veces, esto sucedió después de 1 año de tratamiento. Los niveles bajos de magnesio pueden provocar otros problemas de electrolitos. Es posible que tenga que hacerse un análisis de sangre según le haya indicado su médico.
- Los tratamientos a largo plazo (por ejemplo, más de 3 años) con medicamentos como este rara vez causaron niveles bajos de vitamina B12. Consulte con el médico de inmediato si presenta síntomas de bajos niveles de vitamina B12 como falta de aire, mareos, frecuencia cardíaca anormal, debilidad muscular, piel pálida, cansancio, cambios en el estado de ánimo o adormecimiento u hormigueo en los brazos y las piernas.
- Este medicamento ha generado lupus, y las personas que ya padecían lupus, empeoraron. Informe al médico si tiene lupus. Llame al médico de inmediato si tiene signos de lupus, como erupción en las mejillas u otras partes del cuerpo, cambio en el color de la piel, predisposición a quemaduras por exposición al sol, dolor muscular o articular, dolor de pecho o falta de aire, o hinchazón de los brazos o de las piernas.
- El riesgo de crecimientos estomacales llamados pólipos de la glándula fúndica puede ser mayor en personas que toman este medicamento durante más de 1 año. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a

todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.

- Si tiene fenilcetonuria (PKU), hable con el médico. Algunos productos contienen fenilalanina.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

## **Niños:**

- No se recomienda el uso de este medicamento en niños menores de 1 año. Este medicamento podría causarles daño. Sin embargo, es posible que el médico decida que los beneficios superan los riesgos. Si a su hijo se le ha administrado este medicamento, pídale al médico información sobre los beneficios y los riesgos. Hable con el médico si tiene preguntas sobre cómo administrar este medicamento a su hijo.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas electrolíticos como cambios de humor; confusión; dolor muscular, calambres o espasmos; debilidad; temblores; cambios en el equilibrio; latidos cardíacos anormales; convulsiones; pérdida del apetito; o malestar estomacal severo o vómitos.

- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Mareos o desmayos.
- Entumecimiento u hormigueo en las manos o en los pies.
- Piel pálida.
- Dolor de huesos.
- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de desarrollar una forma grave de diarrea llamada diarrea asociada con *Clostridium difficile* (C diff) (DACD). Llame a su médico de inmediato si presenta dolores estomacales, cólicos, o heces muy blandas, acuosas o con sangre. No intente tratar la diarrea sin consultar primero con su médico.
- Se pueden producir reacciones cutáneas graves con este medicamento. Estas incluyen el síndrome de Stevens-Johnson (SJS), la necrólisis epidérmica tóxica (TEN) y otras reacciones graves. A veces, los órganos del cuerpo también pueden verse afectados. Estas reacciones pueden ser mortales. Busque ayuda médica de inmediato si presenta signos como piel roja, hinchada, con ampollas o descamación; ojos rojos o irritados; llagas en la boca, garganta, nariz, ojos, genitales o cualquier zona de la piel; fiebre; escalofríos; dolores corporales; falta de aire; o inflamación de los ganglios.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Estreñimiento.
- Dolor estomacal o diarrea.

- Náuseas.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en

<https://www.fda.gov/medwatch>.

## **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Todas las presentaciones:**

- Tome este medicamento antes de las comidas.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- Si usted también toma sucralfato, tome este medicamento al menos 30 minutos antes de tomar sucralfato.
- Aquellas personas que poseen sondas de alimentación pueden consumir este medicamento. Administre este medicamento según fue indicado. Enjuague la sonda de alimentación después de administrar este medicamento.

### **Cápsulas:**

- Trague entera. No muerda o triture.
- Puede rociar el contenido de una cápsula en 1 cucharada (15 mL) de puré de manzanas, pudín Ensure®, queso cottage, yogurt or peras coladas. No mastique los gránulos.
- Puede mezclar el contenido de la cápsula con 60 mL de jugo de manzana,

naranja o tomate. Tragar inmediatamente. No mastique los gránulos.

- Después de mezclar, tome su dosis de inmediato. No almacene para usar en el futuro.

### **Tableta de disolución oral:**

- Colóquela sobre la lengua y deje que se disuelva. No se necesita agua. No la trague entera. No mastique, rompa ni triture el medicamento.
- También puede disolver la tableta en una jeringa oral con agua. Coloque la tableta en una jeringa oral. Para las tabletas de 15 mg, coloque 4 ml de agua. Para las tabletas de 30 mg, coloque 10 ml de agua. Agite suavemente hasta que la tableta se disuelva. Tome dentro de los 15 minutos de haberlos mezclado. Después de tomar, vuelva a llenar la jeringa con 2 ml de agua para las tabletas de 15 mg o 5 ml para las tabletas de 30 mg. Agite suavemente y trague.

### **Líquido (suspensión):**

- El farmacéutico deberá mezclar este medicamento antes de que usted lo reciba.
- Agite bien antes de usar.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

### **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

#### **Cápsulas y tabletas de disolución oral:**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja del calor.
- Mantenga la tapa cerrada herméticamente.

### **Líquido (suspensión):**

- Guarde el líquido (suspensión) en el refrigerador. Tire cualquier porción sin usar después de 30 días.
- No congelar.

### **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

### **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local



o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2023-08-22

## **Derechos de autor**

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Lansoprazole - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center