



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Maralixibat

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Livmarli

Nombres comerciales: Canadá

Livmarli

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se usa para tratar la picazón en ciertas personas con la colestasis intrahepática familiar progresiva (PFIC).
- Se utiliza para tratar la picazón en personas con síndrome de Alagille (ALGS).

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su

médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si ha sufrido una insuficiencia hepática que le haya causado problemas graves como hemorragias, inflamación o problemas cerebrales.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.

- Usted quizá deba tomar ciertos suplementos como vitamina A, D, E y K mientras toma este medicamento. Asegúrese de respetar lo que su médico le ha dicho.
- Este medicamento puede aumentar el riesgo de fracturas. Consulte al médico.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Niños:

- Si le da este medicamento a su hijo y el peso de su hijo cambia, consulte con el médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Úselo con precaución en niños. El propilenglicol es parte de este medicamento y puede causar efectos secundarios graves en los niños. Los niños menores de 5 años pueden tener un riesgo mayor.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar

relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Dolor de huesos.
- Fiebre, debilidad o palidez.
- Latidos cardíacos anormales.
- Convulsiones.
- Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
- Sentirse muy somnoliento o mareado.
- Calambres musculares.
- Este medicamento ha provocado problemas hepáticos. A veces, esto fue grave y ha llegado a requerir un trasplante de hígado u ocasionar la muerte. Llame al

médico de inmediato si presenta signos de nuevos o peores problemas hepáticos como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal, dolor estomacal, inflamación o aumento de peso rápido, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.

- Llame a su médico de inmediato si tiene diarrea grave o duradera, vómitos. Llame a su médico si tiene diarrea con heces con sangre o signos de deshidratación como sequedad en la piel, boca u ojos, sed, dolor de cabeza, incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, latidos rápidos; mareos; respiración acelerada o confusión.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Es común tener diarrea, dolor de estómago, vómitos y malestar estomacal mientras toma este medicamento. Si usted tiene estos efectos secundarios, comuníquese con su médico para averiguar cómo evitar la

deshidratación.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento 30 minutos antes de una comida.
- Si toma este medicamento una vez al día, tómelo por la mañana.
- Siéntese o párese mientras toma el medicamento. No tome este medicamento estando acostado.
- Espere unos minutos después de tomar este medicamento antes de acostarse.

- Si no ha tomado la dosis completa, omita la parte faltante y tome la siguiente dosis en el horario habitual.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.
- No utilice una cucharilla doméstica ni ningún otro dosificador para medir la dosis.
- Deseche el dispositivo de medición después de 100 días. Utilice uno nuevo. Si no tiene un nuevo dispositivo de medición, consulte al farmacéutico.
- Coloque la punta del dispositivo de medición contra el interior de la mejilla. Empuje el émbolo lentamente para administrar toda la dosis. Limpie el dispositivo de medición con agua después de cada uso.
- Vuelva a tapar después de tomar la dosis.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- No tome colesevelam, colestipol o colestiramina hasta 4 horas antes o 4 horas después de tomar este medicamento.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Si se toma 1 vez al día:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si pasaron más de 12 horas desde la dosis faltante, omita la dosis faltante y continúe con el horario normal.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Si se toma 2 veces al día:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si han transcurrido más de 6 horas desde la dosis faltante, omítala y continúe con su horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja del calor. No deje este medicamento a temperaturas superiores a 30 °C (86 °F).
- Una vez abierto el producto y transcurridos 100 días desde entonces, deseche las partes que no haya utilizado.

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera,

farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso

de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-08-13

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Maralixibat - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center