



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Metoclopramide

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Gimoti; Reglan

### **Nombres comerciales: Canadá**

MAR-Metoclopramide; Metonia [DSC]; PMS-Metoclopramide; PMS-Metoclopramide HCl

## **Advertencia**

- Algunas personas pueden tener un problema muscular grave llamado discinesia tardía. Este problema puede disminuir o desaparecer después de suspender este medicamento, pero es posible que no desaparezca. El riesgo es mayor en personas con diabetes y en adultos mayores, especialmente en mujeres mayores. El riesgo es mayor con el uso prolongado o dosis más altas, pero también puede ocurrir después del uso a corto plazo en dosis bajas. Llame a su médico de inmediato si tiene dificultades para controlar los movimientos corporales o problemas con la lengua, el rostro, la boca o la mandíbula, como lengua que sobresale de la boca, mejillas hinchadas, boca fruncida o masticación.
- Evite tomar este medicamento durante más de 12 semanas. Consulte al médico.

## **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar el ardor de estómago.
- Este medicamento se utiliza para tratar o evitar el

malestar estomacal y los vómitos.

- Se utiliza para tratar la enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE, reflujo de ácido).
- Se utiliza en algunas personas para tratar el tránsito lento a través del tracto gastrointestinal.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

## **Niños:**

- Este medicamento no está aprobado para su administración en niños. Sin embargo, el médico puede decidir que los beneficios de tomar este medicamento superan los riesgos. Si el niño ha estado recibiendo este medicamento, pida al médico la información sobre los riesgos y beneficios. Consulte al médico si tiene preguntas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

## **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si alguna vez tuvo un problema muscular grave (discinesia tardía) u otro problema muscular al tomar este medicamento.
- Si tiene o ha tenido depresión o pensamientos suicidas.
- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: hemorragia gastrointestinal, orificio en el tubo digestivo, obstrucción intestinal, feocromocitoma o convulsiones, enfermedad de Parkinson o presión arterial alta.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: enfermedad renal o enfermedad hepática.
- Si su médico le ha dicho que usted es un metabolizador lento de algunos medicamentos.
- Si toma algún medicamento que aumente la posibilidad de causar movimientos corporales que no pueda controlar. Existen muchos medicamentos que pueden producir esto. Consulte con el médico o farmacéutico si no está seguro.
- Si toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas) que no debe tomarse junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que se utilizan para tratar la depresión, el dolor o la enfermedad de Parkinson.

Existen muchos medicamentos que no deben tomarse con este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

### **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.

- Si es diabético, vigile cuidadosamente el nivel de azúcar en la sangre.
- Evite el consumo de alcohol, marihuana u otras formas de cannabis, o los medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Si deja de tomar este medicamento en forma repentina, puede tener signos de abstinencia. Informe a su médico si tiene algún efecto secundario.
- Si tiene alergia a la tartrazina (FD&C Amarillo n.º 5), hable con su médico. Algunos productos contienen tartrazina.
- No tome una dosis mayor de la que el médico le indicó que tome. Tomar más de lo indicado puede aumentar la probabilidad de experimentar efectos secundarios graves.
- No tome este medicamento durante más tiempo del que le indicó su médico.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Temblor, dificultad para moverse, entumecimiento.
- Agitación.
- Problemas para dormir.
- Problemas para controlar los movimientos corporales,

contracciones musculares, cambios en el equilibrio, problemas para tragar o hablar.

- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.
- Cambio en la frecuencia con la que orina.
- Incapacidad de controlar las ganas de orinar.
- Cambio en la vista.
- Fiebre, escalofríos o dolor de garganta.
- Aumento de tamaño de los pechos, secreción del pezón, incapacidad de conseguir o mantener una erección, cambios en el período menstrual.
- Puede ocurrir un problema de salud grave y, en ocasiones, mortal, llamado síndrome neuroléptico maligno (SNM). Llame a su médico de inmediato si tiene fiebre, calambres o endurecimiento en los músculos, mareos, dolor de cabeza intenso, confusión, cambios en el pensamiento, frecuencia cardíaca acelerada, latidos anormales o sudoración excesiva.
- Este medicamento puede provocar un problema grave, y a veces mortal, llamado síndrome de serotonina si se toma con determinados medicamentos. Llame a su médico de inmediato si



tiene agitación, problemas de equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o rápidos, enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos o dolor de cabeza muy intenso.

- En algunos casos, ha producido depresión y pensamientos suicidas. Algunas personas que tomaron este medicamento se han suicidado. Llame a su médico de inmediato si tiene signos de depresión, pensamientos suicidas, altibajos emocionales, pensamiento anormal, ansiedad o falta de interés en la vida.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### **Todas las presentaciones:**

- Somnolencia.

- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.
- Se siente cansado o débil.
- Dolor de cabeza.

### **Pulverizador nasal:**

- Cambios en la capacidad de percibir sabores.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Todos los productos orales:**

- Tome este medicamento al menos 30 minutos antes de las comidas y antes de acostarse, a menos que el

médico indique lo contrario.

### **Tableta de disolución oral:**

- No retire el medicamento del blíster hasta que vaya a tomarlo. Una vez abierto el blíster, tome el medicamento de inmediato. No guarde el medicamento que retiró del blíster, para usarlo posteriormente.
- No empuje la tableta fuera del envoltorio de aluminio cuando lo abra. Con las manos secas, retírela del envoltorio de aluminio. Colóquela sobre la lengua y deje que se disuelva. No se necesita agua. No la trague entera. No mastique, rompa ni triture el medicamento.

### **Solución oral:**

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

### **Pulverizador nasal:**

- Solo para nariz.
- Tome este medicamento al menos 30 minutos antes de las comidas y antes de acostarse, a menos que el médico indique lo contrario.

- Antes del primer uso, prepárelo pulverizando 10 veces en el aire lejos de su cara.
- Coloque la punta de la bomba en un lado de la nariz y apunte hacia la parte trasera y externa del orificio nasal. Incline la cabeza un poco hacia adelante y mantenga el frasco derecho.
- Use un dedo para tapar suavemente el otro lado de la nariz. Inhale por el orificio nasal abierto y presione la bomba con presión firme y uniforme. Limpie la punta con un paño después de cada uso.
- Rocíe únicamente la nariz. No rocíe las paredes que unen las fosas nasales.
- Exhale a través de la boca.
- Si no está seguro de que el aerosol nasal haya entrado en la nariz, no use otra dosis. Tome la próxima dosis a la hora normal.

## **Inyección:**

- Este medicamento se administra por inyección intramuscular o intravenosa.

## **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

### **Todos los productos orales:**

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.

- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### **Pulverizador nasal:**

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### **Inyección:**

- Llame al médico para obtener instrucciones.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

#### **Todos los productos orales:**

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

#### **Solución oral:**

- No congelar.

#### **Pulverizador nasal:**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

- Deseche toda porción que no utilice después de 28 días de abrir.

## **Inyección:**

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

## **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos,

los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2023-04-26

## **Derechos de autor**

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.



Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Metoclopramide - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center