



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Mifepristone and Misoprostol

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## **Nombres comerciales: Canadá**

Mifegymiso

### **Advertencia**

- Después de tomar este medicamento, haga un seguimiento con su médico como se le ha indicado.
- Rara vez puede haber infecciones graves, hemorragia u otros problemas luego de cualquier tipo de aborto. Esto incluye cuando se usa este medicamento para terminar el embarazo. A veces, estos problemas pueden ser mortales.
- Asegúrese de saber a quién debe llamar y qué debe hacer en caso de emergencia. Esto incluye ir a una sala de emergencias si no puede ubicar a su médico. Llame a su médico de inmediato si tiene

fiebre que no desaparece, dolor abdominal muy fuerte, frecuencia cardíaca acelerada, gran cantidad de sangrado vaginal que no desaparece o desmayos.

- Si se dirige a un centro de emergencia médica o a algún otro médico, lleve la tarjeta de información del paciente.
- Si este medicamento no surte efecto en 2 días, su médico puede recetarle otro medicamento. Llame a su médico de inmediato si siente dolor estomacal, debilidad, malestar estomacal o vómitos o diarrea durante más de 24 horas después de tomar el otro medicamento.
- Una vez que comience a tomar este medicamento, asegúrese de finalizar ambas etapas. Tanto la mifepristona como el misoprostol provocar defectos de nacimiento si usted aún está embarazada.
- Si este medicamento no provoca un aborto completo, puede ser necesaria una cirugía. Asegúrese de que conoce acerca de este medicamento, para qué es, cómo administrarlo, y cuándo volver a ver a su médico. Debe estar de acuerdo con el aborto y la cirugía en caso de que sean necesarios. Debe leer el folleto de

información de la medicación del paciente y la tarjeta de información del paciente y firmar un consentimiento.

- Puede quedar embarazada de nuevo luego de que termine su embarazo. Si no quiere volver a embarazarse, comience a utilizar un método anticonceptivo en el que confíe para evitar el embarazo tan pronto como concluya el embarazo o antes de volver a tener relaciones sexuales.
- Consulte con el médico si desea embarazarse nuevamente. Para disminuir el riesgo de defectos de nacimiento, evite embarazarse nuevamente antes de su próximo período menstrual. Utilice un método anticonceptivo para prevenir el embarazo durante 1 mes después de tomar este medicamento.
- Puede producirse una reacción cutánea muy grave (necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta signos como enrojecimiento, inflamación, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o heridas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

## **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para terminar un embarazo.

## **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: problemas en la glándula suprarrenal; anemia; asma; problemas de hemorragia; enfermedad del corazón o los vasos sanguíneos; problemas del hígado o de los riñones; mala nutrición; o porfiria.
- Si tiene un embarazo que no se encuentra dentro del útero (embarazo ectópico).
- Si tiene colocado el dispositivo intrauterino.
- Si no puede seguir las indicaciones que le brinda su médico para terminar su embarazo o si no puede ir a un centro de emergencia médica en caso de que lo necesite.

- Si no está segura de cuánto tiempo ha estado embarazada.
- Si no puede entender o seguir las indicaciones del acuerdo entre el paciente y el proveedor de salud médica.
- Si está tomando un anticoagulante o toma un esteroide de acción prolongada, como la prednisona.
- Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.
- Si el paciente es un niño que aún no ha iniciado la pubertad.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

**¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este**

## **medicamento?**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Si bebe jugo de toronja (pomelo) o si come toronjas (pomelos) con frecuencia, consulte con su médico.
- Este medicamento no debe usarse de manera regular o frecuente para evitar un embarazo. Consulte con el médico si necesita usar un método anticonceptivo de emergencia con frecuencia.
- Este medicamento no está aprobado para ser utilizado si está experimentando o ha experimentado la menopausia.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los

siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Hemorragia fuerte (cuando se humedecen 2 toallitas por hora).
- Grave irritación vaginal.
- Dolor pélvico.
- Mareos o desmayos.

- Confusión.
- Respiración acelerada.
- Falta de aire.
- Latido cardíaco acelerado.
- Cambio en la cantidad de orina.
- Boca seca.
- Sed inusual.
- Convulsiones.
- Es normal tener una hemorragia vaginal luego de tomar este medicamento. La mayoría de las veces, la hemorragia dura alrededor de 11 días. También es normal que la hemorragia vaginal sea más abundante de lo normal durante 2 o 3 días. Llame a su médico de inmediato si la hemorragia vaginal continúa, si hay hemorragia vaginal abundante que no desaparece o si le preocupa la hemorragia vaginal.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos



secundarios o no desaparece:

- Hemorragia vaginal.
- Dolor de cabeza.
- Se siente cansado o débil.
- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.
- Dolor estomacal o cólicos.
- Mamas sensibles.
- Acaloramiento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Asegúrese de saber cuándo y cómo tomar misoprostol luego de haber tomado mifepristona. Si tiene preguntas, hable con su médico o farmacéutico.
- La mayoría de las personas terminarán el embarazo en un período de 2 a 24 horas luego de tomar misoprostol. Durante este período, tendrá hemorragia y cólicos que probablemente serán más fuertes de lo normal. Asegúrese de tomar el misoprostol en un lugar adecuado para estar preparada. Si tiene alguna pregunta, hable con su médico.

### **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- Llame al médico para obtener instrucciones.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

### **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro.

Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de

esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2022-07-11

## Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Mifepristone and Misoprostol - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center