



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Ponesimod

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Ponvory; Ponvory Starter Pack

Nombres comerciales: Canadá

Ponvory; Ponvory Initiation Pack

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la esclerosis múltiple.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si alguna vez ha tenido alguno de los siguientes problemas de salud: ciertos tipos de latidos cardíacos anormales (obstrucción en el corazón, síndrome del seno enfermo, latidos cardíacos lentos, intervalo de QT largo en el electrocardiograma [ECG]), dolor de pecho (angina), ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, problemas en los vasos sanguíneos del cerebro (como ataque isquémico transitorio [AIT] o accidente cerebrovascular), presión arterial alta o apnea del sueño.
- Si tiene enfermedad hepática.
- Si tiene una infección.
- Si se ha aplicado la vacuna contra la varicela en el último mes.
- Si recientemente le administraron una vacuna viva.
- Si recibe algún tipo de fototerapia, consulte al médico.
- Si ha tomado alemtuzumab.
- Si está tomando o ha tomado recientemente algún medicamento que pueda causar latidos cardíacos lentos, un cierto tipo de latidos cardíacos anormales (intervalo QT prolongado) o suprimir su sistema inmunitario. Existen muchos medicamentos que pueden provocar esto. Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Deberá controlar los análisis de sangre y la función cardíaca tal como le haya indicado su médico. También tendrá que hacerse exámenes oculares y de la piel.
- Se han presentado casos de presión arterial alta con este medicamento. Verifique su presión arterial según le haya indicado el médico.
- El médico puede solicitar un estudio de IRM antes de

empezar a tomar este medicamento.

- Si no ha tenido varicela ni se ha aplicado la vacuna contra esta enfermedad, consulte al médico.
- Este medicamento permanece en el cuerpo y puede afectar su sistema inmunológico durante 1 a 2 semanas después de su última dosis. Si va a tomar otro medicamento que inhibirá su sistema inmunológico dentro de las 2 semanas posteriores a la suspensión de este medicamento, hable con su médico.
- Es posible que tenga más probabilidad de contraer una infección mientras toma este medicamento y durante 2 semanas después de dejar de tomarlo. Algunas infecciones con medicamentos como este han puesto en peligro la vida o, en raras ocasiones, han sido mortales. Lávese las manos con frecuencia. Manténgase alejado de personas que tengan infecciones, resfríos o gripe.
- Consulte con el médico antes de recibir cualquier vacuna mientras tome este medicamento y al menos durante 2 semanas después de dejar de tomarlo. Si se utiliza con este medicamento puede aumentar el riesgo de infección o bien hacer que la vacuna no funcione con eficacia.
- Cuando se suspende este medicamento, los signos de

EM pueden regresar, incluso peor que antes o durante el tratamiento. Si deja de tomar este medicamento y sus signos de EM empeoran, llame a su médico de inmediato.

- No deje de tomar este medicamento sin consultar al médico que se lo recetó.
- Con este tipo de medicamentos se ha observado un mayor riesgo de cáncer de piel. Evite el sol, las lámparas solares y las camas solares. Use protector solar con un FPS alto y use ropa que lo proteja del sol.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo.
- Si puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y por 1 semana después de su última dosis. Si queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte,

al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Signos de meningitis como dolor de cabeza con fiebre, rigidez en el cuello, malestar estomacal, confusión, o si le molesta la luz.

- Signos de infecciones por herpes como herpes labial, herpes zóster, llagas en los genitales, dolor de cabeza intenso, confusión, cambio en la visión, enrojecimiento o dolor de los ojos.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Signos de cáncer de piel, como una nueva verruga, un bulto u otro crecimiento en la piel; una llaga que sangra o que no sana; un bulto brillante, blanco, rosado, rojo o del color de la piel que sangra o no sana; o un cambio en el color o tamaño de un lunar.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Falta de aire.
- Problema para respirar reciente o que empeoró.
- Este medicamento puede provocar latidos cardíacos lentos o anormales, en especial después de su primera dosis. Se deberá supervisar de cerca a personas con ciertos problemas cardíacos durante un tiempo después de la primera dosis de este medicamento. Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, informe a su médico sobre todos los

medicamentos que toma y los problemas de salud que tiene. Llame a su médico de inmediato si se siente confundido o tiene mareos, latidos cardíacos lentos o anormales, cansancio o dolor de pecho.

- Se presentó un problema ocular llamado edema macular con el uso de este medicamento. El riesgo puede ser mayor si tiene diabetes o ha tenido uveítis. Durante un largo periodo de tiempo (como 6 meses), el edema macular puede provocar una pérdida duradera de la vista. Llame inmediatamente a su médico si la luz le molesta en los ojos o si ve colores anormales; si tiene visión borrosa, sombras o un punto ciego en el centro de la vista; o cualquier otro cambio en la vista.
- Este medicamento puede provocar un problema cerebral muy grave llamado síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES). Esto puede ser mortal. Llame al médico de inmediato si presenta signos de confusión, disminución del nivel de alerta, cambios en la vista, pérdida de visión, convulsiones o dolor de cabeza muy fuerte.
- Este medicamento puede causar un problema cerebral grave llamado leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). Esto puede ser más probable cuanto más tiempo tome este medicamento. Los

signos pueden empeorar incluso meses después de dejar este medicamento. La PML puede provocar discapacidad o puede ser mortal. Informe a su médico de inmediato si tiene síntomas como confusión, problemas de memoria, depresión, cambios en su comportamiento, cambios en la fuerza de 1 lado del cuerpo que es mayor que la del otro lado, problemas para hablar o pensar, cambios en el equilibrio o cambios en la vista.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Signos de un resfrío común.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Mareos.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento con o sin comida.
- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible. Luego, vuelva a tomar 1 tableta cada día como se le indicó.
- No tome más de 1 dosis de este medicamento dentro el mismo día.
- Si olvida tomar 4 dosis, llame a su médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Conserve en su envase original. No retire el cubo o paquete que absorbe la humedad.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la

evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-06-24

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Ponesimod - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center