



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Sumatriptan

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Imitrex; Imitrex STATdose Refill; Imitrex STATdose System; Onzetra Xsail; Tosymra; Zembrace SymTouch

Nombres comerciales: Canadá

APO-SUMAtriptan; Imitrex; Imitrex DF; JAMP-Sumatriptan; JAMP-Sumatriptan DF; MYLAN-SUMAtriptan; PMS-SUMAtriptan; RATIO-SUMAtriptan; SUMAtriptan DF; TARO-SUMAtriptan; TEVA-SUMAtriptan; TEVA-SUMAtriptan DF

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la jaqueca.
- Este medicamento se utiliza para tratar los dolores de cabeza “en racimo”.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene alguno de los trastornos siguientes: Presión arterial alta o enfermedad hepática.
- Si alguna vez ha tenido cualquiera de los siguientes problemas de salud: presión o dolor en el pecho, arterias tapadas que van hacia a las piernas o

brazos, ataque cardíaco, enfermedad cardíaca, flujo sanguíneo insuficiente en el corazón, el cerebro, los intestinos o los riñones, accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio (AIT), ciertas migrañas, como migrañas hemipléjicas o basilares, o latidos del corazón anormales, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White.

- Si tomó ciertos medicamentos para tratar la depresión, como isocarboxazida, fenelzina o tranilcipromina, en los últimos 14 días. El uso de este medicamento en el plazo de 14 días luego de haber tomado esos otros medicamentos puede ocasionar presión arterial alta muy grave.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si ha tomado almotriptán, eletriptán, frovatriptán, naratriptán, rizatriptán o zolmitriptán en las últimas 24 horas.
- Si ha tomado ergotamina, metisergida, dihidroergotamina u otro medicamento similar durante las últimas 24 horas.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención

completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.

- Se han presentado casos de presión arterial alta con este medicamento. Verifique su presión arterial según le haya indicado el médico.
- Este medicamento no se indica para evitar o disminuir la cantidad de dolores de cabeza por migraña.
- Si tiene un dolor de cabeza que no se asemeja a las migrañas normales, hable con el médico antes de tomar este medicamento.
- Tomar más cantidad de medicamento (una dosis mayor, o más a menudo) de lo que le indicó su médico puede hacer que los dolores de cabeza empeoren.
- Tenga cuidado si tiene riesgos de enfermedad cardíaca (hipertensión arterial, colesterol alto, sobrepeso, azúcar alta en sangre, diabetes, tabaquismo u otro consumo de nicotina, hombre mayor de 40 años, si tiene familiares con enfermedad cardíaca temprana o es mujer postmenopáusica). Consulte con el médico.
- En raras ocasiones se informaron problemas cardíacos muy graves, y a veces mortales, como ataque cardíaco o frecuencia cardíaca que no es normal después de unas horas de la toma de este medicamento. Llame al médico de inmediato si siente rigidez, dolor, presión o pesadez en el pecho, garganta, cuello o quijada, si sufre de sudoración fría, falta de aire, frecuencia cardíaca acelerada, frecuencia cardíaca que no es normal o mareos fuertes o desmayos.
- Si es alérgico al látex, consulte al médico. Algunos productos tienen látex.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Niños:

- Este medicamento no está aprobado para su administración en niños. Sin

embargo, el médico puede decidir que los beneficios de tomar este medicamento superan los riesgos. Si el niño ha estado recibiendo este medicamento, pida al médico la información sobre los riesgos y beneficios. Consulte al médico si tiene preguntas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta. En muy pocas ocasiones, algunas reacciones alérgicas han puesto en riesgo la vida.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Convulsiones.
- Pérdida de la vista. Esto puede durar durante mucho tiempo.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Color azul o gris de la piel, los labios, el lecho ungueal, los dedos de las manos o de los pies.
- Diarrea o estreñimiento.
- Dolor estomacal intenso o diarrea con sangre.
- Dolor estomacal luego de comer.
- Fiebre.
- Pérdida de peso.

- Calambres y dolor en las piernas o la cadera.
- Sensación de pesadez o rigidez en los músculos de las piernas.
- Siente frío.
- Ardor o dolor persistente en los pies o los dedos de los pies.
- Puede provocar un problema grave, y a veces mortal, denominado síndrome de serotonina. El riesgo puede ser mayor si también toma otros medicamentos determinados. Llame a su médico de inmediato si tiene agitación, problemas de equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o rápidos, enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos, o dolor de cabeza muy intenso.
- En raras ocasiones, se informaron problemas graves, y en ocasiones mortales, en los vasos sanguíneos del cerebro, como accidentes cerebrovasculares, debido a la ingesta de este medicamento. Llame a su médico de inmediato si tiene debilidad en 1 lado del cuerpo, dificultades para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída en 1 lado de la cara o cambios en la visión.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Sentirse mareado, somnoliento, cansado o débil.
- Acaloramiento.
- Sensación de calor.
- Náusea o vómito.

Pulverizador nasal:

- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Ardor.
- Irritación en la nariz o garganta.

Polvo nasal:

- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Goteo o congestión nasal.

Inyección:

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en

<https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Si su dolor de cabeza no mejora después de la primera dosis, hable con su médico. Si su dolor de cabeza mejora pero luego regresa o si solo obtiene un poco de alivio, puede tomar 1 dosis más si su médico se lo ha indicado. Asegúrese de saber con cuántas horas debe esperar antes de tomar otra dosis. Esto también se aplica si se usó una forma diferente de este medicamento para la primera dosis.

Tabletas:

- Tome este medicamento con o sin comida.
- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Tome este medicamento con líquidos lo antes posible luego de haberse iniciado el ataque.

Inyección:

- La inyección se aplica debajo de la piel lo antes posible una vez que se haya iniciado el ataque.
- Asegúrese de saber cómo utilizar este medicamento antes de necesitarlo. Lea el prospecto y las instrucciones de uso que vienen con el medicamento. Si tiene preguntas sobre cómo usar este medicamento, hable con el médico o farmacéutico.
- Asegúrese de saber dónde aplicar la inyección. Hable con el médico si no está seguro de dónde debe aplicar la inyección.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- No utilizar si la solución cambia de color.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

Pulverizador nasal:

- No tome este medicamento por vía oral. Solo para la nariz. No lo acerque a la boca ni a los ojos (puede quemar).
- Tome este medicamento lo antes posible luego de haberse iniciado el ataque.
- Siéntese antes de usarlo.

- Suénese la nariz antes de usar.

Polvo nasal:

- Solo para nariz.
- Tome este medicamento lo antes posible luego de haberse iniciado el ataque.
- Use el dispositivo nasal justo después de sacarlo de la bolsa de aluminio.
- Utilice únicamente el dispositivo que viene con el medicamento. No utilice otros dispositivos.
- Asegúrese de saber cómo utilizar este medicamento. Lea las instrucciones que vienen con este medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Este medicamento se toma según sea necesario. No lo tome con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja de la luz.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Inyección:

- Guarde el medicamento en el envase que le hayan proporcionado.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro,

eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-03-05

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Sumatriptan - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center