

Atezolizumab

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Tecentriq

Nombres comerciales: Canadá

Tecentriq

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar el cáncer.
- Este medicamento se puede tomar con otros medicamentos para tratar la afección médica del niño. Si su hijo también toma otros medicamentos, hable con el médico acerca de los riesgos y efectos secundarios que se pueden presentar.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún

componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento y durante 5 meses después de la última dosis.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de

su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.

- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Se han presentado casos de presión arterial alta con este medicamento. Controle la presión arterial de su hijo según le haya indicado el médico.
- Se han presentado casos de niveles altos de azúcar en la sangre con este medicamento. Esto incluye diabetes nueva o que empeora.
- Controle la glucemia de su hijo según las indicaciones del médico.
- Si su hijo tiene malestar estomacal, diarrea, vómitos o disminución del apetito, consulte con el médico. Puede haber maneras de disminuir estos efectos secundarios.
- Se pueden desarrollar problemas de salud graves en algunos órganos al tomar este medicamento. Estos pueden producirse en el intestino, los pulmones, el hígado, la glándula tiroides, la glándula pituitaria, la glándula suprarrenal, el páncreas, los riñones u otras partes del cuerpo. También pueden ocurrir problemas

nerviosos o musculares, o reacciones cutáneas graves. En algunos casos, estos problemas han sido mortales. Estos problemas pueden producirse en cualquier momento durante o incluso después de suspender el tratamiento. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

- Es posible que el niño tenga mayor riesgo de presentar infecciones. Haga que el niño se lave las manos con frecuencia. Evite las multitudes y a personas con infecciones, resfriados o gripe.
- Si su hijo ha recibido un trasplante de órgano u otro tipo de trasplante, como el de córnea, hable con el médico. Tendrá que estar alerta a síntomas de rechazo de un órgano o injerto de córnea.
- Consulte al médico si su hijo se está por someter a un trasplante de células madre con células madre de otra persona (allogénico). Algunos problemas con este tipo de trasplantes de células madre se han manifestado en personas que han recibido este medicamento. Estos problemas pueden ser muy graves y pueden llevar a la muerte.
- Este medicamento puede causar problemas de fertilidad. Esto puede afectar la capacidad de tener hijos. Consulte con el médico.
- Se podrá necesitar una prueba de embarazo para

demostrar que la niña NO está embarazada antes de comenzar con la administración de este medicamento.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo.
- Si su hija puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras tome este medicamento y durante 5 meses después de la última dosis. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para

respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Los signos de una reacción cutánea muy grave (síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica) como enrojecimiento, hinchazón, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos o heridas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.
- Síntomas de problemas pulmonares o para respirar como la falta de aire u otro problema respiratorio, tos o fiebre.
- Síntomas de un problema en el páncreas (pancreatitis) como dolor estomacal muy fuerte, dolor de espalda muy fuerte o malestar estomacal muy grave o vómitos.
- Signos de problemas en el sistema nervioso como falta de equilibrio; cambios de humor o comportamiento; confusión; somnolencia; fiebre; problemas de memoria; debilidad muscular grave; entumecimiento u hormigueo en los brazos o piernas; convulsiones; rigidez en el cuello o molestias en la vista de su hijo provocadas por luces brillantes.
- Signos de problemas del corazón como dolor de

pecho, latidos cardíacos anormales, rápidos o lentos, o falta de aire, mucho aumento de peso o hinchazón en brazos o piernas.

- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Signos de problemas electrolíticos como cambios de humor; confusión; dolor muscular, calambres o espasmos; debilidad; temblores; cambios en el equilibrio; latidos cardíacos anormales; convulsiones; pérdida del apetito; o malestar estomacal severo o vómitos.
- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Signos de problemas de tiroides, hipófisis o glándulas suprarrenales, como cambios en el estado de ánimo o

el comportamiento, cambios en el peso o el gusto, estreñimiento, voz más grave, mareos, desmayos, sensación de frío, sensación de mucho cansancio, pérdida de cabello, dolor de cabeza intenso o de larga duración, cambios en el interés sexual, problemas oculares, latidos rápidos del corazón, más sudoración, respiración rápida o profunda, aliento dulce, cambios en el olor de la orina o el sudor, u orinar con más frecuencia.

- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Dolor muscular intenso o duradero, sensibilidad o debilidad (con o sin fiebre).
- Informe al médico de inmediato si su hijo presenta dolor en el pecho, fiebre, confusión, debilidad en un lado del cuerpo, dificultades para hablar o respirar, cambios en el equilibrio, caída de un lado de la cara,

visión borrosa, dolor estomacal o de espalda grave, o tos con sangre.

- Se han producido problemas de la vista con este medicamento. Es posible que algunos tipos de problemas de los ojos deban tratarse de inmediato para reducir el riesgo de pérdida de la vista a largo plazo. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo presenta cambios en la vista, dolor ocular o irritación ocular grave.
- Con este medicamento se ha producido un problema del sistema inmunitario denominado linfocitosis hemofagocítica primaria (HLH). En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Llame al médico de inmediato si su hijo siente confusión, no está alerta o tiene fiebre; o si tiene glándulas inflamadas, sarpullido, convulsiones, cambios en el equilibrio o problemas para caminar que son nuevos o empeoran.
- Algunas personas experimentaron efectos secundarios durante la infusión. En algunos casos, podrían ser graves o potencialmente mortales. Infórmele al médico si su hijo si tiene dolor de espalda o cuello, escalofríos o temblores, mareos, desmayo, fiebre, sofocos, picazón, sarpullido, falta de aire, hinchazón del rostro o sibilancia.
- Es común presentar diarrea con este medicamento.

Sin embargo, este medicamento ha producido un problema intestinal grave (colitis) con diarrea. Esto puede causar desgarros u orificios en los intestinos y puede ser potencialmente mortal. Llame al médico de su hijo de inmediato si este presenta heces oscuras, pegajosas, con sangre o aspecto alquitranado, diarrea o dolor estomacal intenso.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Se siente cansado o débil.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Dolor de espalda, huesos, articulaciones, músculos o cuello.
- Dolor de cabeza.
- Irritación bucal o úlceras bucales.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían

ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.

- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-07-31

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Atezolizumab - Last updated on February 23, 2023

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center