

Cabotegravir

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Apretude; Vocabria

Nombres comerciales: Canadá

Apretude; Vocabria

Advertencia

En pacientes con VIH negativo que toman este medicamento para disminuir el riesgo de contraer VIH durante el acto sexual:

- Su hijo debe tener una prueba de VIH negativa antes de tomar este medicamento y antes de cada inyección. Informe al médico si piensa que su hijo que estuvo expuesto al VIH. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene signos similares a los de la gripe, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores articulares o musculares, vómitos, diarrea, dolor de garganta, sarpullido, sudoración nocturna o glándulas inflamadas. Llame al médico de inmediato si su hijo tuvo alguno de estos síntomas 1 mes antes de comenzar a tomar este medicamento.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la infección del VIH.
- Se utiliza en pacientes con VIH negativo para disminuir el riesgo de infectarse con VIH durante el acto sexual.
- Cuando se usa para tratar la infección de VIH, este

medicamento se debe tomar con otro llamado rilpivirina. Asegúrese de conocer las advertencias, beneficios y riesgos de la rilpivirina.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hija está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos: Carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, rifabutina, rifampina o rifapentina.
- Si el paciente pesa menos de 77 libras (35 kilogramos) o si es un niño menor de 12 años.
- Si su hija está embarazada, podría quedar embarazada o está amamantando a un bebé. Antes de darle este medicamento a su hija, tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para ella y el bebé. También tendrá que hablar sobre la mejor manera para que su hija prevenga la transmisión del VIH al bebé.

En pacientes con VIH negativo que toman este medicamento para disminuir el riesgo de contraer VIH durante el acto sexual:

- Si no se le realizó la prueba de VIH a su hijo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.

- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Si el niño tiene hepatitis, consulte al médico.

Para los pacientes que toman este medicamento para tratar la infección de VIH:

- Este medicamento no cura el VIH. Siga dándole este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si su hijo se siente bien. Asegúrese de que su hijo siga bajo el cuidado del médico y que acuda a sus citas con regularidad.
- Este medicamento ayuda a reducir la cantidad de VIH en la sangre. Reducir la cantidad de VIH en la sangre hasta que no se detecte en los análisis de sangre puede ayudar a disminuir el riesgo de transmitir el VIH a otras personas. También hay otras formas de ayudar a prevenir el contagio del VIH a otras personas. Esto incluye el uso de preservativos durante las relaciones sexuales y no compartir agujas ni otro material de inyección. Hable con el médico de su hijo u otro profesional de atención médica sobre la mejor manera de prevenir el contagio del VIH a otras personas.

En pacientes con VIH negativo que toman este medicamento para disminuir el riesgo de contraer VIH durante el acto sexual:

- Este medicamento no siempre previene el VIH. Debe utilizarse como parte de un programa que tenga otras medidas que ayuden a prevenir el VIH. Esto incluye hábitos sexuales más seguros, como el uso de condones, análisis para detectar enfermedades que se transmiten por vía sexual y conversaciones con las parejas (sexuales) que tienen VIH sobre su tratamiento. Consulte con el médico para recibir más información.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de depresión, pensamientos suicidas, altibajos emocionales, pensamiento anormal, ansiedad o falta de interés en la vida.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Irritación bucal o úlceras bucales.
- Se siente muy cansado o débil.
- Irritación en los ojos.

Para los pacientes que toman este medicamento para tratar la infección de VIH:

- Pueden ocurrir cambios en el sistema inmunitario de

su hijo cuando comienza a tomar medicamentos para tratar el VIH. Si su hijo tiene una infección que usted desconocía, es posible que se manifieste cuando tome este medicamento. Informe al médico de su hijo de inmediato si su hijo presenta algún signo nuevo después de comenzar a tomar este medicamento, incluso después de tomarlo durante varios meses. Esto incluye signos de infección como fiebre, dolor de garganta, debilidad, tos o falta de aliento.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Dolor de cabeza.
- Náuseas.
- Problemas para dormir.
- Sueños extraños o peculiares.

Para los pacientes que toman este medicamento

para tratar la infección de VIH:

- Ansiedad.

En pacientes con VIH negativo que toman este medicamento para disminuir el riesgo de contraer VIH durante el acto sexual:

- Dolor estomacal o diarrea.
- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Signos de un resfrío común.
- **Inyección:** Irritación donde se aplicó la inyección.
- Gases.
- Vómitos.
- Disminución del apetito.
- Dolor de espalda.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Para los pacientes que toman este medicamento para tratar la infección de VIH:

- Administre este medicamento al mismo tiempo que la rilpivirina con las comidas.
- No consuma una bebida con proteínas en lugar de una comida.
- Es importante que el niño no olvide u omita una dosis de este medicamento durante el tratamiento.
- Si su hijo toma productos con hierro, aluminio, calcio, magnesio o zinc (como algunos antiácidos o vitaminas), podría necesitar tomarlos en un momento distinto al que toma este medicamento. Consulte con el médico de su hijo o con el farmacéutico.

En pacientes con VIH negativo que toman este medicamento para disminuir el riesgo de contraer VIH durante el acto sexual:

- Es importante que el niño no olvide u omita una dosis de este medicamento durante el tratamiento.
- **Tabletas:** Administre este medicamento con o sin alimentos.

- Si su hijo toma productos con hierro, aluminio, calcio, magnesio o zinc (como algunos antiácidos o vitaminas), podría necesitar tomarlos en un momento distinto al que toma este medicamento. Consulte con el médico de su hijo o con el farmacéutico.
- **Inyección:** Este medicamento se administra en forma de inyección intramuscular.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

Tabletas:

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
- Si no está seguro qué hacer si omite darle una dosis a su hijo, llame al médico.

Inyección:

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.
- Si su hijo tiene que faltar a una cita prevista, hable con el médico sobre las opciones de tratamiento.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Tabletas:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja del calor.

Inyección:

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.

- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un

proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2023-12-20

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Cabotegravir - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center