

Fentanyl

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Actiq [DSC]; Duragesic-100 [DSC]; Duragesic-12 [DSC]; Duragesic-25 [DSC]; Duragesic-50 [DSC]; Duragesic-75 [DSC]; Fentora [DSC]; Lazanda [DSC]; Subsys [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

FentaNYL Citrate SDZ; Fentora; PMS-FentaNYL MTX [DSC]; SANDOZ FentaNYL; TEVA-FentaNYL

Advertencia

Todas las presentaciones:

- Se trata de un medicamento opiáceo. Los opiáceos pueden poner en riesgo de que su hijo padezca un trastorno por consumo de medicamentos. Pueden provocar sobredosis y la muerte. Se controlará a su hijo de forma rigurosa después de tomar este medicamento.
- Se pueden presentar problemas respiratorios graves al tomar este medicamento. El riesgo es más alto cuando su hijo empieza a tomar este medicamento o cada vez que se aumenta la dosis. Estos problemas respiratorios pueden ser mortales. Llame al médico de su hijo de inmediato si este tiene problemas para respirar, respiración lenta o respiración superficial.

- Incluso una dosis de este medicamento puede resultar mortal si la toma otra persona o si se toma por accidente, especialmente en el caso de los niños. Si otra persona toma este medicamento o si se toma por accidente, busque ayuda médica de inmediato.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Se han producido efectos secundarios graves cuando se combinan medicamentos opioides con benzodicepinas, alcohol, marihuana, otras formas de cannabis o drogas callejeras. Esto incluye somnolencia severa, problemas respiratorios y muerte. Los medicamentos con benzodicepinas incluyen aquellos como alprazolam, diazepam y lorazepam. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Muchos medicamentos interactúan con este medicamento y pueden aumentar la probabilidad de aparición de efectos secundarios, como problemas respiratorios mortales. Hable con el médico y el farmacéutico para asegurarse de que sea seguro utilizar este medicamento junto con los otros medicamentos que toma.
- Obtenga ayuda médica de inmediato si su hijo no responde, no contesta o si reacciona de forma anormal, si tiene mucho sueño o mareos, se desmaya o si no despierta.

Si su hija está embarazada:

- Si su hija está embarazada o está buscando un embarazo, hable inmediatamente con el médico de su hija sobre los beneficios y riesgos de usar este medicamento durante el embarazo. El uso prolongado de este medicamento durante el embarazo puede causar abstinencia en el recién nacido. La abstinencia en el recién nacido puede poner en peligro la vida si no se trata.

Parche dérmico (Duragesic):

- Dígame al niño que evite usar fuentes de calor (como las lámparas solares, camas solares, almohadillas y mantas calentadoras,

lámparas calentadoras, saunas, tinas de agua caliente y camas de agua con calentador). Evite los baños prolongados y tomar sol. Es posible que la temperatura del niño se eleve y produzca un exceso en la liberación del medicamento al organismo.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para controlar el dolor.

Todos los productos excepto la inyección:

- Este medicamento no es para tratar el dolor leve ni el dolor que solamente dura poco tiempo (como dolores de cabeza, dolores de dientes o el dolor después de una cirugía).
- Este medicamento es solamente para aquellas personas que han estado tomando analgésicos (opioides) y están acostumbrados a sus efectos. Consulte con el médico.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: Afecciones pulmonares o de respiración como asma o dificultad para respirar, o apnea del sueño; niveles altos de dióxido de carbono en la sangre, u obstrucción o estrechamiento intestinal o estomacal.
- Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: enfermedad renal o enfermedad hepática.
- Si su hijo tomó ciertos medicamentos para la depresión u otro tipo de enfermedad en los últimos 14 días. Esto incluye isocarboxazida,

fenelzina, o tranilcipromina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.

- Si su hijo está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos: buprenorfina, butorfanol, linezolida, azul de metileno, nalbufina o pentazocina.

Todos los productos orales:

- Si su hijo/a presenta llagas en la boca.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Para reducir la probabilidad de que su hijo se sienta mareado o pierda la conciencia, haga que se levante lentamente si estuvo sentado o

recostado. Haga que su hijo tenga cuidado al subir y bajar escaleras.

- Si el niño ha estado tomando este medicamento durante un período largo o en dosis altas, es posible que no surta efecto y que deba tomar dosis más altas para lograr el mismo efecto. Esto se conoce como tolerancia. Llame al médico si este medicamento deja de surtir efecto. No administre más de lo que se le indicó.
- El uso a largo plazo o regular de medicamentos opioides como este medicamento puede llevar a la dependencia. Reducir la dosis o dejar de tomar este medicamento de repente puede causar un mayor riesgo de abstinencia u otros problemas graves. Consulte con el médico de su hijo antes de reducir la dosis o dejar de tomar este medicamento. Deberá seguir las instrucciones del médico. Consulte con el médico de su hijo si tiene más dolor, cambios de humor, pensamientos de suicidio o cualquier otro efecto adverso.
- No administre una dosis mayor de la indicada por el médico. No lo administre con mayor frecuencia o durante más tiempo del indicado. Si lo hace, podría aumentar el riesgo de padecer efectos secundarios muy graves.
- No administre este medicamento junto con otros medicamentos fuertes para aliviar el dolor o si el niño está utilizando un parche para aliviar el dolor. Consulte primero al médico del niño.
- Si el dolor de su hijo empeora, si este está más sensible al dolor o si presenta un dolor nuevo después de tomar este medicamento, llame al médico de su hijo de inmediato. No administre más de lo indicado.
- Si su hijo bebe jugo de toronja (pomelo) o si come toronja (pomelo) con frecuencia, consulte al médico del niño.
- Asegúrese de que su hijo no beba alcohol ni tome productos que contengan alcohol. Es posible que se presenten efectos perjudiciales y hasta mortales.
- Este medicamento puede aumentar las probabilidades de tener convulsiones en algunas personas, incluso en aquellas que ya han tenido convulsiones anteriormente. Hable con el médico para saber si su hijo

tiene mayores posibilidades de tener convulsiones durante la administración de este medicamento.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Hable con el médico de su hija si ella está amamantando a un bebé. Este medicamento pasa a la leche materna y podría dañar al bebé de su hija. Busque ayuda médica de inmediato si el bebé de su hija parece muy somnoliento, está menos activo o tiene problemas para respirar.

Pastilla:

- Cuide los dientes del niño. Visite regularmente al dentista.
- Si el niño tiene niveles elevados de azúcar en sangre (diabetes), consulte al médico. Algunos de estos productos tienen azúcar.

Parche dérmico (Duragesic):

- El parche puede contener metal conductivo. Quitelé el parche al niño antes de una resonancia magnética (MRI por sus siglas en inglés).

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Síntomas de hipoglucemia como vértigo, dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, sacudidas, ritmo cardíaco rápido, confusión, hambre o sudoración.
- Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
- Respiración ruidosa.
- Problemas respiratorios durante el sueño (apnea del sueño).
- Mareos o desmayos graves.
- Confusión.
- Estreñimiento severo o dolor estomacal. Estos pueden ser signos de un problema intestinal grave.
- Dolor de pecho.
- Latidos cardíacos rápidos o lentos.
- Convulsiones.
- Depresión.
- Dificultad para controlar los movimientos del cuerpo.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Cambio en la vista.
- Este medicamento puede provocar un problema grave, y a veces mortal, llamado síndrome de serotonina si se toma con determinados medicamentos. Llame al médico de su hijo niño de inmediato si tiene agitación, problemas de equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o rápidos, enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos o dolor de cabeza muy intenso.
- El uso de medicamentos analgésicos opioides como este medicamento puede conducir a un problema de las glándulas suprarrenales poco común, pero muy grave. Llame al médico de inmediato si su hijo se siente muy cansado o débil, si se desmaya o si tiene mareos intensos, mucho malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.

- El uso a largo plazo de medicamentos opioides puede reducir los niveles de hormonas sexuales. Consulte con el médico de su hijo si tiene un interés reducido en el sexo, problemas de fertilidad, ausencia de período menstrual o problemas de eyaculación.

Tableta intrabucal:

- Lesiones en la boca.
- Hinchazón en los pies o las manos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Boca seca.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Dolor de cabeza.
- Problemas para dormir.
- Siente frío.
- Sudoración excesiva.
- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.

Tableta intrabucal:

- Hormigueo en la boca.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Inyección:

- Este medicamento se administra por inyección.

Parche dérmico (Duragesic):

- Lávese las manos antes y después de usar.
- Toque el lado pegajoso del parche lo menos posible.
- El parche contiene una cantidad elevada de medicamento, incluso después de usarlo. Siga cuidadosamente las instrucciones sobre cómo manipular, almacenar y desechar este medicamento. Consulte con su médico.
- Primero quítese el parche viejo.
- Aplique el parche sobre la piel limpia, seca y sana en la zona superior de la espalda del niño. En los niños mayores también se puede usar el pecho, o bien la parte superior de la pierna o del brazo.
- Coloque el parche en un área nueva cada vez que lo cambie.
- Si el lugar donde se coloca el parche tiene pelo, mantenga el pelo lo más cerca posible de la piel. No se afeite el pelo.
- No coloque sobre piel en la que recientemente ha aplicado cremas, aceites, lociones u otros productos para la piel.
- No coloque el parche en la zona del cinturón, el bretel del sostén o en los

pliegues de piel.

- No es necesario que le coloque el parche al niño cerca de o en la zona del dolor para que este funcione.
- Después de colocarse el parche, el niño podrá bañarse, ducharse o nadar por períodos de tiempo cortos. Para ayudar a mantener el parche en su lugar, cúbralo con plástico y cinta adhesiva.
- Si el parche se desprende, reemplácelo por uno nuevo.
- Si tiene un problema con el parche que no se pega, puede poner cinta de primeros auxilios en los bordes del parche para mantenerlo en su lugar. Si el parche todavía no se pega, puede colocar una gasa transparente (como Bioclusive o Askina Derm) sobre el parche. Asegúrese de saber qué tipo de gasa transparente puede usar. **No** cubra el parche con otros vendajes o cinta.
- No corte ni divida los parches. No use parches que estén dañados.
- No permita que el área donde se colocó el parche tenga contacto con la piel de otra persona.
- Si usted u otra persona entra en contacto con el gel, lave la zona afectada con grandes cantidades de agua. No use jabón.
- Si el parche entra en contacto con la piel de otra persona, quíteselo inmediatamente. Lave la zona con agua y consiga asistencia médica para esa persona de inmediato. El ingreso de este medicamento en la piel de otra persona puede causar efectos secundarios graves e incluso la muerte.
- El uso indebido o el abuso de este medicamento colocándoselo en la boca o masticándolo, tragándolo, inyectándolo o inhalándolo puede provocar una sobredosis y la muerte.

Pastilla:

- Coloque la gragea en la boca de su hijo entre la mejilla y la encía inferior. Muévala de un lado a otro en la boca de su hijo usando el asa.
- El niño debe chupar la pastilla oral. Anime al niño a no masticar, romper

o triturarla. Recuérdele al niño que no la trague entera.

- Después de una dosis, tire el mango a la basura fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si quedara algo de medicamento en el mango, échele agua caliente antes de tirarlo para asegurarse de que el medicamento se disuelva.

Tableta intrabucal:

- Úsese inmediatamente después de abrir.
- Coloque la tableta en la boca por encima de un molar posterior, entre la parte superior de la mejilla y la encía, y deje que se disuelva. También puede colocarla debajo de la lengua y dejar que se disuelva.
- No divida ni corte la tableta.
- Asegúrese de que el niño no lo mastique ni lo triture.
- No permita que su hijo coma ni beba hasta que la tableta se haya disuelto por completo.
- Si el medicamento no se disolvió completamente luego de 30 minutos, su hijo puede tragar el resto con agua.
- Cambie el lado de la boca con cada dosis.

Pulverizador nasal:

- Solo para nariz.
- Prepare la bomba antes de utilizarla por primera vez rociando 4 veces en la bolsita incluida. Si no lo ha usado los últimos 5 días, vuelva a preparar el medicamento rociando 1 vez.
- Cierre uno de los orificios nasales.
- Coloque el aerosol $\frac{1}{2}$ pulgada dentro de la fosa nasal. Presione hacia abajo en el gatillo. Oirá un chasquido que le indica que se administró la dosis.
- Este inhalador tiene un contador de dosis para registrar las dosis restantes. Cuando el contador de dosis muestre un 8, rocíe el resto de

medicamento en la bolsa. No intente pulverizar más de 8 pulverizaciones de un frasco. Ponga la bolsa y el frasco vacío en el contenedor de almacenamiento y deséchelo.

- Luego de haber sostenido la bolsa, lave sus manos de inmediato.

Aerosol o pulverizador para debajo de la lengua (sublingual):

- Rocíe dentro de la boca, debajo de la lengua.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

Parche dérmico (Duragesic):

- Aplique el parche saltado lo antes posible luego de retirar el usado.
- No aplique doble dosis ni dosis adicionales.

Inyección:

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

Todas las demás presentaciones:

- Si el niño usa este medicamento con regularidad, dele la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
- Muchas veces este medicamento se administra según sea necesario. No lo administre a su hijo con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Inyección:

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de

almacenamiento.

Todas las demás presentaciones:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

Pulverizador nasal:

- Luego de cada uso, vuelva a colocar la botella en el contenedor de almacenamiento que viene con este medicamento.
- Proteja de la luz.
- Después de abierto, deseche la porción que no utilice luego de 60 días.

Parche dérmico (Duragesic):

- Luego de retirar un parche dérmico, asegúrese de doblarlo con los lados pegajosos unidos. Deseche los parches usados fuera del alcance de niños y mascotas.

Todas las presentaciones:

- Guarde este medicamento en un lugar seguro donde los niños no puedan verlo ni alcanzarlo, y donde otras personas no puedan alcanzarlo. Una caja o área cerrada puede ayudar a mantener este medicamento seguro. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.

- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Se puede usar un medicamento llamado naloxona para ayudar a tratar una sobredosis de este medicamento. Hable con su médico de su hijo o farmacéutico sobre cómo obtener o tomar naloxona. Si cree que ha habido una sobredosis, llame a un centro de toxicología o busque atención médica de inmediato, incluso si se ha utilizado naloxona. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical->

Última fecha de revisión

2024-01-17

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Fentanyl - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center