

Naloxone

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Kloxxado; LifEMS Naloxone [DSC]; Narcan; Narcan [OTC]; Rextovy; RiVive [OTC]; Zimhi

Nombres comerciales: Canadá

Narcan; S.O.S. Naloxone Hydrochloride; TEVA Naloxone

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para prevenir los efectos secundarios de ciertos medicamentos.
- Este medicamento se utiliza para tratar ciertas sobredosis.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo

toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Si su hijo tiene un trastorno por consumo de opioides y recibe este medicamento, es posible que presente signos de abstinencia de opioides. Algunos de estos signos son sudoración, temblores, fiebre, escalofríos, diarrea, malestar estomacal, vómitos, calambres estomacales, piel erizada, dolores corporales, ansiedad, sensación de irritabilidad, bostezos o latidos rápidos.
- En los bebés menores de 4 semanas de vida que han estado recibiendo medicamentos opioides en forma regular, la interrupción repentina del medicamento puede poner en riesgo la vida si no se trata de inmediato. Obtenga ayuda médica de inmediato si su hijo tiene convulsiones, llora más de lo normal o tiene más reflejos.
- Consulte al médico sobre qué formas de este medicamento son las más adecuadas para los niños.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.
- Si este medicamento se utiliza durante el embarazo, puede causar signos

de abstinencia en el nonato. El nonato deberá ser controlado por un médico una vez que se empieza a usar este medicamento.

Productos inyectables distintos a los autoinyectores y las jeringas precargadas:

- Han ocurrido efectos secundarios muy graves cuando se administró este medicamento después de una cirugía. Esto incluye presión arterial baja o alta, latidos anormales y ciertos problemas pulmonares o cardíacos. En ocasiones, estos efectos secundarios originaron problemas cerebrales, estado de coma o la muerte. Consulte al médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Dolor o presión en el pecho o latidos cardíaco acelerados o anormales.
- Falta de aire.
- Convulsiones.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Cambios de humor.

- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Pulverizador nasal:

- Dolor muscular.
- Espasmo muscular.
- Dolor de cabeza.
- Nariz seca.
- Goteo o congestión nasal.
- Hinchazón de la nariz.
- Estreñimiento.
- Dolor dental.
- Piel seca.
- Dolor de estómago.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Mareos.
- Se siente cansado o débil.
- Algunas personas pueden presentar signos como sudoración, temblores, malestar estomacal o sensación de enojo al despertar después de recibir este medicamento. Esto es normal.

Todos los productos inyectables:

- Náusea o vómito.
- Mareos.
- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Sofocos o bochornos.
- Acaloramiento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Aerosol nasal, inyección mediante autoinyector y jeringas precargadas :

- Si inyectará a su hijo, el médico de su hijo o la enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Asegúrese de conocer los signos de una sobredosis y cuándo administrar este medicamento. Si no está seguro, hable con el médico de su hijo.
- Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emergencia. Lea el prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.
- Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Asegúrese de que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo administrarlo en caso de ser necesario.
- Después de administrarse este medicamento, los síntomas de sobredosis

podrían desaparecer y regresar. Es importante recibir ayuda médica de inmediato después de administrarse este medicamento.

- Cada dispositivo tiene 1 sola dosis y no se puede volver a utilizar. Si necesita otra dosis, deberá usar un dispositivo nuevo.
- Si este medicamento caduca, adquiera más medicamentos antes de necesitar una nueva dosis.

Pulverizador nasal:

- Solo para nariz.
- Si se administra más de 1 dosis, cambie de orificio nasal en cada dosis.
- No retire este medicamento de la bolsa o blíster hasta que esté listo para usarlo. No prepare ni pruebe el aerosol antes de administrarlo.
- Si este medicamento se congela, algunas marcas pueden descongelarse a temperatura ambiente antes de usarse. Si ocurre una emergencia y este medicamento está congelado, no espere a que se descongele. Obtenga ayuda médica inmediatamente.

Jeringas precargadas y autoinyectores:

- Este medicamento se administra en forma de inyección en el músculo o en la capa de grasa de la piel.
- Inyecte directamente sobre la parte externa del muslo según fue indicado. Este medicamento puede administrarse a través de la ropa si es necesario. Inyecte y sostenga durante el tiempo que le indicaron.
- No utilice este medicamento si la solución cambia de color, está turbida o tiene partículas. Use una nueva.

Todos los demás productos inyectables:

- Este medicamento se administra por inyección intramuscular, intravenosa o subcutánea.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Obtenga ayuda médica inmediatamente.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Pulverizador nasal:

- Conserve en su envase original a temperatura ambiente.
- No almacenar a más de 40 °C (104 °F).
- No congelar.
- Proteja del calor y de la luz.

Jeringas precargadas y autoinyectores:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Proteja del calor.
- Guárdelo en el envase que le proporcionaron para protegerlo de la luz.

Todos los demás productos inyectables:

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al

médico de su hijo.

- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-06-03

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Naloxone - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center