

Odevixibat

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Bylvay; Bylvay (Pellets)

Nombres comerciales: Canadá

Bylvay; Bylvay (Pellets)

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se usa para tratar la picazón en personas con ciertos problemas de salud, como la colestasis intrahepática familiar progresiva (PFIC) o el síndrome de Alagille (ALGS).

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique

la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Quizá su hijo deba tomar ciertos suplementos como vitamina A, D, E y K mientras toma este medicamento. Asegúrese de respetar lo que el médico le ha indicado.
- La diarrea es común con este medicamento y puede ser intensa. Llame al médico para obtener instrucciones si su hijo tiene diarrea o calambres estomacales. Su hijo deberá tener cuidado de no deshidratarse. No intente tratar la diarrea sin consultar primero con el médico.
- Si el peso de su hijo cambia, consulte al médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda

médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Signos de agrandamiento del bazo, como dolor estomacal en la parte superior izquierda del estómago o dolor en el hombro.
- Síntomas de cálculos biliares como dolor repentino en el área abdominal superior derecha, el área del hombro derecho o entre los omóplatos, color amarillento en la piel o los ojos o fiebre con escalofríos.
- Llame al médico de inmediato si su hijo experimenta diarrea, signos de deshidratación como sequedad en la piel, boca u ojos; sed; latidos rápidos; mareos; respiración acelerada o confusión.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor estomacal o diarrea.
- Vómitos.
- Pérdida de peso.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos

secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento por la mañana.
- Administre este medicamento con una de las comidas.
- No administre colesevelam, colestipol o colestiramina 4 horas antes o después de tomar este medicamento.

Cápsulas:

- Asegúrese de que el niño trague este medicamento entero con un vaso de agua.
- Asegúrese de que el niño no lo mastique ni lo triture.
- Si su hijo no puede tragar este medicamento entero, puede abrir la cápsula y espolvorear el contenido en una pequeña cantidad de alimento blando como puré de manzana, avena, puré de plátano o zanahoria, pudín de chocolate o arroz con leche. Los alimentos blandos deben estar a temperatura ambiente o a una temperatura menor. También puede mezclarlo con un líquido como agua, leche materna o fórmula infantil. Mezcle suavemente. El niño debe tragar la mezcla inmediatamente. No lo almacene para usar más adelante. Haga que su hijo beba agua después de la dosis.

Gránulos orales:

- No la trague entera. No mastique ni triture.
- Abra la cubierta de la cápsula y espolvoree los gránulos en un máximo de

30 ml (2 cucharadas) de comida blanda, como compota de manzana, avena, puré de banana o zanahoria, chocolate o arroz con leche. Los alimentos blandos deben estar a temperatura ambiente o a una temperatura menor. Mezcle suavemente. El niño debe tragar la mezcla inmediatamente. No lo almacene para usar más adelante. Haga que su hijo beba agua después de la dosis.

- Si su hijo no es capaz de tragar alimentos blandos: los gránulos pueden mezclarse en líquido y administrarse con una jeringa por vía oral. No utilice un biberón ni un vaso para niños porque los gránulos no caben por la abertura.
- Abra la cubierta y espolvoree los gránulos en un vaso pequeño. Agregue 5 ml (1 cucharadita) de líquido como agua, leche materna o fórmula infantil. Si la dosis es más de una cubierta, repita el procedimiento. Deje que los gránulos se asienten en el líquido durante aproximadamente 5 minutos. Los gránulos no se disolverán.
- Después de 5 minutos, coloque la punta de una jeringa oral en el líquido. Suba la mezcla y vuelva a introducirla en el vaso. Haga esto 2 o 3 veces para ayudar a mezclar. Adminístrelo de inmediato. No lo almacene para usar más adelante.
- Introduzca la mezcla en la jeringa. Coloque la punta de la jeringa en la boca de su hijo y empuje suavemente la mezcla en la zona entre la lengua y la mejilla. No introduzca el chorro en la parte posterior de la garganta. Esto podría causar náuseas o asfixia.
- Administre la dosis con agua, leche materna, fórmula infantil u otro líquido.
- Si queda algo de la mezcla en el vaso, repita el procedimiento hasta que haya tomado toda la dosis. Compruebe la boca de su hijo para asegurarse de que haya tragado toda la dosis.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y

continúe con el horario habitual del niño.

- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender

y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-02-27

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Odevixibat - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center