

# Palovarotene

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Sohonos

### **Nombres comerciales: Canadá**

Sohonos

### **Advertencia**

- No administre este medicamento a su hija durante el embarazo. El uso durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento o la pérdida del bebé nonato.
- Si su hija está en edad fértil, se le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar a recibir este medicamento y mientras lo esté tomando para asegurarse de que NO esté embarazada.
- Si es posible que su hija quede embarazada, ella

tendrá que utilizar métodos anticonceptivos desde 1 mes antes de comenzar a tomar este medicamento, durante el tratamiento y hasta 1 mes después de su última dosis. Si su hija solo toma este medicamento cuando es necesario para las crisis, ella tendrá que usar métodos anticonceptivos todo el tiempo. Asegúrese de saber qué tipo de método anticonceptivo necesita utilizar su hija y cuándo debe utilizarlo. Si no está seguro, consulte con el médico.

- Si su hija queda embarazada mientras consume este medicamento o en el plazo de 1 mes después de la última dosis, consulte al médico de inmediato.
- Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en algunos casos. Es posible que necesiten controles de crecimiento periódicos. Consulte al médico.

## **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Se utiliza para disminuir el crecimiento del hueso donde normalmente no crece en personas con fibrodisplasia osificante progresiva (FOP).

## **¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi**

## **hijo tome este medicamento?**

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el paciente es un niño. Este medicamento puede no ser apto para utilizar en niños de todas las edades.
- Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: enfermedad renal o enfermedad hepática.
- Si el niño usa otro medicamento como este. Si no está seguro, consulte con el médico de su hijo o con el farmacéutico.
- Si su hijo toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas) que no deba tomarse junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que se utilizan para tratar el VIH, infecciones, convulsiones y otros. Hay muchos medicamentos que no se deben tomar con este.

## **Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:**

- Si la niña puede quedar embarazada y no usa ningún método anticonceptivo.

## **Si su hija está amamantando a un bebé:**

- Asegúrese de que la niña no amamante un bebé mientras tome este medicamento y durante 1 mes luego de suspenderlo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Es posible que tenga una visión nocturna reducida.

Puede ser repentino. Pueden mejorar después de que su hijo deje de tomar el medicamento pero a veces no desaparecen. El niño debe tener cuidado al realizar actividades que requieran de una visión clara.

- Solicite que a su hijo o hija le realicen análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico de su hijo o hija. Esto incluye radiografías de la médula espinal.
- Asegúrese de que las cápsulas no entren en contacto con una mujer embarazada o capaz de quedar embarazada.
- Su hijo podría sufrir quemaduras solares más fácilmente. Evite el sol, las lámparas solares y las camas solares. Utilice filtro solar y vista a su hijo con ropa y anteojos que lo protejan del sol.
- Es frecuente tener ojos secos con este medicamento. Se pueden usar lágrimas artificiales, geles lubricantes para los ojos u otros productos para prevenir o tratar los ojos secos. Si tiene preguntas, hable con el médico o el farmacéutico.
- Evite dar al niño toronja o jugo de toronja (pomelo).
- Evite darle a su hijo otras fuentes de vitamina A.
- Asegúrese de que su hijo o hija no done sangre mientras toma este medicamento y durante 1 semana

luego de suspenderlo.

- Si el peso de su hijo cambia, consulte al médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de infección en la piel como supuración, piel caliente, hinchazón, enrojecimiento o dolor.
- Comportamiento nuevo o peor, o cambios de humor,

como depresión o pensamientos suicidas.

- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Cambios en la uñas.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Ojos secos.
- Boca seca.
- Náuseas.
- Dolor de espalda, muscular o articular.
- Dolor de cabeza.
- Dolor en los brazos o las piernas.
- Se siente cansado o débil.
- Es común presentar irritación cutánea con este medicamento. Esto incluye piel seca; labios secos, escamosos o agrietados; pérdida de cabello; picazón; enrojecimiento de la piel; sarpullido; descamación de la piel; y eccema. Esto también puede aumentar el

riesgo de infecciones cutáneas. Pregunte al médico o al farmacéutico cómo prevenir o tratar la irritación cutánea. Llame al médico si alguno de estos efectos es grave, le molesta a su hijo o no desaparece.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

### **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Administre este medicamento con alimentos.
- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día.
- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar o triturarla.
- Si es necesario, puede abrir la cápsula y espolvorear el contenido sobre 1 cucharadita (5 ml) de alimentos blandos, como puré de manzana, yogurt con bajo



contenido de grasa o avena caliente. No lo mezcle con toronja (pomelo) o jugos que contengan estas frutas. Su hijo o hija debe tragar la mezcla en el lapso de 1 hora, luego de la preparación. Proteja la mezcla de la luz solar; no la almacene para usarla más adelante.

- Use guantes para manipular este medicamento.
- Si abre la cápsula, utilice toallas de papel y un envase que pueda cerrarse (como una bolsa con cierre) para recoger y tirar los residuos.

### **¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?**

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si han pasado 6 o más horas de la dosis que olvidó darle al niño, sáltese la dosis y retome el horario habitual.
- No administre 2 dosis el mismo día.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Conserve en el envase de cartón exterior para protegerlo de la luz.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los

niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de

esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2023-08-31

## Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Palovarotene - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center

