

Pancrelipase

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Creon; Pancreaze; Pancrelipase (Lip-Prot-Amyl); Pertzye; Viokace; Zenpep

Nombres comerciales: Canadá

Cotazym; Creon; Pancrease MT; Ultrase; Ultrase MT; Viokase

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para ayudar a la digestión cuando el páncreas no funciona normalmente.

Tabletas:

- Si el niño ha estado recibiendo esta forma de este medicamento, consulte al médico la información sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- El niño debe continuar con el plan de alimentación según las recomendaciones del proveedor de salud médica.
- Si su niño es diabético, deberá vigilar cuidadosamente su nivel de azúcar en sangre.
- Esté atento a la aparición de ataques de gota.
- Este medicamento está fabricado a partir del tejido pancreático del cerdo. Existe un riesgo muy pequeño de contraer una enfermedad viral a partir de este medicamento. No se presentaron casos. Consulte al médico.
- Llame al médico de su hijo si todavía tiene signos de problemas de páncreas mientras toma este medicamento. Los signos pueden ser dolor de estómago, hinchazón, heces grasas o pérdida de peso. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y

beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de cálculos biliares como dolor repentino en el área abdominal superior derecha, el área del hombro derecho o entre los omóplatos, color amarillento en la piel o los ojos o fiebre con escalofríos.
- Dolor, entumecimiento, eritema o inflamación en las articulaciones.
- Irritación en la boca o la lengua.
- Glándula inflamada.
- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de presentar un problema intestinal poco frecuente llamado colonopatía fibrosante. Este problema intestinal puede ser grave y originar la necesidad de una cirugía. Llame al médico de inmediato si su hijo presenta dolor estomacal anormal o intenso, distensión abdominal, dificultad para defecar, malestar estomacal, vómitos o diarrea.
- Informe al médico de su hijo si tiene síntomas de altos o bajos niveles de azúcar en la sangre, tales como aliento con olor a fruta, respiración acelerada, ritmo cardíaco acelerado, confusión, somnolencia, debilidad, enrojecimiento de la piel, migrañas, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, temblores o sudor.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Mareos o dolor de cabeza.
- Estreñimiento, diarrea, dolor o malestar estomacal.
- Ardor de estómago.
- Gases.
- Tos.
- Dolor de garganta.
- Irritación anal.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Niños mayores a 12 meses:

- Administre este medicamento con las comidas y los tentempiés.
- Procure que su hijo lo trague entero. No permita que su hijo mastique, triture ni retenga este producto en la boca. Si su hijo lo hace, es posible que la boca se le irrite o cambie la manera en que actúa este

medicamento. Consulte al médico.

- Administre cada dosis con mucho líquido para asegurarse de que su hijo trague todo el contenido.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Puede esparcir el contenido de la cápsula en puré de manzana. Dígale al niño que la trague inmediatamente sin masticar y luego tome agua o jugo.
- Suministre la mezcla de inmediato. No almacene para utilizar más tarde.
- Algunos productos pueden mezclarse con alimentos, excepto con puré de manzana. Asegúrese de saber qué alimentos puede mezclar con este medicamento.
- Algunas marcas de este medicamento se pueden administrar por un determinado tipo de sonda de alimentación. No se deben administrar otras marcas por una sonda de administración. Consulte al farmacéutico para ver si puede administrar este medicamento por una sonda de alimentación.

Cápsulas (lactantes de hasta 12 meses de edad):

- Administre este medicamento cada vez que alimenta a su niño.
- Espolvoree el contenido dentro de la boca del lactante o mézclelo en una pequeña cantidad de puré de manzanas. Algunos productos también se pueden mezclar con otros alimentos que se encuentran en las comidas de bebés, como bananas o peras. Asegúrese de saber qué alimentos puede mezclar con este medicamento.
- No mezclar con fórmula de bebé ni leche materna.
- Suministre la mezcla de inmediato. No almacene para utilizar más tarde.
- Procure que su hijo tome leche maternizada para lactantes o leche materna inmediatamente después de su administración.
- Después de alimentar, fíjese en la boca si tragó el medicamento.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente con la tapa bien cerrada.
- Conserve en su envase original. No retire el cubo o paquete que absorbe la humedad.
- Proteja del calor.
- Si se almacena a una temperatura mayor a la ambiente, hable con el médico para ver si aún se puede usar este medicamento.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-05-14

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Pancrelipase - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center