

Scopolamine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Transderm Scop; Transderm-Scop [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

ACCEL-Hyoscine; Buscopan

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para aliviar el mareo por movimiento.
- Este medicamento se utiliza para tratar los espasmos gastrointestinales.
- Se utiliza para prevenir el malestar estomacal y el vómito causados por una intervención quirúrgica.
- Este medicamento se utiliza durante una cirugía.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.
- Este medicamento no está aprobado para su uso en niños. Los niños pueden tener un mayor riesgo de algunos efectos secundarios como problemas nerviosos, cambios mentales, problemas de visión y temperatura corporal elevada grave. Sin embargo, el médico puede decidir que los beneficios de tomar este medicamento superan los riesgos. Si a su hijo o hija se le ha administrado este medicamento, pídale al médico información sobre los beneficios y los riesgos. Consulte con su médico si tiene preguntas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: dolor de pecho, dilatación de colon, glaucoma, frecuencia cardíaca rápida, insuficiencia cardíaca (corazón débil), miastenia grave, obstrucción o estrechamiento intestinal o estomacal o dificultades para orinar.
- Si su hijo tiene presión arterial alta durante el embarazo (preeclampsia).

Tabletas:

- Si su hijo tiene problemas de salud hereditarios poco frecuentes como mala absorción de glucosa-galactosa, intolerancia a la fructosa o deficiencia de sacarasa-isomaltasa.
- Si su hijo es alérgico a la lactosa o tiene intolerancia a la lactosa, consulte con su médico.

Inyección (si se aplica en el músculo):

- Si su hijo está tomando un anticoagulante.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este

medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta o una visión clara hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Para reducir la probabilidad de que su hijo se sienta mareado o pierda la conciencia, haga que se levante lentamente si estuvo sentado o recostado. Haga que su hijo tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte con el médico antes de que su hijo consuma marihuana, otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- En caso de que su hijo practique deportes debajo del agua, consulte con el médico. Este medicamento puede hacer que su hijo se sienta perdido o confundido.
- Este medicamento puede aumentar las probabilidades de tener convulsiones en algunas personas, incluso en aquellas que ya han tenido convulsiones anteriormente. Hable con el médico para saber si su hijo tiene mayores posibilidades de tener convulsiones durante la administración de este medicamento.
- Las luces brillantes pueden provocar irritación. Dígale al niño que lleve lentes de sol.

- El niño debe tener cuidado con el clima cálido o mientras está activo. El niño debe beber mucho líquido para evitar la deshidratación.
- No administre este medicamento durante más tiempo del que le indicó el médico.
- Si el niño ha estado tomando este medicamento de manera habitual y deja de tomarlo en forma repentina, es posible que tenga síntomas de abstinencia. No deje de administrar este medicamento en forma repentina sin llamar al médico. Informe al médico si el niño tiene algún efecto grave.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

Parche cutáneo:

- El parche puede contener metal conductor. Quite el parche al niño antes de una resonancia magnética (MRI por sus siglas en inglés).
- Algunas personas pueden presentar determinados síntomas, al menos 24 horas después de retirarse el parche. Comuníquese con el médico de inmediato, si su hijo tiene vértigo, malestar estomacal o vómitos muy intensos, dolor de cabeza, problemas de equilibrio o para caminar, mareos muy intensos o desmayos, debilidad muscular o ritmo cardíaco lento.
- Con este medicamento se han producido temperaturas corporales elevadas y problemas de calor que pueden requerir tratamiento hospitalario. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. En la mayoría de los casos, la temperatura corporal elevada se produce en las 72 horas siguientes al primer uso de este medicamento. Evite el uso de fuentes de calor (como almohadillas eléctricas o mantas eléctricas). Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas

personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Mareos o desmayos graves.
- Latido cardíaco acelerado.
- Problemas para orinar.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Ver halos o colores brillantes alrededor de las luces.
- Ojos irritados.
- Pupilas agrandadas.
- Convulsiones.
- Dificultad para hablar.
- Cambios mentales, anímicos o del comportamiento que son nuevos o que empeoran.
- Confusión.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Problemas o pérdida de la memoria.
- Falta de aire.
- Sensación de calor.
- Fiebre.
- No suda durante las actividades físicas ni cuando el tiempo está caluroso.

- Consulte con el médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene un dolor estomacal intenso que perdura o empeora. Consulte con el médico de su hijo de inmediato si el dolor estomacal va acompañado de fiebre, malestar estomacal o vómitos, cambios en las evacuaciones, sensibilidad en el estómago, mareos intensos o desmayos o sangre en las heces.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Boca seca.
- Mareos o somnolencia.
- Diarrea.
- Náuseas.
- Dolor de garganta.
- Agitación.

Parche cutáneo:

- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con

atención.

Parche cutáneo:

- No administre este medicamento por la boca. Para uso cutáneo exclusivamente. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos del niño (puede arder).
- No corte ni divida los parches. No use parches que estén dañados.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Coloque el parche sobre la piel seca y sin pelo detrás de la oreja. Asegúrese de saber cuándo ponerse el parche. Si no está seguro, consulte con el médico.
- No aplique más de un parche a la vez.
- No toque el parche ni deje que su hijo lo toque mientras esté sobre su piel.
- Procure que su hijo tenga cuidado de no despegarse el parche cuando se baña o se ducha.
- Si el parche se desprende, reemplácelo por uno nuevo.
- Si se utiliza para mareos y necesita el medicamento durante más de 3 días, deseche el parche viejo. Reemplácelo por uno nuevo y colóquelo detrás de la otra oreja.
- Al sacarse el parche, lávese la zona con agua y jabón.
- Luego de retirar un parche dérmico, asegúrese de doblarlo con los lados pegajosos unidos. Deseche los parches usados fuera del alcance de niños y mascotas.

Tabletas:

- Asegúrese de que el niño trague este medicamento entero con un vaso de agua.

Inyección:

- Este medicamento se administra por inyección intramuscular, intravenosa o

subcutánea.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

Parche cutáneo:

- Aplique el parche saltado lo antes posible luego de retirar el usado.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No aplique más de un parche a la vez.
- Muchas veces este medicamento se utiliza según sea necesario. No lo utilice con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

Tabletas:

- Sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
- Muchas veces este medicamento se administra según sea necesario. No lo administre a su hijo con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

Inyección:

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Parche cutáneo:

- Conserve en posición vertical a temperatura ambiente.
- No doble ni enrolle la bolsa de aluminio.

Tabletas:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja del calor y de la luz.

Inyección:

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o

evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-06-27

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Scopolamine - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center