

Trametinib

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Mekinist

Nombres comerciales: Canadá

Mekinist

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar el cáncer.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento y durante 4 meses después de la última dosis.

Tabletas:

- Si su hijo no puede tragar las tabletas.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.

- En ocasiones, el dabrafenib se toma con el trametinib. Si su hijo está tomando dabrafenib con trametinib, asegúrese de conocer los efectos secundarios que se pueden presentar con cada medicamento. Cuando estos medicamentos se toman juntos, puede aumentar la posibilidad de determinados efectos secundarios. Estos efectos secundarios pueden ser graves y, en ocasiones, mortales. Esto incluye hemorragias; hemorragias cerebrales; coágulos de sangre; problemas en la vista; fiebre; problemas cardíacos (como insuficiencia cardíaca); niveles altos de azúcar en sangre; otros tipos de cáncer y reacciones cutáneas graves, como el síndrome de Stevens-Johnson. Consulte con el médico sobre la posibilidad de que surjan efectos secundarios con los medicamentos de su hijo.
- Se han presentado casos de presión arterial alta con este medicamento. Controle la presión arterial de su hijo según le haya indicado el médico.
- Solicite que le hagan análisis de sangre y exámenes de la vista a su hijo según se lo haya indicado el médico de su hijo.
- Haga controlar la piel de su hijo. Informe al médico de su hijo si presenta cambios en la piel como una verruga nueva, llagas o un bulto rojizo que sangra o

que no se cura, o un cambio en el color o el tamaño de un lunar.

- Se han producido coágulos de sangre con este medicamento. Los coágulos de sangre pueden poner en riesgo la vida. Informe al médico si su hijo o hija alguna vez ha tenido un coágulo de sangre. Consulte con el médico.
- Este medicamento puede causar problemas de fertilidad. Esto puede afectar la capacidad de tener hijos. Consulte con el médico.
- Si su hija está en edad fértil, deberá realizarse una prueba de embarazo antes de comenzar a recibir este medicamento, para asegurarse de que no esté embarazada.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Asegúrese de que su hija utilice algún método anticonceptivo mientras toma este medicamento y durante algún tiempo después de la última dosis. Pregúntele al médico por cuánto tiempo su hija debe usar métodos anticonceptivos. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Si la pareja sexual de su hijo está embarazada o podría quedar embarazada, debe usar un condón durante el sexo mientras su hijo toma este

medicamento y durante un tiempo después de la última dosis. Deben usar un condón incluso si su hijo se sometió a una vasectomía. Pregúntele al médico por cuánto tiempo su hijo necesita usar un condón. Si la pareja sexual de su hijo está embarazada o queda embarazada, llame al médico de inmediato.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de hemorragia como vomitar o toser con sangre, vómito que parece café molido, sangre en la

orina, heces negras, rojas o alquitranadas, sangrado de las encías, sangrado vaginal anormal, moretones sin causa o que se agrandan, o sangrado que no puede detener. En ocasiones, esto ocasionó la muerte.

- Síntomas de problemas pulmonares o para respirar como la falta de aire u otro problema respiratorio, tos o fiebre.
- Síntomas de problemas con los líquidos y electrolitos, como cambios de humor, confusión, dolor o debilidad en los músculos, latidos cardíacos anormales, mareos graves o desmayos, aumento de la sed, convulsiones, mucho cansancio o debilidad, disminución del apetito, incapacidad para orinar o cambio en la cantidad de orina producida, boca seca, ojos secos o malestar estomacal grave o vómitos.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Fiebre o escalofríos.

- Enrojecimiento o irritación en las palmas de las manos o las plantas de los pies.
- Llame al médico de inmediato si su hijo tiene signos de un coágulo de sangre como dolor o presión de pecho, tos con sangre, falta de aire, hinchazón, calor, entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo; o problemas para hablar o para tragar.
- Se han producido problemas oculares graves (incluido el desprendimiento de retina) con este medicamento. Estos problemas pueden provocar ceguera. Llame al médico o busque asistencia médica inmediatamente si su hijo o hija empieza a ver halos o colores brillantes alrededor de las luces, luces parpadeantes, moscas volantes, una sombra parecida a una cortina que atraviesa el ojo o experimenta una pérdida repentina de la visión.
- Este medicamento puede causar insuficiencia cardíaca. Deberá controlarse la función cardíaca de su hijo mientras tome este medicamento. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene síntomas de problemas del corazón, como tos o falta de aire que sean nuevos o que hayan empeorado, hinchazón de los tobillos o las piernas, latidos cardíacos anormales, aumento de peso de más de 2,25 kg (5 lb) en 24 horas,

mareos o desmayos.

- Con este medicamento, se han producido problemas intestinales (colitis) y orificios en los intestinos. En ocasiones, estos problemas han sido mortales. Llame al médico de inmediato si su hijo sufre diarrea, dolor estomacal, cólicos, fiebre o malestar estomacal grave.
- Con este medicamento se ha producido un problema del sistema inmunitario denominado linfocitosis hemofagocítica primaria (HLH). Llame al médico de inmediato si su hijo tiene fiebre, glándulas inflamadas, sarpullido, hinchazón en el área del estómago o dolor estomacal agudo.
- Es común presentar reacciones cutáneas cuando toma este medicamento. Sin embargo, también pueden producirse reacciones cutáneas graves. Esto incluye el síndrome de Stevens-Johnson (SJS). A veces, los órganos del cuerpo también pueden verse afectados. Estas reacciones pueden ser mortales. Busque ayuda médica de inmediato si su hijo presenta signos como piel roja, hinchada, con ampollas o descamación; ojos rojos o irritados; llagas en la boca, garganta, nariz, ojos, genitales o cualquier zona de la piel; fiebre; escalofríos; dolores corporales; falta de aire; o inflamación de los ganglios.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este

medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Acné.
- Piel seca.
- Cambios en la uñas.
- Náusea o vómito.
- Se siente cansado o débil.
- Irritación bucal o úlceras bucales.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones

del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día.
- Administre este medicamento en ayunas. Adminístrelo al menos 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.
- Si el peso de su hijo cambia, consulte al médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- No repita la dosis si su hijo o hija vomita luego de tomarla. Administre la siguiente dosis a su hijo o hija en el horario habitual.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

Tabletas:

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.

Solución:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el

medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

- Las personas que tienen ciertas sondas de alimentación pueden utilizar este medicamento. Este medicamento no debe utilizarse con algunas sondas de alimentación. Consulte con el médico. Utilice este medicamento según se le ha indicado. Enjuague la sonda de alimentación luego de administrar este medicamento.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si faltan menos de 12 horas para que su hijo tome la próxima dosis, saltee la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Tabletas:

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conserve las tabletas en la botella en la que vienen y no las pase a un recipiente para píldoras.
- Conserve en su envase original. No retire el cubo o

paquete que absorbe la humedad.

Solución:

- Consérvelo en el frasco original a temperatura ambiente. No lo congele.
- El farmacéutico debe mezclar este medicamento. Deseche este medicamento una vez transcurridos 35 días desde la mezcla. Asegúrese de saber cuál es el día adecuado para desechar este medicamento.

Todas las presentaciones:

- Proteja de la luz.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si

empeoran, llame al médico de su hijo.

- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del

consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-05-07

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Trametinib - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center