

Warfarin

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Jantoven

Nombres comerciales: Canadá

APO-Warfarin; TARO-Warfarin

Advertencia

- Este medicamento puede ocasionar hemorragias muy graves y, a veces, mortales. Consulte al médico.
- Comuníquese con el médico de inmediato si su hijo tiene síntomas de problemas de hemorragias, como hematomas; heces negras, alquitranadas o con sangre; encías sangrantes; sangre en la orina; tos con sangre; cortes que dejan de sangrar después de mucho tiempo; mareos; sensación de cansancio

o debilidad; hemorragias nasales; dolor o inflamación; vómitos con sangre o vómitos que parecen granos de café; o dolor de cabeza muy fuerte.

- Llame al médico inmediatamente si su hija presenta una hemorragia vaginal anormal o períodos (menstruaciones) muy abundantes.
- Necesitará controlar los análisis de sangre (Tiempo de protrombina [TP] y Relación normalizada internacional [INR]) de su hijo cuando consuma este medicamento. Esto es importante para asegurarse de que el medicamento funcione correctamente y para controlar el riesgo de su hijo de sufrir una hemorragia. Controle el TP/INR de su hijo tal y como lo indicó el médico de su hijo u otro proveedor de atención médica. Si no está seguro de cuándo necesita controlar el TP/INR de su hijo, comuníquese con el médico de su hijo o con otro proveedor de atención médica.
- La dieta de su hijo y algunos de los medicamentos pueden afectar su nivel de PT/INR. Consulte con el médico.
- Procure que su hijo evite realizar actividades o deportes que puedan aumentar el riesgo de sufrir una lesión.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se indica para tratar o prevenir los coágulos de sangre.
- se consumen para disminuir el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte en algunas personas.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene alguno de los siguientes problemas de salud: problemas de los vasos sanguíneos como aneurisma o aorta cortada; problemas de hemorragia; hemorragia en el cerebro; úlcera activa; hemorragia en el estómago, el intestino, el tracto urinario, los genitales o las vías respiratorias; problemas en la sangre; infección cardíaca; recuento bajo de plaquetas; pericarditis; cirugía reciente del ojo, cerebro o columna vertebral, o presión arterial demasiado alta.

- Si su hija está o podría estar embarazada.
- si el niño se someterá a una cirugía, consulte al médico.
- Informe al médico que su hijo usa este medicamento antes de que reciba anestesia intradural o un tratamiento espinal.
- Si al niño le han dado anestesia espinal, le han hecho cirugía mayor, o cualquier tipo de procedimiento espinal, hable con el proveedor de salud médica.
- Si sabe que su hijo no tomará el medicamento ni se controlará los análisis de sangre (TP/INR) según las indicaciones del médico.
- Si su hijo ha tenido un recuento bajo de plaquetas causado por la heparina.

Si su hija está embarazada:

- Si su hijo(a) presenta alguno de los siguientes problemas de salud: una enfermedad cardíaca específica conocida como preeclampsia, convulsiones durante el embarazo (eclampsia), inducción del parto o amenaza de aborto espontáneo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño. Es posible que se deba suspender la administración de este medicamento antes de determinados tipos de cirugía tal como se lo informó el médico. Si se suspende la administración de este medicamento, el médico le comunicará cuándo debe comenzar a administrar este medicamento nuevamente luego de la cirugía o procedimiento del niño.
- Tenga cuidado para evitar que su hijo se lastime, y evite que su hijo se caiga o tenga accidentes.
- Si su hijo se cae, se lastima o se golpea la cabeza,

comuníquese con su médico de inmediato. Consulte con él, incluso si su hijo se siente bien.

- Es posible que el niño sangre más fácilmente. Asegúrese de que su hijo tenga cuidado y evite lesionarse. Asegúrese de que su hijo tenga un cepillo de dientes suave.
- Si su hijo bebe jugo de toronja (pomelo) o si come toronja (pomelo) con frecuencia, consulte al médico del niño.
- Consulte al médico antes de darle productos que contengan aspirina, anticoagulantes, ajo, ginseng, ginkgo, ibuprofeno o productos similares, analgésicos o vitamina E.
- Ciertos alimentos pueden afectar los niveles de TP/INR de su hijo. Su hijo debe seguir el plan de alimentación que le indicó su médico u otro proveedor de atención médica.
- Consulte al médico sobre la cantidad de vitamina K en la dieta del niño. La vitamina K puede alterar el funcionamiento del medicamento. El niño no tiene que evitar todos los alimentos con vitamina K. Sin embargo, deberá mantener la misma cantidad de alimentos con vitamina K en la dieta diaria. Muchos alimentos contienen vitamina K. Esto incluye algunas

verduras de hoja verde, brócoli, hígado y algunos aceites vegetales. Pida al médico del niño la lista de los alimentos que contienen vitamina K. No haga grandes cambios en la dieta normal del niño sin consultarlo con el médico.

- Consulte al médico del niño antes de darle multivitamínicos (pediátricos), productos naturales y suplementos nutricionales. Podrían contener vitamina K.
- Mantenga consigo la tarjeta de seguridad del paciente en todo momento.
- Comuníquese con el médico de inmediato si su hijo tiene diarrea, fiebre o una infección.
- Si su hijo tiene asma o comienza a fumar, consulte al médico. Es posible que la cantidad de medicamento que toma su hijo sea modificada.
- Si su hijo es descendiente asiático, use este medicamento con cuidado. Podría provocarle más efectos secundarios.
- Con este medicamento se ha producido un problema de salud muy grave y en ocasiones mortal relacionado con la piel (calcifilaxis). Esto ha ocurrido en personas con y sin problemas renales muy graves. Consulte con el médico.

- Si su hija está en edad fértil, deberá realizarse una prueba de embarazo antes de comenzar a recibir este medicamento, para asegurarse de que no esté embarazada.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo.
- Si su hija puede quedar embarazada, haga que use un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y por 1 mes después de la última dosis. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave,

infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Dolor de pecho.
- Mareos o desmayos graves.
- Inflamación, calor, entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo.
- Dolor de cabeza intenso.
- Se siente muy cansado o débil.
- Inflamación.
- Cambio del color de la piel a negro o morado.
- Rara vez se produce muerte del tejido cutáneo. Esto puede causar la pérdida de la parte del cuerpo (amputación) y puede ser mortal. Llame a su médico

de inmediato si su hijo tiene dolor, o cambio de color o de temperatura en alguna parte del cuerpo.

- Si su hijo tiene problemas renales o ha tenido problemas renales en el pasado, consulte con el médico de su hijo. Pueden ocurrir problemas renales. Consulte con el médico de su hijo de inmediato si presenta signos de problemas renales como incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si su hijo padece efectos secundarios molestos o que no desaparecen.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de

salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Administre este medicamento según las indicaciones, aun si su hijo se siente bien. Esto es importante para que el medicamento funcione correctamente y para disminuir el riesgo de hemorragias.
- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día.
- Las personas embarazadas no deben tocar las pastillas trituradas o partidas. Si una persona embarazada toca una tableta triturada o rota, lave el área con agua y jabón de inmediato.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Administre la dosis que omitió cuanto antes, apenas se dé cuenta, el mismo día en que su hijo la omitió.
- Si es el día siguiente, omita la dosis faltante y continúe con el horario normal de su hijo.
- No administre más de 1 dosis de este medicamento dentro del mismo día.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su

hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento,

incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2023-07-14

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Warfarin - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center