

Guía para emergencias para pacientes ambulatorios que reciben anticuerpos biespecíficos

	Emergencias graves: Llame al 911	No emergencias: Llame al consultorio del médico	
Estado de alerta	<ul style="list-style-type: none"> • No despierta • De repente no puede mover los brazos o las piernas • Convulsiones (sacudidas incontrolables o rigidez del cuerpo) • Cambio repentino en la visión 	<ul style="list-style-type: none"> • Mareo o aturdimiento • Temblores o inestabilidad • Cambios del estado de ánimo • Cambios en el nivel de energía • Nueva confusión o más confusión de lo habitual 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas para encontrar palabras • Cambios en el nivel de alerta • Entumecimiento u hormigueo • No puede moverse • Dificultad con la deglución
La respiración	<ul style="list-style-type: none"> • No respira • Dificultad para respirar 	<ul style="list-style-type: none"> • Sibilancias (silbidos o chiflido al respirar) • Se queda sin aire (falta de aire) más fácilmente con muy poca actividad • Tos nueva o tos que no desaparece 	<ul style="list-style-type: none"> • Tos con sangre o mucosidad verde o amarilla (una sustancia gelatinosa) • Problemas para respirar al estar acostado
Fiebre/ escalofríos o infección		<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más, al tomar la temperatura por vía oral • Escalofríos y temblores (la temperatura puede ser normal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Síntomas de resfriado (secreción nasal, ojos llorosos, estornudos, tos) • Dolor o ardor al orinar