



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Pautas sobre la vacuna neumocócica para adultos con cáncer

En esta información se explica qué son las vacunas neumocócicas y cuándo debe recibirlas.

Las vacunas neumocócicas ayudan a prevenir la infección por bacterias neumocócicas. Estas bacterias pueden causar neumonía (infección pulmonar), meningitis (inflamación de las membranas que rodean el cerebro) y otras enfermedades graves que pueden provocar la muerte.

Existen 2 tipos de vacunas neumocócicas: Prevnar 13® y Pneumovax®23. Estas dos vacunas protegen contra varias cepas de la bacteria. Se administran como inyección (pinchazo) en el músculo.

Cronograma de vacunas

Si nunca recibió una vacuna neumocócica y tiene más de 18 años, recomendamos que reciba las siguientes vacunas:

- Prevnar 13 en su próxima cita con su proveedor de cuidados de la salud.
- Pneumovax 23 al menos 8 semanas después de Prevnar 13.

Si ya recibió Pneumovax 23, espere a que transcurra 1 año para darse Prevnar 13.

Hable con su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguna duda sobre las vacunas neumocócicas.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Pneumococcal Vaccination Guidelines for Adults with Cancer - Last updated on September 28, 2021

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center