



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Cuidado de la piel antes y después del tratamiento con láser de dióxido de carbono fraccionado

Esta información le ayudará a cuidar la piel antes y después de su tratamiento con láser de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) fraccionado.

Algunas personas necesitan muchos tratamientos para obtener los mejores resultados. Pregúntele a su proveedor de cuidados de la salud cuántos tratamientos necesitará usted.

## Cuidado de la piel antes del tratamiento con láser de CO<sub>2</sub>

Es importante que evite broncearse o exponerse al sol por mucho tiempo. Use un protector solar de amplio espectro (dióxido de titanio mineral u óxido de zinc) todos los días durante 4 semanas antes de su tratamiento. SPF30 o más.

No use medicamentos que causen sensibilidad al sol (como doxycycline o minocycline) durante al menos 3 días antes del tratamiento. Informe a su equipo de atención si toma antibióticos en la actualidad.

Si tiene antecedentes de herpes (como herpes labial oral o genital) o herpes en la zona de tratamiento, infórmesele a su proveedor de cuidados de la salud. Su proveedor de cuidados de la salud le podría pedir que comience a usar medicamentos antivirales (como valacyclovir o acyclovir) según se lo indique. Por lo general, esto sucede 2 días antes del tratamiento y continúa después de su tratamiento con láser durante los días indicados.

Informe a su equipo de atención si tiene cejas micropigmentadas o un tatuaje de delineador de labios.

También es importante comer y beber algo antes de su procedimiento para prevenir la deshidratación.

## **Cuidado de la piel después del tratamiento con láser de CO<sub>2</sub>**

Después del tratamiento con láser de CO<sub>2</sub>, normalmente la piel tarda de 1 a 2 semanas en sanar. La piel se volverá muy sensible durante este período. Siga estas pautas a continuación para que la piel cicatrice y para

prevenir infecciones.

Cuando complete el tratamiento con láser de CO<sub>2</sub>, su enfermero le dará una compresa de hielo para que cubra la zona tratada. Sostenga la compresa de hielo sobre la zona tratada durante 15 minutos. Esto le ayudará a reducir la hinchazón y a sentirse más cómodo.

Antes de que se vaya a su casa, su enfermero cubrirá la zona tratada con petroleum jelly (Vaseline<sup>®</sup>) o una crema antibacteriana como mupirocin (Bactroban<sup>®</sup>). También le cubrirán la zona tratada con curitas. Cambie el vendaje varias veces al día siguiendo las instrucciones que le demos.

## **En casa**

Puede ducharse de inmediato después del tratamiento. No tome baños hasta que la zona tratada se haya sanado.

## **Durante los 2 a 3 días después de su tratamiento:**

- Aplique una compresa de hielo envuelta en una toalla suave sobre la zona tratada. Sostenga la compresa de hielo sobre la zona tratada durante 15 a 20 minutos. Coloque la compresa de hielo en la zona tratada cada pocas horas, o de 1 a 5 veces al día. Después de los primeros 2 a 3 días, use la compresa de hielo cuando

la necesite.

**Durante \_\_\_\_\_ días después de su tratamiento:**

- Lave suavemente la zona tratada cambiando entre el lavado con vinagre blanco diluido
- y agua, y jabón líquido y agua. Por ejemplo, puede lavarse con vinagre y agua por la mañana, y con agua y jabón por la noche.
- Prepare una solución de vinagre mezclando 1 taza (8 onzas, 236,5 ml) de agua y 1 cucharada de vinagre blanco. Guarde la solución tapada en el refrigerador por hasta 5 días.
- No utilice agua subterránea (agua de pozo) ni agua de la llave para limpiar directamente su sitio tratado. Deberá comprar agua destilada para limpiar su sitio si vive en un lugar que solo tiene agua de pozo. Si se ducha con agua de pozo o subterránea, mantenga cubierto el sitio.
- No aplique ninguna pomada en la piel, incluidos los productos naturales o sin receta. Estos productos pueden detener el proceso de cicatrización. Solo aplique lo que su proveedor le diga.
- Mantenga la zona tratada cubierta con una curita (Band-Aid®). Cambie la curita 2 veces por día,

después de lavar la zona.

## **Durante 1 a 2 semanas después de su tratamiento:**

- No use saunas, piscinas, bañeras ni bañeras de hidromasaje (como un Jacuzzi®).
- No se afeite la zona tratada.

## **Sugerencias generales**

- No use maquillaje sobre la zona tratada hasta que esté completamente sana.
- Evite exponer la zona tratada al sol hasta que haya cicatrizado por completo. Si debe estar al sol, use protector solar mineral con un FPS de 30 por lo menos o use ropa o un sombrero que proteja la zona tratada.
- Si tiene antecedentes de herpes facial (herpes labial), debe tomar un medicamento antiviral antes de su tratamiento y durante este. Hable con su proveedor de cuidados de la salud que trata esta afección sobre los medicamentos que le puede recetar. Informe a su equipo de atención médica si le aparece alguna ampolla o herpes nuevos antes, durante y después de su tratamiento.

Por lo general, las personas tardan muchas semanas en

notar que la zona tratada está cicatrizando. Durante este período, la zona podría volverse de color rojo o negruzco, y es posible que se forme una costra. La costra debería desaparecer lentamente de 1 a 2 semanas después del tratamiento. No toque ni quite la costra. Se caerá solo.

## **Medicamentos después del tratamiento con láser de CO<sub>2</sub>**

Si tiene dolor o molestias, puede ayudarle tomar acetaminophen (Tylenol<sup>®</sup>) o un NSAID (como Motrin<sup>®</sup> o Advil<sup>®</sup>). Pregúntele a su proveedor de cuidados de la salud cuánto acetaminophen o NSAID debe tomar.

No tome acetaminophen si tiene problemas de hígado. No tome ningún NSAID si tiene problemas de riñón. Si siente dolor, pero tiene antecedentes de problemas de hígado o riñón, llame al consultorio de su proveedor de cuidados de la salud.

## **Llame a su proveedor de cuidados de la salud si tiene:**

- Temperatura de 101 °F (38.3 °C) o superior
- Escalofríos (temblores)
- Drenaje verde o amarillento en la zona tratada

- Mayor dolor o molestia
- Más enrojecimiento o inflamación alrededor de la zona tratada
- Sangrado que no se detiene después de aplicar presión
- Dolor o molestias que no desaparecen con analgésicos

Si tiene alguna pregunta, llame al consultorio de dermatología de MSK Basking Ridge al 908-542-3395.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Skin Care Before and After Fractionated Carbon Dioxide Laser Treatment - Last updated on June 28, 2024

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center