

Medicamentos que debe dejar de tomar antes de realizarse una prueba de alergia

Es importante que deje de tomar ciertos medicamentos antes de realizarse una prueba de alergia en MSK ya que estos pueden afectar los resultados de la prueba. Los medicamentos que no debe usar son: antihistamínicos orales, antihistamínicos nasales en aerosol, bloqueadores H2 y beta bloqueadores.

La lista a continuación incluye los productos más comunes, pero existen otros. Puede comunicarse con el consultorio de Alergia e Inmunología al 646-888-3814 en los siguientes casos:

- Si no está seguro de que su medicamento sea un antihistamínico, antihistamínico nasal en aerosol, bloqueador H2 o beta bloqueador.
- Si tiene dudas sobre dejar de tomar su medicamento.
- Si tiene otras dudas al respecto.

Si el hecho de dejar de tomar sus medicamentos hará que sus síntomas sean mucho peores, hable con su médico. Este podrá encontrar una manera diferente de realizar la prueba de alergia en caso de que no pueda dejar de tomar su medicamento.

5 días antes de su prueba de alergia: deje de tomar antihistamínicos orales (medicamentos que se tragan)

Los antihistamínicos orales más comunes que se venden con y sin receta son:

- Cetirizine (Zyrtec®)
- Chlorpheniramine maleate (Chlor-Trimeton®)
- Desloratadine (Clarinetx®)
- Diphenhydramine (Benadryl®)
- Fexofenadine (Allegra®)
- Hydroxyzine (Atarax®, Vistaril®)
- Levocetirizine (Xyzal®)
- Loratadine (Alavert®, Claritin®)
- Medicamentos para dormir (Advil® PM, Tylenol® PM, Unisom®, Vicks® NyQuil™)

3 días antes de su prueba de alergia: deje de usar antihistamínicos nasales en aerosol (los que se usan en la nariz)

Los antihistamínicos nasales en aerosol más comunes que se venden con y sin receta son:

- Azelastine HCL (Astelin®, Astepro®)
- Azelastine HCL y fluticasone propionate (Dymista®)
- Olopatadine HCL (Patanase®)

2 días antes de su prueba de alergia: deje de tomar bloqueadores H2 (medicamentos para controlar la acidez)

Los bloqueadores H2 más comunes que se venden sin receta son:

- Cimetidine (Tagamet®)
- Famotidine (Pepcid®)
- Ranitidine (Zantac®)

1 día antes de su prueba de alergia: deje de tomar beta bloqueadores (medicamentos para disminuir la presión arterial)

Los beta bloqueadores más comunes que se venden bajo receta son:

- Atenolol
- Bisoprolol
- Carvedilol
- Labetalol
- Metoprolol
- Propranolol

