



FORMATION DES PATIENTS ET DES SOIGNANTS

Régime à 2 gr de sel

Ce document vous explique ce que vous pouvez manger ou non dans le cadre d'un régime pauvre en sodium (2 gr de sel).

À propos du régime à 2 gr de sel

Le sodium est un minéral qui maintient l'équilibre des fluides dans le corps. On le retrouve dans la quasi-totalité des aliments. Dans le cadre de ce régime, vous allez limiter la quantité globale de sel ingérée dans votre alimentation et vos boissons à 2 grammes par jour, ou 2 000 milligrammes (mg). Une cuillère à café de sel contient 2 300 mg de sodium. Vous devrez donc chaque jour consommer une quantité inférieure.

Un tel régime permet d'améliorer les affections suivantes :

- Cardiopathies
- Hypertension artérielle
- Insuffisance rénale
- Insuffisance hépatique
- Prise de poids en raison d'une rétention d'eau (dans les jambes, par exemple)

Comprendre les allégations relatives au sodium

Le tableau suivant répertorie les allégations relatives au sodium que l'on retrouve sur les emballages alimentaires. Mieux comprendre ce que signifient ces allégations vous aidera à manger moins salé.

Nous avons également indiqué le nombre de portions de ces aliments que vous pouvez ingérer chaque jour. Cela s'appelle votre Apport journalier recommandé.

Allégation relative au sodium	Signification	Apport journalier recommandé
« Sans sodium »	Moins de 5 mg de sodium par portion	Illimité
« Sans sel »	Moins de 5 mg de sodium par portion	Illimité
« Faible teneur en sodium »	140 mg de sodium ou moins par portion	Pas plus de 4 portions par jour
« Très faible teneur en sodium »	35 mg de sodium ou moins par portion	Illimité

Autres allégations relatives au sodium

Voici d'autres allégations relatives au sodium que l'on peut retrouver sur les emballages des aliments et leur signification : Même si ces produits peuvent contenir moins de sel que leurs versions classiques, leur faible teneur en sodium n'est pas garantie.

« Sodium réduit »

- Le produit contient au moins 25 % de sel en moins par portion que sa version ordinaire.

« Allégé en sodium » ou « Allégé en sel »

- Le produit contient moitié moins de sodium par portion que sa version ordinaire.

« Sans sel », « Sans sel ajouté » et « Aucun sel ajouté »

- Ces produits ont été préparés sans sel alors que leur préparation en inclut habituellement (par exemple des bretzels sans sel par rapport aux bretzels traditionnels).

- Cela ne signifie pas qu'ils ne contiennent pas de sel ou de sodium.

Lire les étiquettes de valeurs nutritionnelles

La majeure partie du sel que vous ingérez provient des boissons et aliments préemballés. Il est donc important de bien lire les informations nutritionnelles mentionnées sur les étiquettes pour connaître la teneur en sodium. Près de 75 % du sodium que vous ingérez provient des aliments préemballés et des plats servis en restaurant. Bien que beaucoup puissent ne pas sembler salés, leur teneur en sodium peut être quand même élevée. Citons par exemple les céréales, le pain et la pâtisserie.

Sur l'étiquette nutritionnelle, la teneur en sodium est toujours indiquée en milligrammes pour 1 portion. Si vous mangez ou buvez 2 portions, vous doublez la quantité de sel. Il vous faudra donc multiplier par 2 la teneur en sel par portion.

Vérifier le pourcentage de la valeur quotidienne de sodium est également un excellent moyen de surveiller votre apport en sel. La valeur quotidienne de sodium est inférieure à 2 400 mg par jour. Si le pourcentage de la valeur quotidienne est d'au plus 5 %, l'aliment est considéré comme pauvre en sodium. Si le pourcentage de la valeur quotidienne est supérieur à 20 %, l'aliment est considéré comme riche en sodium. N'oubliez pas non plus de multiplier le pourcentage de la valeur quotidienne de sodium par le nombre de portions (aliments et boissons) que vous ingérez.

Sur les étiquettes nutritionnelles ci-dessous, la teneur en sodium est entourée en rouge (reportez-vous à la Figure 1). Le nombre de milligrammes de sodium et les pourcentages de la valeur quotidienne de sodium par portion y sont indiqués. Le bouillon de volaille ordinaire représente 37 % de votre apport journalier en sodium (890 mg), ce qui est élevé. La version allégée en sel est préférable puisqu'elle ne représente que 6 % (140 mg).

Regular chicken with noodles soup		Low-sodium chicken with noodles soup	
Nutrition Facts		Nutrition Facts	
1 serving per container		1 serving per container	
Serving size	8 oz	Serving size	10.75 oz
Amount per serving		Amount per serving	
Calories	60	Calories	160
% Daily Value*		% Daily Value*	
Total Fat 2g	3%	Total Fat 4.5g	7%
Saturated Fat 0.5g	3%	Saturated Fat 1.5g	8%
Trans Fat 0g		Trans Fat 0g	
Cholesterol 15mg	5%	Cholesterol 30mg	10%
Sodium 890mg	37%	Sodium 140mg	6%
Total Carbohydrate 8g	3%	Total Carbohydrate 17g	6%
Dietary Fiber 1g	4%	Dietary Fiber 2g	8%
Total Sugars 1g		Total Sugars 4g	
Protein 3g		Protein 12g	
Vitamin A	4%	Vitamin A	30%
Vitamin C	0%	Vitamin C	0%
Calcium	0%	Calcium	2%
Iron	2%	Iron	6%
<small>* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.</small>		<small>* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.</small>	

Figure 1. Teneur en sodium indiquée sur les étiquettes nutritionnelles

Conseils pour limiter la teneur en sodium

Manger à la maison

- Ne salez pas les aliments lorsque vous les préparez ou à table.
- Essayez d'ajouter de l'ail frais, des oignons, du jus de citron ou du vinaigre balsamique aux légumes et aux salades. Vos aliments seront alors plus savoureux sans que vous n'y ayez ajouté de sel.
- Faites mariner la viande, la volaille ou le poisson dans du vinaigre balsamique, du jus de citron, de l'ail, du gingembre ou d'autres épices.
- Rincez les aliments en conserve, tels que le thon, les haricots et les légumes, avant de les consommer. Cela permettra d'éliminer une partie du sodium.
- Si vous aimez le piment, assaisonnez vos plats avec une sauce pimentée ou piquante. N'utilisez qu'une faible quantité de sauce piquante car elle est riche en sodium. Vous pouvez aussi ajouter du piment en poudre sans

sel.

- Essayez des mélanges d'épices sans sel, comme les 17 assaisonnements sans sel de Mrs. Dash® and Lawry's®.
- Cuisinez davantage à la maison plutôt que d'aller dîner à l'extérieur. Vous maîtriserez ainsi bien mieux la teneur en sel dans votre alimentation.
- Servez-vous des recettes suivantes pour fabriquer votre propre mélange d'épices moulues :
 - **Surprise sans sel**
 - 2 cuillères à café d'ail en poudre
 - 1 cuillère à café de basilic séché
 - 1 cuillère à café d'origan séché
 - 1 cuillère à café de zeste de citron en poudre (ou de jus de citron déshydraté)
 - **Agréablement piquant**
 - 2 cuillères à café de thym séché
 - 1 cuillère à café de sauge séchée
 - 1 cuillère à café de romarin séché
 - 2 cuillères à café de marjolaine séchée
 - Placez les ingrédients de l'une ou l'autre recette dans un moulin et mixez bien. Stockez ensuite le mélange dans un pot en verre et ajoutez-lui une étiquette.

Conseils sur les achats

- Lisez les informations nutritionnelles sur les étiquettes des aliments et boissons.
 - Comparez les étiquettes et choisissez les produits contenant le moins de sodium possible par portion.

- Favorisez les aliments non transformés, par exemple les fruits et légumes frais, les céréales complètes (avoine, orge, quinoa et riz brun) et les légumineuses (haricots secs, pois et lentilles). Ces aliments sont naturellement pauvres en sodium.
- Les produits surgelés sans sauces contiennent généralement moins de sodium que ceux avec sauces. N'oubliez pas de vérifier la teneur en sodium indiquée sur les étiquettes nutritionnelles.
- Choisissez les légumes en conserve portant la mention « sans sel ajouté ».
- À moins que votre médecin ne les approuve, n'utilisez pas de succédanés de sel. Ils peuvent contenir du potassium, qui peut être nocif pour les personnes souffrant de certains problèmes médicaux, comme une insuffisance rénale.
- Limitez la quantité de lait, yogourt et crème glacée que vous ingérez à 3 portions (240 ml) par jour. Ces aliments sont modérément pauvres en sodium.
- N'oubliez pas de vérifier les étiquettes alimentaires des desserts. Certains sont très riches en sel.
- Achetez des en-cas non salés, tels que des bretzels, des noix ou des chips.

Manger au restaurant

Lorsque vous mangez au restaurant, vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire la teneur en sel de vos aliments.

- La plupart des plats préparés au restaurant sont riches en sel, en particulier les condiments comme les sauces, les vinaigrettes et les marinades.
 - Lorsque vous sortez dîner, commandez vos plats sans ces ajouts, ou demandez à ce qu'ils soient mis à part.
 - Assaisonnez vos salades d'huile et de vinaigre plutôt que de sauces préparées.
- Demandez à ce que vos plats soient assaisonnés sans sel ou avec des

ingrédients pauvres en sodium.

Les chaînes de restaurants implantées dans 20 villes ou plus sont tenues de fournir des informations nutritionnelles sur leurs menus, notamment le nombre de calories, la teneur totale en matières grasses, les calories provenant des lipides, et la quantité de sucre, protéine et sodium. Ces informations peuvent être mentionnées sur des affiches, des plateaux, des panneaux, des cartes, des dépliants ou des kiosques.

Exigez ces informations nutritionnelles lorsque vous mangez dans l'un de ces restaurants. Vous pouvez également rechercher ces informations sur Internet avant d'aller au restaurant. Vos choix seront ainsi plus sains.

Aliments riches en sodium

Vous trouverez ci-après une liste d'aliments riches en sodium. Limitez la consommation de ces aliments tout en suivant votre régime alimentaire. Lorsque vous lirez les étiquettes nutritionnelles, vous serez surpris de leur teneur en sel. La plupart de ces produits ont une version pauvre en sel, alors essayez plutôt de les utiliser.

Catégorie alimentaire	Aliments à forte teneur en sodium, à limiter ou éviter
Produits laitiers	<ul style="list-style-type: none">• Babeurre• Mélanges de cacao instantanés (ex. : Swiss Miss)• Fromages : américains, fromage bleu, feta, Provolone, suisses, Edam et cottage, sauf pour les versions pauvres en sodium.
Viandes et poissons	<ul style="list-style-type: none">• Viandes préparées, fumées, séchées, en conserve, surgelées et charcuteries• Produits de charcuterie, tels que le corned-beef, le salami, le jambon, la mortadelle, les saucisses de Francfort, les saucisses et saucissons, le bacon, le hachis de bœuf et la dinde rôtie ordinaire• Viandes kascher• Hareng, sardines, caviar, anchois, thon en conserve et saumon fumé• Entrées surgelées et plateaux TV
Féculeux et pains	<ul style="list-style-type: none">• Pains, petits pains et biscuits apéritifs, avec sel ajouté• Pain irlandais

	<ul style="list-style-type: none"> • Céréales prêtes à consommer, avec plus de 20 % de valeur quotidienne de sodium • Pizza • Chips et bretzels salés
Légumes et jus de légumes	<ul style="list-style-type: none"> • Légumes en conserve ou en bocal et jus de légumes • Cornichons • Olives • Choucroute • Jus de tomate • Sauce tomate ordinaire et purée de tomate • Légumes surgelés dans des sauces au beurre • Soupes en conserve et instantanées • Consommé ou bouillon
Condiments	<ul style="list-style-type: none"> • Sauces vinaigrettes en bouteille • Pâtes à tartiner, par exemple à l'oignon, à l'artichaut ou au fromage • Sauces • Jus et sauces en conserve • Sauces vinaigrettes en bouteille • Sauce soja, sauce Worcestershire et sauce Chili • Plus d'une cuillère à soupe de ketchup • Sel d'oignon, sel d'ail et autres assaisonnements contenant du sel • Sauce tartare • Vin de cuisson
Divers	<p>Vérifiez les étiquettes afin d'éviter les aliments préemballés contenant les ingrédients suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poudre à lever et bicarbonate de sodium • Agents conservateurs, tels que nitrate de sodium, phosphate de sodium et benzoate de sodium • Exhausteurs de goût, tels que le glutamate de sodium (MSG) • Édulcorants, tels que la saccharine de sodium • Certains comprimés antiacides (vérifiez la teneur en sodium sur l'étiquette)

Exemple de menu

Les repas proposés dans cet exemple de menu respectent la limite de 2 grammes de sodium.

Repas	Aliment ou boisson	Teneur en sodium (en mg)
Petit-déjeuner	120 ml de jus d'orange	0
	1 œuf dur	60
	2 tranches de pain grillé multi-graines	260
	1 cuillère à café de beurre doux	0
	1 cuillère à soupe de confiture ou de gelée	10
	240 ml de lait écrémé	120
	Café ou thé	5
Déjeuner	1 bol de soupe de pois cassés à faible teneur en sodium	50
	Sandwich à la dinde :	
	• 1 petit pain (10 cm)	310
	• 85 g de blanc de dinde à faible teneur en sodium	465
	• 1 cuillère à soupe de mayonnaise	80
	• 1 cuillère à café de moutarde	65
	• Laitue et tomate	5
	Fruit frais	0
	360 ml d'eau de Seltz nature ou aromatisée	15
Collation de l'après-midi	4 biscuits Graham	160
	2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète sans sel ajouté	10
Dîner	140 g de saumon fumé	90
	½ tasse de brocoli	20
	½ tasse de carottes	50
	½ tasse de riz brun	5
	240 ml de thé glacé	5
	½ tasse de yogourt glacé	65

Collation du soir	40 g de bretzels non salés	75
	Fruit frais	0
Teneur totale en sodium (en mg)		1 925

Coordonnées

Service alimentaire et de nutrition

212-639-7312

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Pour obtenir davantage de ressources, consultez le site www.mskcc.org/pe pour effectuer des recherches dans notre bibliothèque virtuelle.

2-Gram Sodium Diet - Last updated on January 23, 2021

Tous les droits sont détenus et réservés par le Memorial Sloan Kettering Cancer Center.