

אודות ניתוח בטני להסרת גידולים מסוג של תאים עגולים קטנים Desmoplastic Small Round MSK (DSRCTs, או Cell Tumors Kids)

מדריך זה יסייע לך לניתוח הבטני להסרת גידולי DSRCTs בבית החולים MSK Kids. המדריך גם יסייע לך להבין למה לצפות במהלך החלמה מהניתוח.

ניתן להשתמש במדריך זה כמקור מידע לעיון בימים שלפני הניתוח. יש להביא אותו איתך ביום הניתוח. את/ה וצוות הטיפול שלך תעשו שימוש במדריך זה בעת הלמידה על תהליך החלמה. במשאב זה, המילים "את/ה" ו"שלך" פירושן את/ה או ילך.

אודות הניתוח הבטני להסרת גידולי DSRCTs מהם גידולי DSRCTs?

גידולי DSRCTs הינם סוג של סרקומה. גידולי DSRCTs לעיתים קרובות מתחילהם בבטן. הם לעיתים קרובות נמצאים בצוואר (פריטונאום), שהוא הרקמה המצפה את חלל הבطن והאגן. הצוואר מכסה גם את רוב האיברים שבתוך הבطن.

גידולי DSRCTs יכולים גם להתרפשט לאיברים סמוכים, כגון שלפוחית השתן, המעי הגס והכבד.

הטיפול הסטנדרטי עבור גידולי DSRCTs הינו ניתוח, כימותרפיה וטיפול קרינתי. ב-MSK, רוב האנשים עוברים 3 ניתוחים נפרדים כדי לטפל בגידולי DSRCTs.

- הניתוח הראשון משמש כדי להסיר את הגידולים שבבטן.

- הניתוח השני משמש כדי להסיר את הגידולים הנמצאים באגן.
- יתכן שהמנתה יצור לך אילואסטומיה זמנית במהלך הניתוח. אילואסטומיה (פיום המעי הדק) הינה פתח בבטן שמןנו יכולות יציאות המעיים (צואה) ליצאת מן הגוף. פיום המעי הדק ימנע מיציאת המעיים לעבר דרך המעי הגס והחלחולת. פועלה זו תסייע לאיזור להחלים לאחר הניתוח.
- הניתוח השלישי משמש לביטול פיום המעי הדק, במידה שקיים. משמעות הדבר היא שיציאות המעיים יחזרו לעבר דרך המעי הגס והחלחולת כרגע.
- חלק מהאנשים עוברים כימותרפיה תוך-צפקית כחלק מהטיפולים בגידולי DSRCTs. המנתה גם ימוך צנתר תוך-צפקי בבטן במהלך הניתוח. צנתר תוך-צפקי הינו צינור דק וגמיש המוחדר מחוץ לגוף אל תוך חלל הצפק. זהו החלל שבין הרקמה המזכה את הבطن והאגן והרכמה המכסה את האיברים שבתוך הבطن.


מה יקרה במהלך הניתוח הבטני להסרת גידולי DSRCTs?

המנתה יבצע חתך כירוגני מתחת לעצם החזה עד ממש מעל עצם האגן (ראה איור 1). פועלה זו תסייע לו לראות בבירור את האזור בתוך הבطن, כך שיוכל להסיר בביטחון את הגידול.

המנתה וחברים אחרים בצוות המטפל ישוחחו איתך על מה לצפות לפני הניתוח, במהלך הניתוח ולאחריו. הם יפרטו אודות התכנית לניתוח ויענו על כל שאלה שעשויה להיות לך.

לפני הניתוח הבטני להסרת גידולי DSRCTs

סעיף זה יסייע לך להתכוון לניתוח. יש לקרוא אותו כאשר נקבע מועד הניתוח. ניתן לעיין בו כאשר מועד הניתוח הולך וקרב. הוא מכיל מידע חשוב לגבי הדברים שעליך לעשות כדי להתכוון.



איור 1. החתך

תור כדי קריית סעיף זה, מומלץ לרשום את השאלות

שברצונך לשאול את הרופא שלך.

הכנות לניתוח

את/ה והצאות המטפל תפעלו יחדיו כדי להתכוון לניתוח. עוזר/י לנו לשמר על בטיחותך על ידי כך שתספר/י לנו אם אחת מהצהרות הבאות חלות עליו, גם אם אין בוטוח/ה.

- אני נוטל/ת נוגדי קריישה (מדללי דם), כגון:
 - אספירין
 - הפרין
 - ואפארין - (Jantoven[®], Coumadin[®])
 - קלופידוגREL - (Plavix[®])
 - אנוקספרין - (Lovenox[®])
 - דביגרטן - (Pradaxa[®])
 - אפיקסבן - (Eliquis[®])
 - ריברוהקסבן - (Xarelto[®])
- אני נוטל/ת מעכבר 2 SGLT, כגון:
 - קנגלייפלוזין (Invokana[®])
 - דאפאגלייפלוזין (Farxiga[®])
 - אמפאגלייפלוזין (Jardiance[®])
 - ארטוגלייפלוזין (Steglatro[®])
- אני נוטל/ת תרופות מרשם, כולל מדבקות ומשחות. תרופה מרשם הינה תרופה שנייתן להציג אך ורק עם מרשם מספק שירות רפואי רפואי.
- אני נוטל/ת תרופות ללא מרשם, כולל מדבקות ומשחות. תרופה ללא מרשם הינה תרופה שנייתן לרכוש ללא מרשם.
- אני נוטל/ת תוספי תזונה כלשהם, כגון תוספי צמחים, ויטמינים, מינרלים או תרופות טבעיות או ביתיות.
- יש לי קווצב לב, דיפיברילטור מושタル אוטומטי (AICD) או מכשיר אחר הקשור לב.
- אני סובב/ת מeldom נשימה בשינה.
- היו לי בעיות עם הרדמה בעבר. הרדמה הינה תרופה שגורמת לך להיות רדום/ה במהלך

אלו הן דוגמאות לתרופות. ישנן גם אחרות.

יש תמיד לוודא שספק השירות הרפואי הרפואה שלך מודיעים לכל התרופות והתוספים שאתה/ה נוטל/ת.

ניתוח או הלייר.

- יש לי אלרגיה לתרופות מסוימות או לחומרים מסוימים, כולל לטקס.
- איני מוכן/ה לקבל עירוי דם.
- אני צורך/ת אלכוהול.
- אני מעשן/ת או משתמש/ת במכשיר עישון אלקטרוני, כגון עט אידוי או סיגריה אלקטרוני.
- אני משתמש/ת בסמים קלים, כגון מריחואנה.

אודות שתית אלכוהול

חשוב לשוחח עם הרופא המטפל על כמות האלכוהול שאתה/ה שותה. זה יסייע לנו לתכנן את הטיפול בר.

אם אתה/ה שותה אלכוהול באופן קבוע, אתה/ה עלול/ה להימצא בסיכון לסיבוכים במהלך הניתוח ולאחריו. סיבוכים אלה כוללים דימומיים, זיהומיים, בעיות לב ואשפוז ארכו יותר בבית החולים.

אם אתה/ה שותה אלכוהול באופן קבוע ומפסיכיק/ה בפתאומיות, זה יכול לגרום לפרכוסים, היזות ומוות. אם נדע שאתה/ה נמצא בעיות אלה, נוכל לרשום תרופות שיסייעו במניעתן.

להלן מספר דברים שנייתן לעשות לפני הניתוח כדי למנוע בעיות.

- לנוכח בכנות עם הרופא המטפל לגבי כמות האלכוהול שאתה/ה שותה.
- לנסה להפסיק לשות אלכוהול ברגע שהניתוח נקבע. יש להתקשר לרופא המטפל באופן מיידי אם:
 - יש לך כאב ראש.
 - אתה/ה מרגיש/ה בחילה (תחושה שאתה/ה עומד/ת להקיא).
 - אתה/ה מרגיש/ה יותר בחרדה (מתוח/ה או מודאג/ת) מהרגיל.
 - לא מצליח/ה לישון.

אלו הם סימנים מוקדמים של גמילה מאלכוהול ונitin לטפל בהם.

- ספרי לרופא שלך במידה ואין יכול/ה להפסיק לשותות.
- שאל/י את ספק השירות הרפואי הרפואי שלך שאלות לגבי שתיה וניתוח. כל המידע הרפואי שלך ישומר בפרטיות, תמיד.

אודות עישון

אם הנר מעשן/ת, ייתכן שייהו לך בעיות בನשימה בעת ניתוח. הפסקת עישון, אפילו למספר ימים לפני הניתוח, יכולה לשיעם.

הרופא יפנה אותך לתוכנית הטיפול שלנו - [Tobacco Treatment Program](#), במידה והנר מעשן/ת. ניתן גם ליצור קשר עם התוכנית בטלפון 0507-610-212.

אודות דום נשימה בשינה

דום נשימה בשינה הינה הפרעת נשימה שכיחה. אם את/ה סובל/ת מدام נשימה בשינה, משמעות הדבר היא שאתה/ה מפסיק/ה לנשום לפרקי זמן קצרים בזמן השינה. הסוג הנפוץ ביותר הוא דום נשימה חסימתית בשינה (sleep apnea OSA-obstructive). עם OSA, דרכי הנשימה נחסמות לחולטיים במהלך השינה.

OSA עשוי לגרום לביעות חמורות במהלך הניתוח ולאחריו. ספרי לנו אם יש לך או אם אתה/ה חושבת/ת שאולי יש לך, דום נשימה בשינה. אם אתה/ה משתמש/ת במכשיר נשימה, כגון מכשיר CPAP, אנא הבא/י אותו עימך ביום הניתוח.

שימוש בחשבון MyMSK

MyMSK (my.mskcc.org) הוא פורטל המטופלים שלך ב-MSK. באפשרות להשתמש ב- MyMSK כדי לשלוח ולקבל הודעות מהצוות הרפואי, לצפות בתוצאות הבדיקות שלך, לראות את התאריכים ואת שעות הפגישות שלך ועוד. באפשרות גם להזמין את המטפל שלך ליצור חשבון משלה כדי שיעכל לצפות במידע אודות הטיפול.

אם אין לך חשבון MyMSK, ניתן להירשם באתר my.mskcc.org. ניתן לקבל מספר זהה להרשמה על ידי התקשרות למספר 2593-227-646, או משרד הרופא שלך.

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לצפות ב-*How to Enroll in MyMSK: Memorial Sloan Kettering's-s Patient Portal* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/how-enroll-mymsk-patient-portal). ניתן גם ליצור קשר עם מוקד התמיכה של MyMSK על ידי שליחת דוא"ל לכתובת mymsk@mskcc.org, או התקשרות למספר 0593-248-800.

אודות רשימת המטלות שלך לביצוע ב-MyMSK לקרהת השחזור

לאחר הניתוח שלך, عليك להתמקדם בהחלמתך עד לשחרורך מבית החולים. אנו נשלח לך רשימת מטרות לביצוע לחשבון MyMSK שלך שיעזרו לך לעקוב אחר התקדמותך.

ניתן להשתמש ברשימה המטרות לביצוע ב-MyMSK לקרהת שחזורך כדי לצפות במטרות אותן

עליך להשלים לפני שחרורך מבית החולים. ניתן גם לעדכן את ההתקdemות שלך במהלך היום. העדכניםים שלך שלחו תרומות לצוות הניטוח לגבי התתקdemות שלך.

Frequently Asked Questions About the MyMSK Goals to Discharge Checklist (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-mymsk-goals-discharge-checklist).

מידע על החלה מושופרת לאחר ניתוח (Recovery After Surgery)

ERAS הינה תוכנית המיעדת לסייע לך להתאושש מהר יותר לאחר ניתוח. חשוב לבצע פעולות מסויימות לפני ניתוח ולאחריו, כחלק מתוכנית ERAS.

לפני ניתוח, יש לוודא את מוכנותך על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

- קריית מדrix זה. הוא יסייע לך לדעת למה לצפות לפני, במהלך ולאחר ניתוח. אם יש לך שאלות כלשהן, מומלץ לרשום אותן. ניתן לשאול את הרופא המתפל בביוקורך הבא או להתקשר למשרדו.
- ביצוע פעילות גופנית והקפדה על תזונה בריאה. הדבר יסייע לךין את גוףך לבראתה.

לאחר ניתוח, תוכל/י לסייע לעצמך להחלים מהר יותר על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

- להתחילה לנוע ולהסתובב מוקדם ככל האפשר. ככל שתקומו/י מהר יותר מהמייטה ותתחילה/י ליכת, כך תוכל/י לחזור לפעילויות הרגילוט שלך מהר יותר.
- לאמן את הריאות. עשה/י שימוש בספירומטר או בששבט כדי לסייע לריאות להתרחב במלואן. פעולה זו עשויה למנוע דלקת ריאות.
- ביצוע פעילות גופנית. הפיזיותרפיסט והמרפא בעיסוק לימדו אותך פעילות ותרגילים שיסייעו לך להתחזק.

בדיקות טרום-כירורגיות

לפני ניתוח, יקבע לך תור לביקורות טרום-כירורגיות (PST) או בדיקות טרום-כירורגיות לילדים (PPST). תתקבל תזכורת מהמשרד של ספק שירותי הרפואה שלך לגבי תאריך, שעה ומיקום הפגישה.

ניתן לאכול וליטול את התרופות הרגילוט שלך ביום הפגישה.

רצוי להביא את הפריטים הבאים לפגישה:

- כל התרופות שאתה/ת נוטל/ת, כולל תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, מדבקות ומשחות.
- תוצאות של בדיקות רפואיות שנעשו מחוץ ל-MSK בשנה שחלפה, במידה ויש לך-Calha. דוגמאות לכך כוללות תוצאות מבדיקה ארגומטריה, בדיקת אקו לב או בדיקת אולטרסאונד דופלי.
- השמות ומספריו הטלפון של הרופאים המתפללים שלך.

במהלך הפגישה תיפגש/י עם ספק רפואי מתקדם (APP). הוא עובד בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות הרפואי.

ספק הרפואי המתקדם שלך יסקור יחד איתך את ההיסטוריה הרפואית והניתוחית שלך. ייתכן שתעבור/י בדיקות שיסייעו לנו לתכנן את הטיפול בר, כגון:

- אלקטרוכרדיוגרפיה (EKG) לבדיקת קצב הלב.
- צילום חזה.
- בדיקות דם

ייתכן ששפק הרפואי המתקדם ימליץ לך לפגוש רופאים אחרים. הוא גם ישוחח איתך על התרופות שעלייך ליטול ב�отך הניתוח.

צוות כאב וטיפול פליאטיבי בילדים (PACT)

ה-PACT הוא צוות של רפואיים וספקי שירות מתקדמים. אנו תומכים בילדים ובמשפחות המתמודדים עם מחלות קשות ב-MSK Kids.

מטרת הטיפול הפלייטיבי היא לסייע לך ולמשפחהך במהלך הטיפול. צוות ה-PACT מסייע בהתמודדות עם אתגרים פיזיים, נפשיים, חברתיים ורוחניים. ביכולתנו לסייע לך קשר לגיל או לשלב המחלת. ביכולתנו לסייע בין אם אתה מטופל/ת בבית החולים או במרפאות החוץ. טיפול פלייטיבי הוא טיפול חשוב ומועיל לכלם.

צוות PACT מכבד את בחירותיך, ערכיך ואמונותיך. אנו מעודדים אותך ואת משפחתך לקחת חלק פעיל בקבלה החלטות לגבי המטרות ותכניות הטיפול שלך. אנו נפעיל יחד עם כל חברי הצוות הרפואי. מטרתנו היא לוודא שאתה ומשפחהך מקבלים את התמיכה הדרישה כדי לחיות בצורה הטובה ביותר.

רפואה אינטגרטיבית

שירותת הרפואה האינטגרטיבית של MSK מציע סיוע במקרים של אי נוחות ואפשרויות הרפיה וטיפול הרווחה הכללית. המומחים שלנו עברו הכשרה ומוסמכים בשיטות בריאות אינטגרטיביות כಗול:

- טיפול בעיסוי
- טיפול במוסיקה
- טיפול בראיקוד
- יוגה
- מדיטציה
- כושר גוף-נפש
- דיקור (אקוונזטורה)

תשוחח/י עם מומחה לרפואה אינטגרטיבית במהלך ביקור הרפואה האינטגרטיבית הראשון שלך. הוא יספר לך על שירותיו הרפואיים האינטגרטיביים הזמינים ב-MSK. הם גם ישוחחו איתך אודות:

- סוגים שונים של רפואה אינטגרטיבית וטכניקות הוליסטיות.
- כיצד לעשוט שימוש בסוגי טיפולים אלה במהלך שהותך.
- כיצד באפשרותם לסייע לך ולמשוחתך לפני הניתוח ובמהלך ההחלמה.

כיצד לסייע לגוף להתכוון לניתוח.

תוכל/י להתואושש ולהחלים מהר יותר ובקלות רבה יותר אם תסייע/י לגוף להיות בכושר הטוב ביותר האפשרי לקräאת הניתוח. סעיף זה כולל דוגמאות לדברים שבאפשרותך לעשות כדי להכין את גוףך לניתוח. הצעות המateful יסייע לך להחליט אולי פעילויות מתאימות לך ביותר.

תרגול/י נשימה ושיעול

תרגול/י נשימות عمוקות ושיעול לפני הניתוח. תוכל/י לבצע זאת על ידי:

- הליכה או משחך.
- ניפוח בועות או העפת טישו באוויר באמצעות נשיפה.
- שימוש בספירומטר ממירץ, במידה וניתן לך על ידי צוות הטיפול.

היה בתנועה והיה פעיל

נסה לבצע פעילות גופנית מדי יום. דוגמאות כוללות הליכה, שחיה או רכיבה על אופניים. MSK מציע גם שיעורים וירטואליים בחינוך לכל הגילאים, היכולים לסייע לך לשמר פעילות. בקשה/ מהרופא שלך מידע נוספת.

תרגול מדיטציה ומינידפולנס

טכניקות של נשימות מודעות, מדיטציה, יוגה, תרגול תנועה, עיסוי ודיקור עשויות לתמוך לך בעת ההכנות לניתוח.

הסרטונים של שירות הרפואה האינטגרטיבית שלנו עשויים לסייע לך למצוא את הפעילות הנכונות אותן ניתן להוסיף לשגרת היום שלך לפני הניתוח. בקרו/
ב-www.msk.org/integrative-medicine-multimedia כדי למצוא את הסרטונים. ניתן גם לבקר באתר www.mskcc.org/meditation כדי לצפות בסרטוני מדיטציה מודרכים שנוצרו על ידי מומחי הגוף-נפש שלנו.

יש להקפיד על תזונה בריאה

התזונאית הקלינית לילדים של Kids MSK תשוחח איתך אודוט ההכנה לניתוח. תוכל/י ללמידה כיצד לוודא שהתזונה שלך היא הטובה ביותר האפשרית.

במידה ואת/ה מקבל/ת טיפולים אחרים לטרטן לפני הניתוח, הם עשויים לגרום לשינויים בחוש הטעם, אובדן תיאבון ובעיות בעיכול. הדבר עשוי להקשות על אכילה מספקת של מזון, מה שעלול להוביל לירידה במשקל. תזונאית רפואיים החוץ של Kids MSK יכולה לעבוד איתך על תוכנית שעשויה לסייע בהתמודדות עם אתגרי אכילה.

רצוי גם לעקוב אחר הנהניות הכלליות הבאות:

- יש לאכול ארוחות קטנות, לעיתים קרובות. למשל, ניתן לאכול חצי ארוחה כל 3-2 שעות. יש לשאוף ל-8-6 ארוחות קטנות ביום במקום 3 ארוחות גדולות.
- יש לקבוע ולהקפיד על לוח זמני ארוחות. אין להמתין עם האכילה עד הגעה למספר של רב. מקום/י את לוח הזמנים במקום בו כולם יכולים לראות אותו.
- אחסני את המאכלים האהובים עליו בביתך במקום בו תוכל/י להגיע אליהם בקלות.
- קנה/י פריטי מזון שלמנה אחת אותם תוכל/י לאכול בקלות, כמו יוגורט לשתייה, מיצ' פרי או מקלות גבינה.
- בשל/י בכמויות נר שיוישאר אוכל.

- כדי לשמר מנה אחת בלבד במקורר ליום שאחרי, אך לא אחר מכן.
- הקפאי את שאר המנות. כאשר תהיה/י מוכן/ה להשתמש במנה, הפשרי אותה במקורר או בマイירוגל, לא על הדלק במטבח. אז חمم/י אותה עד שתיה חמה מאוד.
- כדאי לכלול מספר רב של קבוצות מזון וסוגי מזון בתזונתך, אלא אם כן הרופא או התזונאית מורים לך לא לעשות כן.
- לעיתים קל יותר לשות מלאכול. נסה/י לקבל יותר קלוריות מנוזלים מאשר מאוכל מוצק. לדוגמה, תוכל/י לשות מילקשייק או תוספי תזונה כגון *PediaSure®* או *Carnation Breakfast Essentials®*.
- הקפדי לשמר את חווית האוכל שלך מהנה ונטולת לחצים. נסה/י לאכול במסגרת משפחתית או לשלב ארוחות ביןיהם עם המשפחה.
- זכור/י שתזונתך חשובה לא פחות מהתרופות שאתה/ה נוטל/ת.

זכורי לבחור מזונות עתירי קלוריות וחלבון. שוחחי עם התזונאית של MSK Kids אודות מזונות שפועלים בצורה הטובה ביותר על סמך מה שאתה/ה אוהב/ת או על הרגלי האכילה שלך.

יש לשות משקה של פחמיות בלבד לפני הניתוח, או בבוקר הניתוח

אחד מהרופאים ייתן לך בקבוק של *Preop CF®* או *Ensure® Pre-Surgery* לשתייה בערב שלפני או בבוקר הניתוח. אלה הם משקאות פחמיתיים שהופכים את הצום (היעדר אכילה) שלפני הניתוח לפחות מלחץ עבור הגוף. פעולה זו תסייע לך להחלים ולהתאושש טוב יותר לאחר הניתוח.

היפגשי עם אנשי רפואיים אחרים, במידה הצורך.

לרשوت MSK עומדים אנשי מקצוע רבים ושונים שכולים לסייע לך לפני, במהלך ואחרי הטיפול בסרטן.

- עובדים סוציאליים יכולים לסייע לך בהתמודדות עם ההשפעות הרגשיות, החברתיות והפיזיות של אבחן מחלת הסרטן. העובדים הסוציאליים שלנו מעניקים ייעוץ וסייע מעשי. הם מסייעים למשפחות להתמודד עם מחלת ילדים, מיפורים את התקשרות עם המשפחה והחברים, משתפים מידע בנוגע למשמעות הקרה ומסייעים בהסתגלות לטיפול הרפואי.
- מומחים להפתחות הילד אנשי מקצוע מיומנים ומומחים בנושאי הגדילה וההפתחות האנושית. אם אתה/ה מודאג/ת או מרגיש/ה לחוץ מהרגיל שאתה/ה עומד/ת לעבור, הם יכולים לסייע לך לתוכנן דרכי כדי להרגיש נינוח/ה ורגוע/ה יותר. מומחי ההתפתחות הילד של MSK הינם בעלי מגוון רקעים ותחומי עניין, כולל חינוך, פסיכולוגיה, אומנות וטיפול באומנות.

יחד, היכישורים וההסמכות שלנו מציעים מגוון רחב של שירותים בתחום התפתחות הילד, המהנכים ומעצימים חולים ובני משפחותיהם במהלך המחלת.

- **יעצים ומטפלים** יכולים להיפגש איתך ועם בני משפחתך ולהעניק ייעוץ לביעות ורגשות הקשורות בהתמודדות עם סרטן. במרכז הייעוץ של MSK קיימות גם קבוצות תמייה אשר נפגשות על בסיס קבוע.

הרופא המטפל עשוי להציע לך הפניה לשירותים אלה. ניתן גם לבקש הפניה במידה והונו מעוניין/ת בכך.

שוחח/י עם העובד/ת הסוציאל/ית שלך לגבי דירות, במידה הצורך

Ronald McDonald House מספק דירות זמינה לחולי סרטן ילדים ובני משפחותיהם המגיעים מחוץ לעיר.

-SK קיימים גם הסדרים עם מספר מלונות ומערכות דירות מקומיים שעשויים לחתת מחיר נמוך במיוחד. העובדת הסוציאלית יכולה לשוחח איתך על האפשרויות העומדות בפניך ולסייע לך בבחירה הזמן. ניתן גם להתקשר למספר 212-8315-639 כדי לשוחח עם מתאם השירותים למטופלים ילדים.

מלאי/ טופס ייפוי כוח בריאותי, במידה הצורך.

אם אתה/ת בן/ת 18 ומעלה ועדין לא מילאת טופס ייפוי כוח בריאותי, אנו ממליצים למלא טופס זה כתה. אם כבר מילאת טופס שכזה, או אם קיבלת הנחיות רפואיות מקדימות, הבא/י אותם איתך לפגישתך הבאה.

טופס ייפוי כוח בריאותי הינו מסמך משפטי. הוא מזהה את האדם שידבר בשמר במידה ואין יכול/ה לתקשר בעצמך. אדם זה נקרא סוכן הבריאות שלך.

- לקבלת מידע אודוט ייפוי כוח בריאתיים והנחיות רפואיות מקדימות אחרות, ניתן לקרוא את *Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning)
- לקבלת מידע אודוט תפקיד סוכן בריאות, ניתן לקרוא את *How to Be a Health Care Agent* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent).

שוחח/י עם חבר בצוות הטיפול שלך אם יש לך שאלות לגבי מילוי טופס שירות בריאות.

יש להכין את כל הציוד להכנת המעיים, במידה הצורך

הרופא יאמר לך אם יש צורך בביצוע הכנת מעיים לפני הניתוח. אם כן, יהיה צורך בפריטי הציוד הבאים:

- אבקת פוליאתילן גליקול (MiraLAX®)
- נוזלים צלולים שאיןם במצב אדום, כתום או סגול

יש להקפיד על קבלת כמות מספקת של נוזלים צלולים בזמן הביצוע של תזונת נוזלים שkopfim. הרופא המתפלג גם ייתן לך מרשם לתרופות שלහן. יש לוודא שהן נמצאות ברשותך לפני תחילת הכנת המעיים.

- מטרוניידזול - Metronidazole
- ניאומיצין - Neomycin

שבعة ימים לפני הניתוח

עקב אחר הוראות הרופא בנוגע לנטילת אספירין.

אספירין עלול לגרום לדימום. אם אתה נוטל אספירין או תרופה המכילה אספירין, כדאי שיביאה עלייך לשנות את המינון או להפסיק ליטול אותו 7 ימים לפני הניתוח שלך. יש לעקוב אחר הוראות הרופא. אין להפסיק ליטול אספירין אלא אם כן ניתנה לך הוראה לעשות כן.

למידע נוסף, ניתן לקרוא את *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids).

הפסקה של נטילת ויטמין E, מולטי-ויטמינים, תרופות צמחיות ותוספי תזונה אחרים.

ויטמין E, מולטי-ויטמינים, תרופות צמחיות ותוספי תזונה אחרים עלולים לגרום לדימום. יש להפסיק ליטול אותם 7 ימים לפני הניתוח שלך. אם הרופא נותן לך הוראות אחרות, יש לפעול בהתאם להוראות אלה.

למידע נוסף, ניתן לקרוא את *Herbal Remedies and Cancer Treatment* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment).

בצעי סריקות הדמיה, במידה הצורך

תזדקק/י לביצוע סריקות הדמיה כדי לסייע לרופאים לתכנן את הניתוח. אם ביצעת אותן במקום אחר מלבד MSK, הרופא עשוי לבקש מכך להביא את הדיסק עם עותקים של סריקות ההדמיה לאחת מפניותותיך.

יוםים לפני הניתוח

הפסקה של נטילת תרופות אנטי-דלקתיות שאינן כוללות סטרואידים (NSAID)

תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (NSAID), כגון איבופרופן (Advil®, Motrin®) ונאפרוקסן (Aleve®), עלולות לגרום לדימום. יש להפסיק ליטול אותם יומיים לפני הניתוח שלך. אם הרופא נותן לך הוראות אחרות, יש לפעול בהתאם להוראות אלה.

למידע נוסף, ניתן לקרוא את *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids).

ביום שלפני הניתוח

יש להכין את תערובת MiraLAX, במידה ומתבצעת הכנת מעיים

יש לערבב את MiraLAX עם נוזל שקוף בבוקר היום שלפני הניתוח. הצעות המטפל יאמר לך באיזו כמות של אבקת MiraLAX ונוזל להשתמש.

יש לערבב את התערובת עד להמסה של אבקת MiraLAX. לאחר שאבקת ה-XL מתחממת, ניתן להכניס את התערובת למקרר.

יש להתחיל בתזונה של נזולים צלולים בצהריים (בשעה 12:00) במידה ומתבצעת הכנת מעיים

יש להתחיל בתזונה של נזולים צלולים בצהריים (בשעה 12:00) ביום שלפני הניתוח.

תזונה של נזולים צלולים כוללת רק נזולים שkopים שנייתן לראותם. דוגמאות ניתן לראות בטבלה בסעיף "תזונה של נזולים צלולים". יש להימנע מנזולים צלולים אדים, כתומים או סגולים

בזמן המעקב אחר תזונה של נזולים צלולים:

- אין לאכול מזון מוצק.
- שתה סוגים שונים של נוזלים צלולים. אל תשתה רק מים, קפה או תה. זה מסיע לוודא קבלת כמות מספקת של קלוריות ומהוות חלק חשוב בהכנת המעיים.
- אין לשות שום נוזל שלא ניתן לראות דרכו, כגון חלב או שוקטים.
- אין לשות נוזלים ללא סוכר, אלא אם כן יש לך סוכרת ובהוראת הרופא המטפל.

דיאטת נוזלים שקופים

אין לשות	בסדר לשות	
<ul style="list-style-type: none"> • כל מוצר המכיל חתיכות של מזון או תבלינים. 	<ul style="list-style-type: none"> • מרק צח, ציר מרק או קונסומה. 	מרקם
<ul style="list-style-type: none"> • כל דבר בעל צבע אדום, כתום או סגול. • דברי מתיקה. 	<ul style="list-style-type: none"> • ג'לטין, כגון O-Jell. • קרחונים בטעמים. • סוכריות למציצה, כגון Life Savers, lemon drops וסוכריות מנטה. 	דברי מתיקה
<ul style="list-style-type: none"> • כל משקה בעל צבע אדום, כתום או סגול • מיצים עם חתיכות פרי. • נקטרים. • סמודיס או שיקרים. • חלב, שמנת ומוצרי חלב אחרים. • משקאות חלב אגוזים, משקאות חלב חמחי, מלבוני קפה לא חלבניים ותחליפי חלב אחרים. • משקאות המכילים אלכוהול. 	<ul style="list-style-type: none"> • מיצי פירות צלולים, כגון לימוןדה, תפוחים, חומציות לבנות ומיצי ענבים לבנים. • משקאות מוגזים, כגון ג'ינגר אייל, Gatorade, Powerade ומי סודה. • משקאות ספורט, כגון Gatorade 1-Powerade. • קפה ללא חלב או שמנת. • תה ללא חלב או שמנת. • מים, כולל מים מוגזים ומים בטעמים. • משקאות צלולים להעשרה תזונתית, כגון Boost Breeze, Ensure Clear, Diabetishield-1, Pedialyte. 	משקאות

יש להתחיל לשות את תערובת MiraLAX בשעה 14:00, במידה שמתבצעת הכנת מעיים

יש להתחיל לשות את תערובת MiraLAX בשעה 14:00 ביום שלפני הניתזה.

יש לשות את תערובת XALAX במהלך 3 עד 4 השעות הבאות. יש לשאוף לסיום בין 17:00 ל-18:00.

ה- AXA MiralAX יגרום ליציאות תכופות. ברגע התחלת הנטילה יש לוודא הימצאות בקרבת חדר שירותים.

יציאות רבות עלולות לגרום את פי הטעעת (המקום בו הוצאה יוצאת מהגוף). כדי לסיע במניעת גירוי, ניתן למרווח ג'ל פטרוליום (Vaseline®) או משחת® A&D על העור סביב פי הטעעת לאחר כל יציאת מעיים.

שים/י לב לשעת הניתוח שלך

איש צוות משרד הקבלה יתקשר אליו לאחר השעה 14:00 ביום שלפני הניתוח. אם הניתוח מתוכנן ליום שני, הם יתקשרו אליו ביום שישי שקדם לו. אם לא תתקבל שיחת טלפון עד השעה 16:00, יש להתקשר למספר 212-639-7002.

איש הוצאות יאמר לך באיזו שעה עלייך הגיעו לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח. הם גם יזכירו לך לאן עלייך לפנות. ניתן לבקר באתר www.msk.org/locations לצורך קבלת מידע נוספת מיקומי MSK, כולל הוראות הגעה וחניה.

יש ליטול ניאומיצין ומטרוניידזול בשעות 18:00-22:00, במידה שמתבצעת הכנת מעיים

יש ליטול מנה אחת של ניאומיצין ומנה אחת של מטרוניידזול בשעה 18:00 בלילה שלפני הניתוח. יש ליטול מנה אחת נספחת של ניאומיצין ומנה אחת נספחת של מטרוניידזול בשעה 22:00 בלילה שלפני הניתוח.

יש להתקלח או לעשות אמבטייה עם תמייסת CHG 4% אנטיספטית לניקוי העור, כגון Hibiclens.

תמייסת CHG הוא חומר ניקוי לעור המכחס חידקים במשך 24 שעות לאחר השימוש. מקלחת עם תמייסה זו לפניו הניתוח תסייע להפחית את הסיכון לזרימות לאחר הניתוח. אנו ניתן לך בקבוק במהלך פגישת ה-PST. ניתן לרכוש את התמייסה גם ללא מרשם בבית המרפקת המקומי.

יש להתקלח או לעשות אמבטייה עם תמייסת CHG 4% בלילה שלפני הניתוח, או בבוקר הניתוח.

1. יש לחפות את השיער עם השמפו והמרכז הרגילים שלך. חשוב לשטוף את הראש הוטב.
2. יש לשטוף את הפנים ואיזור אברי המין (המפשעה) עם הסבון הרגיל שלך. שטוף את גוףך היטב במים חמימים.
3. פתח את בקבוק תמייסת 4% CHG. שפוך מעט לתוך כפות ידיך או על מטלית רחצה נקייה.

4. התרחק/י מזרם המים במקלחת. שפוח את תמייסת 4% CHG בעדינות על הגוף מהצווואר לרגליים. אין להניח את התמייסה על הפנים או באזור המפשעה.

5. יש לחזור אל מתחת לזרם המקלחת כדי לשטוף את תמייסת ה-CHG 4%. השתמש במים חמימים.

6. התנגד במכבת נקייה.

אין למרוח תחליב, קרם, דיודורנט, מייק אפ, טלק, בושם או אופטיר שייב לאחר המקלחת.

יש לשות את משקה הפחמיות שנtanן לך ספק שירותי הרפואה בלילה שלפני הניתוח, או בבוקר הניתוח. ספק שירותי הרפואה יאמר לך כמה לשות ומתי.

בבוקר הניתוח

ניתן להמשיך לשות נוזלים צלולים בין חצות (00:12 בלילה) ועד לשעתים לפני זמן הגעתך המתוכנן. כמות הנוזלים שניtanן לשות תלולה בגילך. יש לעקוב אחר הרהוראות להלן.

• גילאי 0 עד 3: ניתן לשות עד 4 אונקיות (120 מ"ל) של נוזלים צלולים בין חצות ועד לשעתים לפני מועד הגעתך המתוכנן.

• גילאי 4 עד 8: ניתן לשות עד 6 אונקיות (180 מ"ל) של נוזלים צלולים בין חצות ועד לשעתים לפני מועד הגעתך המתוכנן.

• גילאי 9 עד 13: ניתן לשות עד 8 אונקיות (240 מ"ל) של נוזלים צלולים בין חצות ועד לשעתים לפני מועד הגעתך המתוכנן.

• גילאי 13 ומעלה: ניתן לשות עד 12 אונקיות (360 מ"ל) של נוזלים צלולים בין חצות ועד לשעתים לפני מועד הגעתך המתוכנן.

אין לשות דבר החל משעתים לפני זמן הגעה המתוכנן. זה כולל מים ונוזלים צלולים אחרים.



עליך ליטול את תרופותיך על פי הנהניות.

חבר בצוות הטיפול ישוחח איתך על התרופות שעלייך ליטול בבוקר הניתוח. עליך ליטול אך ורוק

את התרופות האלה, עם לגימה של מים. בהתאם לתרופות שאתה נוטל בדרך כלל, אלה יכולות להיות כל תרופות הבוקר הרגילות שלך, חלון או אף אחת מהן.

פרטים חשובים לזכור

- אם אתה משתמש/ת בעדשות מגע, אנא הרכבי/י את משקפייך במקומן. הרכבה חדשה מגע בעת ניתוח עלולה לפגוע בעיניך.
- אין לענוד פריטים מתכתיים. יש להסיר את כל התכשיטים, כולל פירסינג בגוף. הציגו בו נעשה שימוש במהלך הניתוח עלול לגרום לכוכיות במידה והוא בא מגע עם מתכת.
- אין למrhoת תחליב, קרם, דיודורנט, מייק-אפ, טלך, בושם או אפטר שייב.
- דברי ערך יש להשאיר בבית.
- בעת המחוור חדש (וסת), השתמשי בתחבושת היגינית ולא בטמפון. אנו נספק לך תחתונים חד פעמיים ותחבושת היגינית, במידת הצורך.

מה להביא

- פריט אהוב אחד, כגון שמייכה או דובון.
- 1 או 2 מכשירים אלקטרוניים ניידים, כגון סמארטפון או טאבלט. יש לזכור להביא את המטען שלהם.
- כל התרופות שאתה/ת נוטל/ת, כולל תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, תוספי תזונה, מדבקות וקרמיים.
- ספironometer ממרייך, במידה וקיים ברשותך.
- טופס ייפוי כוח רפואי והנחיות מתקדמות אחרות, במידה ומילאת טפסים שכאהלה.
- מדיריך זה. ויעשה בו שימוש כדי ללמידה כיצד לטפל בעצמך לאחר הניתוח.

עם הגעתך לבית החולים

בהתגער לבית החולים השתמש במעלית B לקומה 6. בצע רישום וצ'ק אין בדלתך של חדר ההמתנה של PSC.

אנשים צוות רבים יבקשו ממש לומר ולאית את שמר ותאריך הלידה שלך. זאת למען בטחונך. ייתכן שמטופלים בעלי אותו שם או שם דומה יעברו ניתוח באותו יום.

כאשר יגיע הזמן להחליף בגדים לסתור הניתוח, יינתנו לך כותונת של בית החולים, חולון וגרביים

נגד החלקה.

פגישה עם האחות

תיערך פגישה עם האחות לפני הניתוח. יש לעדכן את האחות לגבי מינון התרופות שנטלת לאחר חצות (12:00 בלילה) והשעה שבה נטلت אותן. בעדכן יש לכלול תרופות מרשם ותרופות שלא מרשם, מדבקות וקרמיים.

אם יש לך צנתר מושתל או צנתר ורידוי מרכזי (CVC), האחות תיצור גישה אליהם. אם אין לך, הרופא המרדים ייחדר צינורית תוך ורידית (IV) באחד מווורידי החדר הניתוח. רופא מרדים הינו רופא בעל הכשרה מיוחדת לשימוש בחומרי הרדמה במהלך ניתוח.

פגישה עם הרופא המרדים

תיערך פגישה גם עם הרופא המרדים לפני הניתוח. הרופא:

- יבדוק יחד איתך את ההיסטוריה הרפואית שלך.
- ישאל האם היו לך בעיות עם הרדמה בעבר. זה כולל בחילה (תחושא שאת/ה עומדת/ת להקיא) או כאבים.
- ישוחח איתך אודות נוחות וביטחון בעת הניתוח.
- ישוחח איתך על סוג ההרדמה שאת/ה עומדת/ת לקבל.
- יענה על שאלותיך בנושא הרדמה.

יתכן שתוצאות הטיפול ישוחח איתך לגבי החדרת קטטר אפיידורי או צנתר עצבי היקפי (חסימה עצבית) במהלך ניתוח. אלה הן צינוריות דקיות וგמישות המעבירות תרופות החוסמות את תחושת הכאב מכבוצת עצבים. זו היא דרך אחרת לניהול הכאב לאחר ניתוח.

הכנה לניתוח

כאשר יגיע מועד ניתוח, תוכל/י להיכנס לחדר ניתוח בהלייכה או שאחד מאנשי הצוות יביא אותך לשם על מיטה. חבר בצוות חדר ניתוח יסייע לך לעبور למיטתה הניתוח.

ברגע שתרגישי בנוח, הרופא המרדים ייתן לך תרופה הרדמה ואז תירדם. תקבל/י גם נוזלים דרך הצנתר המושתל, CVC או העירוי (IV) במהלך ניתוח ולאחריו.

במהלך הניתוח

לאחר שתירדם/י לחЛОtin, צוות ניתוח ימקם צינורית נשימה דרך פיר לתוך קנה הנשימה. צינורית זו תסייע לך לנשום.

לאחר סיום הניתוח, צוות הניתוח יסגור את החתכים בעור. הסגירה תבוצע באמצעות סיכות או תפרים, או Dermabond® (דבק רפואי), או Steri-Strips™ (רכזות דקות של סרט דבוק רפואי). הוצאות המטפל יאמր לך למה לצפות.

לאחר הניתוח הבטני להסרת גידולי DSRCTs

סעיף זה יסייע לך לדעת למה לצפות לאחר הניתוח. תלמד כיצד להתאושש בביתה מהניתוח, הן בבית החולים והן בבית.

תור כדין קריית סעיף זה, מומלץ לרשום את השאלות שברצונך לשאול את הרופא שלך.

בחדר טיפול נמרץ ילדים (PICU), ביחידה לטיפול נמרץ (UCI) או בחדר התאוששות לאחר הרדמה (PACU)

כאשר תtauור/i לאחר הניתוח, תימצא/i בחדר טיפול נמרץ ילדים, ביחידה לטיפול נמרץ או בחדר התאוששות לאחר הרדמה. לפני הניתוח, הוצאות המטפל ישוחח איתך לגבי הדברים שלהם יש לצפות כאשר תtauור/i.

האותות תמשיך לעקב אחריו חום גוף, הדופק, לחץ הדם ורמות החמצן שלך. ייתכן שעדיין תהיה/i מחובר/ת לצינור נשימה. אם לא, תקבל/i חמצן דרך צינורית דקה המונחת מתחת לאף או מסיכה המכסה את האף והפה.

תרופות להפגת כאב

מיד לאחר הניתוח תקבל/i תרופות להפגת כאב עירורי, דרך הцентр המושタル, ה-CVC או צינורית העירוי. ייתכן שתתקבל/i תרופה להפנת כאב באמצעות קטטר אפיודורי או חסימה עצビית. דוחה/i אחד מהרופאים אם את/ה מרגיש/ה שאין הקלה בכאב.

תוכל/i לשולט בתרופות להפגת כאב על ידי שימוש בכפתור הנקרה מכשיר טיפול בכאב בשליטת המטפל (PCA). לקבלת מידע נוסף, ניתן לקרוא את (PCA) *Patient-Controlled Analgesia* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/patient-controlled-analgesia-pca).

צינוריות ונקייזים

יוחדרו לך אחד או יותר מהצינוריות והנקיזים הבאים לאחר הניתוח. הוצאות המטפל יאמր לך למה לצפות.

- עד 2 נקייזים בטניים. אלה הן צינוריות גמישות היוצאות מהחדר הניתוחי ומוצמדות לשקית ניקוז. הן מנקייזות נזולים מהבטן.

- **צינור אפי-קיבתי (NG)**. זהו צינור גמיש העובר דרך האף לתוך הקיבה. הוא ינקז אוויר ונוזלים מתוך הקיבה.
- **צינורית נשימה**. זהה צינורית גמישה העוברת דרך הפה לתוך קנה הנשימה. צינורית זו תסייע לך לנשומם.
- **צינורית עורקית**. זהה צינורית דקה וgamisha המוחדרת אל תוך אחד מהמעורקים (כלי דם). צינורית זו משמשת למעקב אחר לחץ הדם.
- **קטר (צנתר) לניקוז שתן**. זהה צינורית דקה וgamisha המוחדרת דרך השופכה לתוך שלפוחית השתן. הקטר יעביר את השתן משלפוחית השתן לתוך שקיית ניקוז. זה יסייע לצוות הטיפול שלך לעקוב אחר כמות השתן שאת/ה מייצר/ת.

הרופאים והצוות יטפלו בצלינוריות ובניקוז בזמן שהותך בבית החולים. הצוות המתפלל יעקוב אחר כמות הנוזלים המתנקזים מנקוז הבطن. ברגע שהכמות תהיה נמוכה מספיק, הם יסירו את הנקוז.

למרבית האנשים לא נשאים צינורות או נזקים בשלב בו הם מוכנים לעזוב את בית החולים. אם עדין תהיה מחובר לצינוריות או לנזקים בעת עזיבתך, הרופאים ילמדו אותך כיצד לטפל בהם בית. הם גם יודאו שקיים ברשותך כל הציוד הנדרש.

פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק

אנשים מסוימים זוקרים לעזרה בתנועה, בהיליכה, בביצוע הפעולות הרגילות שלהם, או בטיפול בעצמם לאחר ניתוח. אם יש לך צורך בסיווע צזה, יתכן שיבקרו אותך פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, או שניהם.

- **הפיזיותרפיסט** יוכל לשיעך לך לנوع ולתפקיד טוב יותר לאחר ניתוח. הוא יסייע לך להחזיר את הכוח, האיזון והקואורדינציה להם את/ה זוקק/ה בכך לבצע פעולות כגון זחילה, הליכה, טיפוס במדרגות, משחק או פעילות ספורט.
- **המרפא בעיסוק** יכול לשיעך לך בשיפור מיומנויות להן את/ה זוקק/ה בכך לבצע פעולות יומיומיות חשובות. הם יסייעו לך במידה ותתקשה/i בביצוע ממשימות טיפול עצמי (כגון להתלבש ולצחצח שינויים), פעילות משחק או CISIORS (כישורי הדרושים בבית הספר או לעבודה).

הפיזיותרפיסט והמרפא בעיסוק ישוחחו איתך אודוט התדיירות של ביצוע פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק או שניהם. למידע נוסף, ניתן לקרוא את *Staying Active Before and After Surgery for Pediatric Patients* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/staying-active-peds).

מעבר לחדרן בבית החולים

הרבית האנשים שוהים בחדר טיפול נמרץ ילדים, ביחוד לטיפול נמרץ או בחדר התואשות לאחר הרדמה למשך 2-1 ימים. תשאה/i שם עד ש:

- צינור הנשימה והעירוי שלך יוסרו, במידה והיו כאלה.
- תהאה/i מסוגל/ת לקום מהמיטה ולהסתובב.
- תהאה/i מסוגל/ת לבצע תרגילי נשימה, כגון שימוש בספירומטר ממירץ או בשבشبת.
- הסימנים החיוניים שלך נמצאים בטוחה המקובל.

ברגע שתהאה/i מוכן/ה, איש צוות ייקח אותך לחדרן בבית החולים.

בחדרן בבית החולים

משך זמן השהייה בבית החולים לאחר הניתזה תלוי בקצב התואשות ובהתקנות הטיפול שלך. הוצאות המטפל יאמר לך למה לצפות.

בעת שהותך בבית החולים, צוות הטיפול שלך ילמד אותך כיצד לטפל בעצמך בעת ההחלמה מהניתזה בעבר. קרוב לוודאי שתיפגשי עם עובדת סוציאלית, מומחה לחיי הילד, דיאטנית תזונאית קלינית וחברים אחרים בצוות הטיפול. חברי הצוות יעבדו זה עם זה ואיתך כדי לסייע לך בהחלמה.

תוכל/i גם לסייע לעצמך להחלים מהר יותר על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

- **להתחיל לנوع ולהסתובב מוקדם ככל האפשר. ככל שתקומו/i מהר יותר מהמיטה ותתיחיל/i ללבכת, כך תוכל/i לחזור לפעילויות הרגילים שלך מהר יותר.**
- **לאמן את הריאות. עשה/i שימוש בספירומטר או בשבشبת כדי לסייע לריאותך להתרחיב במלאן. פעולה זו עשויה למנוע דלקת ריאות.**
- **ביצוע פעילות גופנית. הפיזיותרפיסט והמרפא בעיסוק לימדו אותך פעילות ותרגילים שיסייעו לך להתחזק.**

ניתן לשימוש ברשימה המטרות לביצוע ב-MyMSK לקרהת שחרורך כדי לעקוב אחר ההתקדמות שלך בזמן ההחלמה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לקרוא את *Frequently Asked Questions About the MyMSK Goals to Discharge Checklist* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-mymsk-goals-discharge-checklist)

ניהול הכאב

ייתכן ותסבולי/י מכבים לאחר הניתוח. ספקי שירות הרפואה שלך ייבנו עבורך תוכנית לניהול
כابיך שתוכל/י להרגיש בnoch ככל האפשר.

- תקבל/י תרופות אופיוואידיות להפגת כאב (הנקראות גם תרופות נרקבוטיות) למשך זמן קצר לטיפול בכאבים הנגרמים כתוצאה מהניתוח. תקבל/י את המינון הנמוך ביותר וטיפול/י אותן במשך הזמן הקצר ביותר הנדרש.
 - תקבל/י גם מספר סוגי אחרים של תרופות להפגת כאב בצדיו לוודא שאותה מרגיש/her בנוח, וכן תוכל/י ליטול פחות מהתרופות האופיוואידיות.
 - יתכן שתקבל/י תרופה להפגת כאב באמצעות הקטטר האפיזורלי או החסימה העצבית.

צוות הכאב והטיפול הפסיכיאטרי בילדים (במידה שתת/ה מתחת לגיל 18) או צוות ההרדמה (במידה שתת/ה מעל לגיל 18) והרופא המרידים ישוחחו איתך אודות תכנית ניהול הכאב ויענו על שאלותיך.

ספקי רפואי הרופואה שלך יקבעו אותך מדי יום. הם ישאלו לגבי הכאב שלך ויודאו שהכאב נמצא תחת שליטה כל הניתן. אם יש לך כאבים ספרי עלייך לאחד מרופאים. חשוב שהכאבים יהיו תחת שליטה לך שתוכלי לבצע את תרגילי הנשימה ולהסתובב. שליטה בכאב מאפשר לך להחלים באורה טובה יותר.

תקבל/י מרשם לתרופות כאב בבליעה לפני עזיבתך את בית החולים. שוחח/י עם ספק שירותי הרפואה שלך לגבי תופעות לוואי אפשריות ומתי יהיה אפשרות לעבור לתרופות להפגת כאב ללא מרשם. הבא/י את תרופות המרשם להפגת כאב לביקור המשך במרפאה.

כיהול כאב באמצעות רפואה אינטגרטיבית

המומחים שלנו לרפואה אינגרטיבית יכולים לתרום ברם את/ה סובל/ת מכאבם לאחר הניתוח. אנו יכולים לסייע לתרגל מיינדפולנס ומדיטציה באמצעות תרגילי נשימה, תנועה מודעת ושימוש בדמיון מודרך. טכניקות עיסוי וטיפול במזיקה עשויות לספק הקללה. תחושה של שמחה והנאה באמצעות ריקוד עשויה לשנות את מצב הרוח ולהסייע את הפוקוס מהכאב.

אם את/ה מעוניין/ת לנהל את הכאב באמצעות רפואה אינטגרטיבית, בקשה/י מחבר מהוצאות המטפל לקבוע עבורך ייעוץ של הרפואה האינטגרטיבית.

תנוועה וחליכה

תנווה והליכה יסייעו לצמצם את הסיכון להיווצרות קריishi דם ודלקת ריאות. ראוי גם להתחילה

לשחרר גזים ולודוא יציאות מעיים (צואה) תקינות. לפני שחרור מבית החולים יהיה צורך לוודא שביכולתך לבצע יציאות מעיים.

תוכל/י לנوع על ידי הליכה לכיר או לחדר האmbטיה או סביב המחלקה. האחות, הפיזיותרפיסט או המרפא בעיסוק יסייעו לך לנوع, במידת הצורך. קיימים גם טיפולים תנוצה מודעים, כגון טיפול בריקוד, טאי צ'י ו��ga. אם את/ה מעוניינת/ת בטיפול בתנוצה מודעת, בקש מחבר הוצאות המטופל להסדיר ייעוץ עם הרפואה האינטגרטיבית.

כדי לקבל מידע נוספת לגבי כיצד הליכה לאחר ניתוח יכולה לסייע לך בהחלמה, ניתן לקרוא את

Frequently Asked Questions About Walking After Your Surgery

(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/frequently-asked-questions-about-walking-after-your-surgery).

אם/י את ריאותיך

חשוב להפעיל את הריאות כך שיוכלו להתרחב באופן מלא. פועלה זו עשויה למנוע היוצרות של דלקת ריאות.

- עשה/י שימוש בספיrometer או בששבחת 10 דקוט בכל שעה מהשעות בהן את/ה ער/ה.

How To Use Your Incentive Spirometer ניתן לקרוא את (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer).

[\(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer\).](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer)

- תרגל שיעול ונשימה عمוקה. חבר מהוצאות המטופל ינחה אותך כיצד לעשות זאת. כדאי לבצע תרגילים אלה זמן קצר לאחר נטילת התרופות נגד כאבים. החזקת הכרית מעיל לחתק בזמן שאותה מבצע/ת תרגילים אלה עשויה אף היא לסייע.

אחד מספקיו הרפואה האינטגרטיבית של MSK יכול גם הוא לסייע לך בתרגול הריאות על ידי הנהייה באמצעות טכניקות של נשימה או מדיטציה.

שתיה ואכילה

צוות הניאות יאמר לך متى תוכל/י להתחיל לאכול ולשתות. זה בדרך כלל קורה מספר ימים לאחר הניאות. בתחילת תשתת/י רק נוזלים. לאחר מכן, תחיל/י בהדרגה לאכול אוכל מוצק, מכיוון שתוכל/י להכיל יותר מזון.

ברגע שתחל/י לאכול מזון מוצק יותר, תזונאית האשפוז-*MSK Kids* תפגוש אותך. היא תשוחח איתך על מזונות שיש לכלול בתזונתך לאחר הניאות. רצוי לבחור מזונות עתירי חלבון כך

שגופך יקבל את החומרים המזינים הדרושים לו כדי להחלים בצורה הטובה ביותר ביותר לאחר הניתוח.

ניהול השינוי בתנעות המעי

אנשים מסוימים חווים שלשול (יציאות רכות או מימיות) בעת שהותם בבית החולים לאחר הניתוח. צוות הטיפול יסייע לך לנוהל את המצב.

מקלחת

יש לשטוף את הפנים, לzechach שניים ולהחליף פוג'מה מיידי يوم. בקשי/ את עזרת אחד מאנשי הצוות במידת הצורך.

תוכל/י להתקלח עם סיוע 48 שעות (יוםיים) לאחר הסרת הצינורית או הנזק האחרון.

קבלת כימותרפיה

אם את/ה מקבל/ת כימותרפיה כחלק מהטיפול בסרטן, ייתכן שתתקבל/י טיפול כימותרפי בזמן שהותך בבית החולים. הוצאות המטופל ישוחח איתך ויסביר לך למה לצפות.

אם צוות הטיפול הקרוב יותר לביתך ינהל את הטיפול הכימותרפי, צוות הטיפול ב- MSK יעבד יחד איתך לשם תכנון וניהול הטיפול.

שחרור מבית החולים

החדר כבר יתחיל להחלים בשלב בו תהיה/י מוכן/ה לעזוב את בית החולים. לפני עזיבתך את בית החולים, בדוק/י את החדר יחד עם המטופל שלך ואחד מהרופאים המטופלים. הידיעה של כיצד נראה החדר תסייע לך להביחין בשינויים מאוחר יותר.

לפני שחרורך הרופא המטופל ייתן לך מכתב שחרור ומרשםים לרופאות. תקבל/י גם העתק כתוב של הנחיות שחרור. אחד מהרופאים המטופלים יעבור יחד איתך על הנחיות אלה לפני עזיבתך.

בבית

מילוי טופס המקבב אחר התאוששות

ברצוננו לדעת כיצד אתה מרגיש לאחר עזיבתך את בית החולים. כדי לסייע לנו בטיפול ברך, אנו נשלח שאלות לחשבון MyMSK שלך. אנו נשלח אותן בכל יום במשך 10 ימים לאחר עזיבתך את בית החולים. שאלות אלה נkirאות טופס מוקב אחר התאוששות.

עליך למלא את טופס מוקב ההחלמה מיידי يوم לפני חצות (12:00 בלילה). מילוי הטופס אורך רק 3-2 דקות. תשובהותיך לשאלות אלה יסייעו לנו להבין מה אתה מרגיש ולמה אתה זיהוך.

בהתבסס על תשובה תיר, אנו עשויים לפנות אליו לקבלת מידע נוסף. מעת לעת, ייתכן שנבקש ממך להתקשר למשרד הרופא המנתה. באפשרות תמיד להתקשר למשרד הרופא המנתה במידה ויש לך שאלות.

למידע נוסף, קרא את *Common Questions About MSK's Recovery Tracker* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker).

ניהול הכאב

גברים חווים כאב או חוסר נוחות במשך פרקי זמן משתנים. ייתכן שעדיין תסבול/י מכאב כלשהו בעת חוזרת הביתה וכנראה שתצטרכ/י ליטול תרופות להפגת כאב. יש אנשים החווים כאב, לחץ או כאבי שרירים סבירי החתרן במשך 1-2 חודשים. אין פירוש הדבר שהוא אינו תקין.

יש לעקב אחר ההנחיות להלן כדי לסייע בניהול הכאב בבית.

- עליך ליטול את תרופותיך לפי ההנחיות ועל פי הצורך.
- יש ליצור קשר עם הרופא המתפל במידה והתרופות שנרשמו אינן מחלות על הכאב.
- אין לנוהג או לשתו אלכוהול בעת נטילת תרופות מרשם לכאב. תרופות מרשם מסוימות להפגת כאב עלולות לגרום לישנויות (נמנום). אלכוהול עשוי להחמיר את הנמנום.
- ככל שהחתרן מחלים, כך יפחתו גם הכאב וגם ההזדקות לתרופות להפגת כאב. משכך כאבים ללא מרשם יכול לסייע במקרה של כאבים ואי נוחות. אצטמיןופן (Tylenol®) או איבופרופן (Advil או Motrin) הינם דוגמאות לתרופות לשיכוך כאבים ללא מרשם.
- יש לעקב אחר הוראות הרופא בנוגע להפסקה של נטילת התרופות במרשם להפגת כאב.
- אין להציג בנטילת תרופה מכל סוג שהוא. יש לפעול על פי ההוראות של תוויות התרופות או על פי הוראות הרופא המתפל.
- יש לקרוא את התוויות על גבי כל התרופות שאתה/ת נוטל/ת. הדבר חשוב במיוחד במקרה של נטילת אצטמיןופן. אצטמיןופן הוא מרכיב נפוץ בתרופות ללא מרשם רפואי. נטילה מוגמת עלולה לפגוע בכבד. אין ליטול יותר מתרופה אחת המכילה אצטמיןופן מבליל לשוחח עם חבר בצוות המתפל.
- תרופות לכאב אמורות לסייע לך לחזור לפעילויות רגילה. יש ליטול כמות מספקת של תרופות שיאפשר לך לבצע את הפעילויות או התרגלים שלך בנוחות. יתרן שהכאב יתגבר מעט ברגע שתתחיל/י להיות פעיל/ה יותר.
- יש לעקב אחר זמני נטילת התרופות להפגת כאב. הן פועלות בצורה הטובה ביותר בioter 45-30.

דקהות לאחר נטילתן. נטיית התרופות כשהכאב רק מתחיל עדיפה מאשר להמתין שהכאב יחמיר.

תרופות מסוימות להפתת כאב, כגון אופיוואידים, עלולות לגרום לעצירות. עצירות פירושה שיש פחות תנועות מעיים מהרגיל, או שיש קושי ביציאות, או שניהם.

מניעת עצירות וניהולה

שוחחי עם הרופא לגבי הדרכים למניעת עצירות לניהולה. ניתן גם לעקב אחריו ההנחיות שלහן.

- השתדל/י לילכת לשירותים בכל יום באותו זמן. גוף יתרגל לילכת בזמן זהה. אך אם את/ה מרגיש/ה דחף להתקנות, אל תדחה/י זאת.
- נשהי להשתמש בשירותים 5 עד 15 דקות לאחר הארוחות. זמן טוב להתקנות הוא אחרי ארוחת הבוקר. זה הזמן בו הרפלקסים במעי הגס הם החזקים ביותר.
- בצעי פעילות גופנית, במידת האפשר.
- שוחחי עם הדיאטנית התזונאית הקלינית אודות כמות הנזלים שעליך לשות מיד يوم. יש לשאוף להגיע לכמות המומלצת של נזלים מיידי יום.
 - בחרי/ נזלים כגון מים, מיצים (כגון שזיפים מיובשים, ענבים, או מיץ אגסים), מרקים ושיקרים של גליה.
 - הימנע/ מנזלים המכילים קפאין (כגון קפה וمشקאות תוססים). קפאין עלול להוציא נזלים מהגוף.
- הגבר/י בהדרגה את כמות הסיבים בתזונתך. שוחחי עם הדיאטנית התזונאית הקלינית אודות כמות הסיבים שעליך לצרוך מיידי יום. ניתן שעברת אוסטומיה או ניתוח מעי לאחרונה. אם כן, יש לבדוק עם ספק שירותי הרפואה לפני ביצוע שינויים כלשהם בתזונה. מזונות עתיר/
סיבים כוללים:
 - קרקרים וחטיפים אחרים מסובין או מדגנים מלאים אחרים.
 - דגני בוקר ולהחמים מדגנים מלאים.
 - פירות וירקות לא קלופים.
 - עליسلط וירוקים.
- פירות יבשים, כגון משמשים, תאנים וצימוקים
- קיימות גם תרופות ללא מרשם וגם תרופות במרשם לטיפול בעצירות. יש לבדוק עם ספק

שירותתי הרפואי לפני השימוש בתרופות למניעת עצירות. זה חשוב ביותר, במיוחד אם עברת אוסטומיה או ניתוח מעיים.

טיפול בחתר

אם הנזק הsofar ממש לפני שחרור מבית החולים, ניתן שהאזור יהיה מכוסה בתחבושת. ניתן להסיר את התחבושת לאחר 24-48 שעות (1-2 ימים). יש לעקוב אחר הוראות הרופא.

יש להתקשר למישר הרופא המתפל אם:

- העור סביב החתר אדום מאוד.
- העור סביב החתר נעשה אדום יותר.
- את/ה רואה הפרשה שנראית כמו מוגלה (סמייקה וחלビות).
- החתר מדיף ריח רע.

מקלחת או רחצה

ניתן להמשיך בשגרת הרחצה הרגילה שלך, אלא אם כן השתחורת עם נזק, אין להתකלח עד להסתו על ידי צוות הטיפול.

אין לטבול את החתר במים (כגון באמבטיה או בבריכת שחיה) למשך 14 יום לאחר הניתוח.

שתיה ואכילה

תזונאית דיאטנית קלינית של MSK Kids תסייע לך לנוהל את משטר התזונה לאחר שחרור מבית החולים. היא תשוחח איתך על מזונות בתזונתך כדי לסייע לך להחלים לאחר הניתוח, לעלות במשקל, או שנייהם. אם את/ה מקבלת/zנה מצינורית בבית, היא תשוחח איתך אודוטות לזהם זמינים וקצב ההזנה.

יש ליצור קשר עם הרופא המתפל במידה והຕיאבן שלך לא חוזר לקדמותו לאחר מספר ימים או אם את/ה מתחילה להקיא.

פעילות גופנית וכושר

תוכלי לחזור לבצע את רוב הפעילויות הרגילים שלך כבר בהגיעו הביתה. יש להימנע מספורט מגע ומאמץ במיוחד במשך כ-6 שבועות לאחר הניתוח. זהו בערך פרק הזמן שלוקח לחתר להבריא.

חזרה לבית הספר או לעבודה

תוכל/י לחזור לבית הספר או לעבודה ברגע שתרגע/י שאות/ה מוכן/ה לך.

נסיעות

רוב האנשים אינם זוקקים להנחות מיוחדות בנוגע לנסיעות. זה בסדר לטוס.

פגישת המאבק

משרד הרופא המantha עשו לקבוע את פגישת המאבק שלך לפני שחרור מבית החולים. או שהם עשויים להתקשר אליו לקביעת פגישה בהגיר הביתה. פגישת המאבק שלך יכולה להתבצע באוון אישי פנים אל פנים או באמצעות וידאו (telemedicine).

מתי יש ליצור קשר עם הרופא המטפל

יש ליצור קשר עם הרופא המטפל במקרה ש:

- החתר מתחליל לאדיםם.
- האדמומיות סביב החתר חמירה.
- נזול מופרש מהחתר.
- האзор שמסביב לחתר מתחליל להtanפה.
- הנפיחות מסביב לחתר חמירה.
- את/ה חווה אובדן תיאנון (חוסר רצון לאכול).
- את/ה מקיא.
- אם יש לך שאלות או חששות.

פרטי יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה יש לפנות אל איש הצוות הרפואי המטפל בר. חבר בצוות הטיפול שלך יענה על שאלותיך ביום שני עד שישי, בין השעות 9:00 ל-17:00. מחוץ למסגרת זמן זו, ניתן להשאיר הودעה, או לשוחח עם ספק אחר ב-MSK. תלמיד ישנים רופא או אחות בתורות.

אם איןך בטוח/ה כיצד להשיג את ספק שירותי הרפואה שלך, יש להתקשר למספר 212-639-2000.

שירותי תמיכה

בסעיף זה מפורטים שירותי התמיכה. אלה יכולים לסייע לך להתכונן לניתוח ולהתואושש לאחריו.

תור כדי קריית סעיף זה, מומלץ לרשום את השאלות שברצונך לשאול את הרופא שלך.

שירותי התמיכה של MSK

משרד קבלה

212-639-7606

אנא צור קשר אם יש לך שאלות בנוגע לאשפוז בבית החולים, כגון בקשה לחדר פרטי.

מחלקה הרדמה

212-639-6840

אנא צור קשר אם יש לך שאלות אודiot [תהליך ההרדמה](#).

חדר תרומות דם

212-639-7643

אנא צור קשר לקבלת מידע מיידני שאתה מעוניין בתחום [תרומות דם או טסיות](#).

Bobst International Center

832-699-7968

אנו מקבלים בברכה מטופלים מכל רחבי העולם, [ומציגים מגוון שירותים](#) לעזרה. אם הינך מטופל בינלאומי, אנא התקשר לעזרה בתיאום הטיפול.

מרכז הייעוץ

www.msk.org/counseling

646-888-0200

אנשים רבים מוצאים שהייעוץ מסייע להם מאוד. מרכז הייעוץ שלנו מספק שירות הייעוץ לייחדים, זוגות, משפחות וקבוצות. יש באפשרותנו גם לרשום תרופות לסיעוע במקרים של חרדה או דיכאון. בקשר הפנימית מאחד מחברי צוות הטיפול שלך, או התקשרות למספר שלמעלה כדי לקבוע פגישה.

Food Pantry Program

646-888-8055

אנו מספקים מזון לאנשים הזוקקים לכך במהלך טיפול הסרטן. שוחח עם חבר בצוות הטיפול שלך, או התקשרות למספר שלמעלה כדי לקבל מידע נוסף.

שירות הרפואה האינטגרטיבית

www.msk.org/integrativemedicine

שירות הרפואה האינטגרטיבית שלנו מציע טיפולים רבים כהשלמה (בשילוב עם) לטיפול רפואי מסורתי. לדוגמה, אנו מציעים טיפול במזיקה, טיפול גופ/נפש, טיפול במוח ותנווה, יוגה וטיפול

במגע. לקביעת פגisha עברו שירותים אלה, יש להתקשר למספר 010-449-646.

ניתן גם לקבע פגישה ייעוץ עם רופא במסגרת שירות הרפואה האינטגרטיבית. הרופא יעבוד איתך יחד כדי לבנות תוכנית לאורח חיים בריאותי ולניהול תופעות הלווואי. לקביעת פגisha ייעוץ, יש להתקשר למספר 08550-8550-608-646.

ספריית MSK

library.mskcc.org

212-639-7439

באפשרות לבקר באתר הספריה שלנו או להתקשר כדי לדבר עם צוות הספריה. הוצאות יכולות לך למצוא מידע נוסף על סוג הסרטן המסוים שלך. ניתן גם לעיין במקור המידע [המדריך החינוכי למטופלים ולcrcנים של שירות הרפואה](#) שבספריה.

שירותי תזונה

www.msk.org/nutrition

212-639-7312

שירותי התזונה שלנו כוללים ייעוץ תזונתי בליווי של דיאטנית-תזונאית קלינית. התזונאית הקלינית יכולה איתך על הרגלי האכילה שלך. היא תוכל גם לסייע לך אכילה במהלך ולאחר הטיפול. בקשר הפנימית מחד מחברי צוות הטיפול שלך, או התחבר למספר שלמעלה כדי לקבע פגישה.

חינוך למטופלים ולקהילה

www.msk.org/pe

בקר באינטרנט החינוכי למטופלים ולקהילה כדי לחפש מקורות מידע חינוכיים, סרטונים ותוכניות מקוונות.

חיזוק למטופלים ולקהילה

646-227-3378

התקשר למחלקה לחיזוק למטופלים בכל שאלה בנוגע לאישור מראש מול חברת הביטוח שלך. זה מכונה אישור מראש.

משרד נציג המטופלים

212-639-7202

אנא התקשר אם יש לך שאלות בנוגע לטופס ייפוי כוח רפואי או אם יש לך דאגות או חששות בנוגע לטיפול.

איש הקשר לשירותי סייעוד רפואיופרטיביים

ניתן להתקשר אם יש לך שאלות לגבי מדיניות MSK בנוגע לשחרור מידע במהלך הניתוח שלך.

שירות אחות ומלוויים פרטיים

917-862-6373

ניתן לבקש שירות אחות או מלוויים פרטיים לטיפול בך בעת שהותך בבית החולים ובבית. התקשר לקבלת מידע נוסף.

שירותי שיקום

www.msk.org/rehabilitation

سرطان וטיפולים בסרטן עלולים לגרום לתחשות חולשה, נזקשות או מתח בגוף. חלק מהטיפולים עלולים לגרום לבצקת למפיקות (נפיחות). הפייזיאטרים (רופאים המתמחים בשיקום), המרפאים בעיסוק והפייזיותרפיסטים שלנו יכולים לעזור לך לשוב לפעילות הרגילהות שלך.

- **רופאים המתמחים בשיקום** מאבחנים ומטופלים בעיות המשפיעות על דרך התנועה ואופן הפעילות שלך. הם יכולים לתוכנן ולסייע לך למתאם את תוכנית טיפול השיקום שלך, בין אם ב-MSK ובין אם במקומם אחר הקרוב יותר לביתך. ניתן להתקשר למחלקה לרפואת שיקום (פייזיאטrica) בטלפון 1929-888-646 לקבלת מידע נוסף.
- **מרפאים בעיסוק** יכולים לסייע לך במידה אתה מתתקשה ביצוע פעילויות יומיומיות. לדוגמה, הם יכולים להמליץ לך על כלים שימושיים להקל על מטלות יומיומיות. **פייזיותרפיסטים** יכולים ללמד אותך תרגילים שיעזרו לך להתחזק ולשפר את הגמישות. ניתן להתקשר למחלקה לטיפול שיקום (פייזיאטrica) בטלפון 1900-888-646 לקבלת מידע נוסף.

מקורות מידע עבור תוכנית RLAC (Resources for Life after Cancer)

646-888-8106

ב-MSK, הדאגה לרופחתך אינה מסתיימת לאחר הטיפול שלך. תוכנית RLAC מיועדת לחולים ששיממו את הטיפול ולבני משפחותיהם.

תוכנית זו מציעה שירותיים רבים. אנו מציעים ימי עיון, סדנאות, קבוצות תמיכה, ויעוץ לחיים לאחר הטיפול. נוכל גם לסייע בנושאים ביוטחניים ובנושא תעסוקה.

תוכניות לבリアות מינית

سرطان וטיפולים בסרטן יכולים להשפיע על הבריאות המינית שלך, על הפוריות שלך או על שתיהן. התוכניות לבリアות מינית של MSK יכולות לסייע לך לפני, במהלך או לאחר הטיפול שלך.

- **התכנית לרפואה מינית לנשים ובריאות האישה** עשויה לסייע עם בעיות בבריאות המינית,

כגון הקדמת גיל המעבר או בעיות פוריות. ניתן לבקש הפניה מאחד מחברי צוות הטיפול, או להתקשר למספר 5076-888-646 כדי לקבל מידע נוסף.

- **הטכנית לרפואה מינית ורפואת הרבייה לגברים** עשויה לסייע בעיות בריאות המינית, כגון הפרעות זיקפה (ED). ניתן לבקש הפניה מאחד מחברי צוות הטיפול, או להתקשר למספר 4024-6024-888-646 כדי לקבל מידע נוסף.

עובדת סוציאלית

www.msk.org/socialwork

212-639-7020

עובדים סוציאליים מסיעים למטופלים, למשפחותיהם ולחבריהם להתמודד עם נושאים הנפוצים בקרב חולי סרטן. הם מספקים קבוצות ייעוץ ותמיכה פרטניות לאורך כל הטיפול. הם יכולים לשיער לך לתקשר עם ילדים ועם בני משפחה אחרים.

העובדים הסוציאליים שלנו יכולים גם לשיער בהפנייה לsocnniyot ותוכניות קהילתיות. אם אתה מתבקש לשלם את החשבונות שלך, תוכל גם לקבל מהם מידע לגבי משאבים כספיים. התחבר למספר שלמעלה כדי לקבל מידע נוסף.

טיפול רוחני

212-639-5982

אנשי הדת (יוועצים רוחניים) שלנו זמינים לצורך האזנה, סיוע בתמיכה בבני משפחה ותפילה. באפשרותם ליצור קשר עם קבוצות קהילה או אמונה, או פשוט להוות בני לוויה ונוכחות רוחנית מנוחת. באפשרותם של כל אחד לבקש **תמיכה רוחנית**. אין חיבת לשתייה לקבוצה דתית מסוימת (חיבור לדת).

הקפלת הבין-דתית של MSK ממוקמת ליד הלובי הראשי של בית החולים. היא פתוחה 24 שעות ביממה. במקרה חירום, יש לתקשרטלפון 2000-639-212. בקשר לשוחח עם איש הדת התוורן.

Tobacco Treatment Program

www.msk.org/tobacco

212-610-0507

אם ברצונך להפסיק לעשן, ל-MSK יש מומחים שיכולים לשיער בכך. התחבר לקבלת מידע נוסף.

תוכניות וירטואליות

www.msk.org/vp

אנו מציעים חינוך מקצועי ותמיכה לחולים ולמטפלייהם. תוכניות אלה הינה מפגשים חיים בהם ניתן לדבר או רק להקשיב. ניתן ללמידה על האבחנה שקיבלת, ומה לצפות במהלך הטיפול וכייזד להתכוון לטיפול בסרטן.

המפגשים הינם פרטיים, חינמיים ומוגבלים על ידי צוות מומחים. בקרו באתר שלנו לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות הוורטואליות או כדי להירשם.

שירותי תמיכה חייצוניים

Access-A-Ride

web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm

877-337-2017

בעיר ניו יורק, רשות התחבורה העירונית (MTA) מציעה שירות נסעה משותפת, מדלת לדלת, עבור אנשים עם מוגבלות שאין אפשרות לנסוע באוטובוס או ברכבת התחתית.

Air Charity Network

www.aircharitynetwork.org

877-712-7177

מספקים שירותי הסעות למרכזי טיפול.

האגודה האמריקאית לסרטן (ACS)

www.cancer.org

(800-227-2345) ACS-2345-800

מציעים מגוון שירותי מידע, הכוללים את Hope Lodge, מקום שבו מטופלים ומטופלים יכולים לשחות בחינם בזמן טיפולו הסרטן שלהם.

Cancer and Careers

www.cancerandcareers.org

646-929-8032

מקhor מידע לשם חינוך, מתן כלים ועריכת אירועים לעובדים החולמים הסרטן.

CancerCare

www.cancercare.org

800-813-4673

השדרה השביעית 275 (בין רחובות מערב 25-1 26-1)

ניו יורק, ניו יורק 10001

מספקים שירותי ייעוץ, קבוצות תמיכה, סדנאות למידה, פרסומים ועזרה כלכלית.

Cancer Support Community

www.cancersupportcommunity.org

מספקים תמיכה וחינוך לאנשים שנפגעו מ סרטן.

Caregiver Action Network

www.caregiveraction.org

800-896-3650

מספקים חינוך ותמיכה עבור אנשים המטפלים בiekיריהם הסובלים ממחלת כרונית או מוגבלות.

Corporate Angel Network

www.corpangelnetwork.org

866-328-1313

מציעים טיסות בחינם לטיפולים בכל רחבי הארץ תוך שימוש במושבים פנויים במטוסי חברה.

Good Days

www.mygooddays.org

877-968-7233

מציעים עזרה כלכלית בתשלומיים שיתופיים (copayment) במהלך הטיפול. על המטופלים להיות בעלי ביטוח רפואי, לעמוד בקריטריוני הכניסה, ולהיות בעלי מרשם לתרופות הנמצאות במסגרת סל הבריאות של Good Days.

Healthwell Foundation

www.healthwellfoundation.org

800-675-8416

מספקים עזרה כלכלית לכיסוי תשלום שיתופי (copayment), פרמיות של שירותי רפואי ותשולמי השתתפות עצמית (deductibles) עבור תרופות וטיפולים מסויימים.

Joe's House

www.joeshouse.org

877-563-7468

מספקים רשות מקומות לשכינה הסמכים למרכז טיפול עבור אנשים החולים הסרטן ומשפחותיהם.

LGBT Cancer Project

www.lgbtcancer.com

מספקים תמייקה והגנה משפטית עבור קהילת הלחט"ב, כולל קבוצות תמייקה מקוונות ומאגרי מידע של מחקרים קליניים היידזוטיים לקהילה הלחט"ב.

LIVESTRONG Fertility

www.livestrong.org/we-can-help/fertility-services

855-744-7777

מספקים מידע אודות רבייה ותמייקה לחולים ולמלחאים מסרטן, שלטיפוליים הרפואיים שעברו קיימ סיכון הקשור לאירוע פוריות.

Look Good Feel Better Program

www.lookgoodfeelbetter.org

(LOOK) (800-395-5665-800-395

תוכנית זו מציעה סדנאות בהן ניתן ללמידה דברים שאפשר לעשות כדי להרגיש טוב יותר לגבי המראה שלך. מידע נוסף להרשמה LSD, נא להתקשר למספר שלעיל או לבקר באתר התוכנית.

National Cancer Institute

www.cancer.gov

(CANCER) (800-422-6237-800-4

National LGBT Cancer Network

www.cancer-network.org

מספקים חינוך, הדרכה וסייע משפטי עבור להט"בים שהחלו מסרטן וכאלה הנמצאים בסיכון.

Needy Meds

www.needy meds.org

מספקים רשימה של תוכניות סיוע למטופלים עבור מותגי תרופות ותרופות גנריות.

NYRx

www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm

מספקים הטבות מרשם לעובדים זכאים ולגמלאים של המזר הציבורי במדינת ניו יורק.

Patient Access Network (PAN) Foundation

www.panfoundation.org

866-316-7263

מספקים סיוע בתשלומים שיתופיים (copayments) עבור מטופלים עם ביטוח.

Patient Advocate Foundation

www.patientadvocate.org

800-532-5274

מספקים גישה לטיפולים, סיוע כלכלי, סיוע ביטוחי, סיוע בשימור עובודה וגישה למדריך המסייעים הלאומי של תתי המבוטחים.

Professional Prescription Advice

www.pparx.org

888-477-2669

מסיעים למטופלים זכאים ללא כיסוי לתרופות מרשם לקבל תרופות בחינם או בעלות מופחתת.

(Gilda's Club לשעבר Red Door Community

www.reddoorcommunity.org

212-647-9700

מקום שבו אנשים החיים עם סרטן יכולים למצוא חברתיות ורגשות באמצעות נטווורקינג, סדנאות, הרצאות ופעילויות חברתיות.

RxHope

www.rxhope.com

877-267-0517

מספקים סיוע בהשגת תרופות לאנשים שידם אינה משגנת.

Triage Cancer

www.triagelcancer.org

מספקת מידע ומשאבים בנושאים משפטיים, רפואיים ופיננסיים עבור מטופלי סרטן ומטופליהם.

מקורות חינוכיים

סעיף זה מפרט את המשאבים החינוכיים המוזכרים במדריך זה. אלה יסייעו לך להתכוון לניתוח ולהתואושש לאחריו.

תור כדי קראת מקורות מידע אלה, מומלץ לרשום את השאלות שברצונך לשאול את הרופא שלך.

• *A Guide for Caregivers* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers)

• *Common Questions About MSK's Recovery Tracker* (www.mskcc.org/cancer-common-questions-about-msks-recovery-tracker)

(care/patient-education/mymsk-recovery-tracker

Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones •
((www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning

Frequently Asked Questions About the MyMSK Goals to Discharge Checklist •
([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-mymsk-goals-\(discharge-checklist](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-mymsk-goals-(discharge-checklist)

Frequently Asked Questions About Walking After Your Surgery •
([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/frequently-asked-questions-\(about-walking-after-your-surgery](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/frequently-asked-questions-(about-walking-after-your-surgery)

Herbal Remedies and Cancer Treatment (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment

How to Be a Health Care Agent (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent

How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids

MSK Kids (www.mskcc.org/he/cancer--care/patient-education/how-to-do-bowel-prep-before-surgery-msk-kids

How to Enroll in MyMSK: Memorial Sloan Kettering's Patient Portal •
([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/how-enroll-mymsk-\(patient-portal](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/video/how-enroll-mymsk-(patient-portal)

How To Use Your Incentive Spirometer (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer

Information for Family and Friends for the Day of Surgery •
([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/information-family-and-friends-\(day-surgery](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/information-family-and-friends-(day-surgery)

Patient-Controlled Analgesia (PCA) (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/patient-controlled-analgesia-pca

Staying Active Before and After Surgery for Pediatric Patients •

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m.

Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

למשאבים נוספים אני בקשר - www.mskcc.org/pediatrics CDI לחפש בספריה הווירטואלית שלנו.

About Your Abdominal Surgery for Desmoplastic Small Round Cell Tumors (DSRCTs) at MSK Kids

- Last updated on February 22, 2024

כל הזכויות שמורות ל- Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center