

# 외래 환자 세포 치료 비상 안내서

## 지침:

<b>심각한 긴급 상황의 경우(생명이 위독한 상황):</b>	<b>MSK의 긴급 치료 센터(UCC) 주소:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>오전 6시부터 자정까지는 다음 경로로 진입하십시오: 425 E. 67th St. (1st Avenue와 York Avenue 사이).</li> <li>그 외 모든 시간에는 다음 경로로 진입하십시오: 1275 York Ave. (East 67th Street와 East 68th Street 사이). 보안 데스크에 길을 물어보십시오.</li> </ul>
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>911에 전화하십시오.</b> 긴급 의료 서비스팀(EMS)의 지원 없이 환자를 이송하지 마십시오.</li> <li>EMS에 귀하와 환자를 MSK의 긴급 치료 센터(UCC)로 이동시켜 달라고 요청하십시오.</li> <li>도착하면 UCC 직원에게 환자가 세포 치료 환자라고 말씀해 주십시오.</li> </ol>	
<b>심각하지 않은 긴급 상황의 경우(생명이 위독하지 않은 상황):</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>환자를 MSK의 긴급 치료 센터(UCC)로 이송하십시오.</li> <li>도착하면 UCC 직원에게 환자가 세포 치료 환자라고 말씀해 주십시오.</li> </ol>	
<b>긴급 상황이 아닌 경우:</b>	세포 치료팀(646-608-3150)으로 연락하십시오.

## 자택 이식 환자 전용:

자택 이식 프로그램에 참여한 환자에게 응급 상황이 발생하면 SeniorCare 긴급 의료 서비스팀(**718-430-9700**)으로 연락하십시오. 전화를 한 후에는 다음과 같이 말씀해 주십시오: **“안녕하세요, 긴급 상황이 발생하여 구급차가 필요합니다.”** 전화를 받은 담당자가 몇 가지 질문을 할 수 있습니다.

의료 서비스팀이 할 수 있는 질문	귀하의 답변
“긴급 상황이 발생한 곳의 주소가 어떻게 됩니까?”	현재 있는 위치의 주소.
“환자는 어디에 있습니까?”	방 호수, 아파트 동수, 층수, 호텔방 호수 또는 사무실 번호.
“지금 전화를 걸고 있는 전화기의 번호가 어떻게 됩니까?”	귀하의 전화번호. 연결이 끊어질 때를 대비하여 귀하에게 가장 빠르게 연락할 수 있는 전화번호를 알려 주십시오.
“어떠한 긴급상황이 발생했습니까?”	의료 서비스팀에 전화한 이유. 예: “환자가 열이 납니다.” 또는 “환자가 숨쉬기 힘들어합니다.”
“환자를 어느 병원으로 이송해야 합니까?”	Memorial Sloan Kettering Cancer Center의 긴급 치료 센터.



	심각한 긴급 상황의 경우: 911로 전화합니다	심각하지 않은 긴급 상황의 경우: MSK의 UCC로 이동합니다	긴급 상황이 아닌 경우: 세포 치료팀(646-608-3150)으로 연락합니다
의식 상태	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 잘 일어나지 못함</li> <li>• 갑자기 팔이나 다리를 움직이지 못함</li> <li>• 발작(몸이 제멋대로 경련을 일으키거나 경직됨)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시력의 급작스러운 변화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 어지러움</li> <li>• 몸이 떨리거나 휘청임</li> <li>• 감정의 변화</li> <li>• 기력의 변화</li> <li>• 잠을 잘 수 없음</li> <li>• 새로운 혼란 증세 또는 평소보다 악화된 혼란 증세</li> <li>• 단어를 쉽게 떠올리지 못함</li> <li>• 의식 상태 수준의 변화</li> <li>• 무감각 또는 저린 느낌</li> <li>• 돌아다닐 수 없음</li> <li>• 연하 문제</li> </ul>
출혈		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 출혈이 멈추지 않음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 토혈(피를 토함)</li> <li>• 코피가 멈추지 않음</li> <li>• 혈뇨(오줌에 피가 섞여 나옴)</li> <li>• 끈적한 검은색 대변을 봄</li> <li>• 한 시간마다 하나 이상의 생리대를 사용함</li> <li>• 점상출혈(피부에 작은 빨간색 또는 보라색 점이 나타남)</li> <li>• 새로운 출혈 부위가 있거나 평소보다 출혈량이 많음</li> </ul>
혈당		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 혈당이 50 미만임</li> <li>• 혈당이 400을 초과함</li> <li>• 일어나는 것이 어려움</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 혈당이 50과 400 사이임</li> </ul>
호흡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 숨을 쉬지 않음</li> <li>• 숨쉬는 것이 어려움</li> <li>• 기도가 막힘</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 천명(숨을 쉴 때 휘파람 소리나 바람이 새는 소리가 남)</li> <li>• 활동량이 아주 적어도 평소보다 숨이 쉽게 참</li> <li>• 갑자기 기침을 하기 시작함 또는 기침 증상이 완화되지 않음</li> <li>• 기침할 때 피나 초록색 또는 노란색 점액이 나옴</li> <li>• 누웠을 때 숨쉬는 것이 어려움</li> </ul>
중심정맥카테터 (CVC)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 라인이 공기에 노출되었으며 숨이 참. 라인을 즉시 클램프로 고정합니다.</li> <li>• 라인이 손상되었거나 물이 샘</li> <li>• 라인이 빠짐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카테터를 세척할 수 없음</li> <li>• 삼입 부위에서 분비물이 나옴</li> <li>• 삼입 부위에 통증이 있음</li> <li>• 삼입 부위가 붓거나 빨갱거나 누르면 아픔</li> <li>• 얼굴이나 목이 부음</li> </ul>
설사( 묽은 변)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제어할 수 없는 지속적인 설사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설사와 복부(배) 경련이 시작됨</li> <li>• 알약이 그대로 대변으로 나옴</li> </ul>
낙상	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 낙상 후 의식 상태가 변화함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 낙상 도중 머리를 부딪힘</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 낙상 도중 머리를 부딪히지 않음</li> <li>• 집에서 낙상을 당함</li> <li>• 낙상 후 의식 상태에 변화가 없음</li> </ul>

	심각한 긴급 상황의 경우: 911로 전화합니다	심각하지 않은 긴급 상황의 경우: MSK의 UCC로 이동합니다	긴급 상황이 아닌 경우: 세포 치료팀(646-608-3150)으로 연락합니다
<b>피로</b> (평소보다 더 피곤하거나 기력이 없는 느낌)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 잘 일어나지 못함</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 어지러움</li> <li>• 너무 피곤해서 침대를 벗어나거나 화장실로 걸어갈 수 없음</li> </ul>
<b>열이나 오한</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 입을 통해 체온을 재었을 때 100.4 °F (38 °C) 이상의 열이 있음</li> <li>• 몸이 떨리는 오한(주변 온도가 정상일 때)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 감기 증상(콧물, 눈물, 재채기, 기침)</li> </ul>
<b>구강 통증</b> (점막염)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 숨을 쉬지 않음</li> <li>• 숨쉬는 것이 어려움</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 입 안쪽에 선홍색의 피가 남</li> <li>• 연하 문제</li> <li>• 잇몸, 입술 또는 입 안에 흰 반점 또는 궤양이 있음</li> <li>• 진통제를 먹어도 통증이 완화되지 않음</li> </ul>
<b>메스꺼움</b> (토할 것 같은 느낌) 또는 구토		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 극심한 복부 통증</li> <li>• 구토물에 피나 “커피 찌꺼기” 같은 물질이 있음</li> <li>• 제어할 수 없는 지속적인 메스꺼움과 구토</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 토하지 않고 약을 복용할 수 없음</li> <li>• 메스꺼움 방지약을 먹어도 메스꺼움이 멈추지 않음</li> </ul>
<b>통증</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 극심한 가슴 통증</li> <li>• 극심한 가슴 조임 또는 압박감</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 갑작스럽게 발생하는 극심한 두통</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 통증이 새롭게 생겼거나 통증을 제어할 수 없음</li> <li>• 심장이 심하게 뛰</li> <li>• 심장 박동이 왔다갔다하는 느낌</li> <li>• 가슴 또는 위 작열감</li> <li>• 소변 또는 대변을 볼 때 통증이나 작열감이 느껴짐</li> <li>• 중심정맥카테터(CVC) 삽입 부위에 통증이 느껴짐</li> <li>• CVC를 통해 약물이나 액체를 주입할 때 통증이 느껴짐</li> </ul>
<b>발진</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 새로운 발진이 생김</li> <li>• 통증, 가려움을 동반하는 발진</li> </ul>
<b>부종</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 숨쉬는 것이 어려움</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 목 부종</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다리, 팔 또는 손 부종</li> <li>• 통증을 동반하는(혹은 동반하지 않는) 갑작스러운 부종</li> </ul>
<b>소변</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 혈뇨(오줌에 피가 섞여 나옴)</li> <li>• 소변을 볼 때 통증이나 작열감이 느껴짐</li> <li>• 8시간이 넘는 시간 동안 소변을 볼 수 없음</li> </ul>