

Ambulatoryjna terapia komórkowa

Poradnik dotyczący sytuacji nagłych

Zalecenia:

| | | |
|---|---|---|
| Poważne sytuacje nagłe (zagrożające życiu): | | Adres Centrum pomocy w nagłych przypadkach (Urgent Care Center, UCC) MSK: <ul style="list-style-type: none">• Od godz. 6:00 do północy wejście od 425 E. 67th St. (między 1st Avenue a York Avenue).• W pozostałe godziny wejście od 1275 York Avenue (między ulicą East 67th a East 68th). Należy zapytać o wskazówki przy stanowisku ochrony. |
| 1. Zadzwoń pod numer 911. Nie należy przewozić pacjenta bez wsparcia pogotowia ratunkowego. | | |
| 2. Poinformuj załogę pogotowia ratunkowego, aby przewiozła pacjenta i Ciebie do Centrum pomocy w nagłych przypadkach (UCC) MSK. | | |
| 3. Po przybyciu poinformuj członka personelu UCC, że pacjent jest osobą przechodzącą terapię komórkową. | | |
| Mniej poważne sytuacje nagłe (niezagrożające życiu): | | |
| 1. Przewieź pacjenta do Centrum pomocy w nagłych przypadkach (UCC) MSK. | | |
| 2. Po przybyciu poinformuj członka personelu UCC, że pacjent jest osobą przechodzącą terapię komórkową. | | |
| Sytuacje inne niż nagłe: | Zadzwoń na oddział terapii komórkowej pod numer 646-608-3150. | |

Informacje dotyczące wyłącznie pacjentów transplantacyjnych pozostających w domu:

Jeśli sytuacja nagła dotyczy pacjenta objętego programem dla pacjentów transplantacyjnych przebywających w domu, należy zadzwonić do Centrum pomocy w sytuacjach nagłych SeniorCare pod numer **718-430-9700**.

Po uzyskaniu połączenia należy powiedzieć: „**Dzień dobry, mam sytuację nagłą i potrzebuję karetki pogotowia**”. Osoba, która odbierze telefon, może zadać kilka pytań.

| Pytanie | Co należy odpowiedzieć |
|--|---|
| „Pod jakim adresem wystąpiła sytuacja nagła?” | Podaj adres, pod którym przebywasz. |
| „Gdzie znajduje się pacjent?” | Numer pokoju, mieszkania, piętra, apartamentu lub biura. |
| „Z jakiego numeru jest wykonywane połączenie?” | Podaj swój numer telefonu. Należy podać najlepszy numer telefonu, pod którym można się z Tobą skontaktować w razie rozłączenia rozmowy. |
| „Jaki charakter ma sytuacja nagła?” | Podaj powód połączenia. Przykładowo: „Pacjent ma gorączkę” lub „Pacjent ma problemy z oddychaniem”. |
| „Do którego szpitala należy przewieźć pacjenta?” | Centrum pomocy w nagłych przypadkach (UCC) Memorial Sloan Kettering Cancer Center. |



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

| | Poważne sytuacje nagłe: Zadzwoń pod numer 911 | Mniej poważne sytuacje nagłe: Udaj się do UCC MSK | Sytuacje inne niż nagłe: Zadzwoń na oddział terapii komórkowej pod numer 646-608-3150 |
|---|--|--|---|
| Czujność | <ul style="list-style-type: none"> Pacjent nie wybudza się Pacjent nagle nie może ruszać rękami lub nogami Atak padaczkowy (niekontrolowane drgawki lub drętwienie ciała) | <ul style="list-style-type: none"> Nagła zmiana w widzeniu | <ul style="list-style-type: none"> Zawroty głowy Dreszcze lub drżenie Zmiany nastroju Zmiany w poziomie energii Problemy ze snem Nowa lub większa niż zwykle dezorientacja Problemy ze znalezieniem odpowiednich słów Zmiany w poziomie czujności Drętwienie lub mrowienie Pacjent nie może się poruszać Problemy z przełykaniem |
| Krwawienie | | <ul style="list-style-type: none"> Krwawienie, które nie ustaje | <ul style="list-style-type: none"> Wymiotowanie krwią Krwawienie z nosa, które nie ustaje Krew w moczu (przy oddawaniu moczu) Stolec, który jest czarny i smolisty (lepki) Używanie co najmniej 1 podpaski na godzinę Wybroczyny (małe czerwone lub filetowe plamki na skórze) Nowe lub bardziej obfite niż zwykle krwawienie |
| Poziom cukru we krwi | | <ul style="list-style-type: none"> Poziom cukru we krwi poniżej 50 Poziom cukru we krwi powyżej 400 Problemy z wybudzeniem | <ul style="list-style-type: none"> Poziom cukru we krwi pomiędzy 50 a 400 |
| Oddychanie | <ul style="list-style-type: none"> Brak oddechu Problemy z oddychaniem Krztuszenie się | | <ul style="list-style-type: none"> Świszczenie (gwiżdżący lub piszczący dźwięk podczas oddychania) Brak tchu (zadyszka) występujący szybciej przy niewielkiej aktywności Nowy lub nieustępujący kaszel Odkrztuszanie krwi bądź zielonego lub żółtego śluzu Problemy z oddychaniem w pozycji leżącej |
| Centralny cewnik żylny (CVC) | | <ul style="list-style-type: none"> Powietrze dostaje się do przewodu, występują duszności. Należy natychmiast zacisnąć przewód. Przerwany lub przeciekający przewód Wypadnięcie przewodu | <ul style="list-style-type: none"> Nie można przepłukać cewnika Z miejsca wprowadzenia cewnika sączy się płyn Ból w miejscu wprowadzenia cewnika Obrzęk, zaczerwienienie lub wrażliwość w miejscu nacięcia Obrzęk twarzy lub szyi |
| Biegunka (luźne lub wodniste wypróżnienia) | | <ul style="list-style-type: none"> Niekontrolowana, ciągła biegunka | <ul style="list-style-type: none"> Początki biegunki i skurczów brzucha Wydalanie całych tabletek w stolcu |

| | Poważne sytuacje nagłe: Zadzwoń pod numer 911 | Mniej poważne sytuacje nagłe: Udaj się do UCC MSK | Sytuacje inne niż nagłe: Zadzwoń na oddział terapii komórkowej pod numer 646-608-3150 |
|---|--|--|--|
| Upadek | <ul style="list-style-type: none"> Zmiana świadomości po upadku | <ul style="list-style-type: none"> Uderzenie w głowę podczas upadku | <ul style="list-style-type: none"> Brak uderzenia w głowę podczas upadku Upadek w domu Brak zmiany świadomości po upadku |
| Zmęczenie (uczucie większego zmęczenia lub osłabienia niż zwykle) | <ul style="list-style-type: none"> Pacjent nie wybudza się | | <ul style="list-style-type: none"> Zawroty głowy Zbyt duże zmęczenie, aby wstać z łóżka lub przejść do łazienki |
| Gorączka lub dreszcze | | <ul style="list-style-type: none"> Gorączka co najmniej 38°C (100,4°F) podczas pomiaru w ustach Dreszcze (temperatura może być prawidłowa) | <ul style="list-style-type: none"> Objawy przeziębienia (katar, łzawienie oczu, kichanie, kaszel) |
| Ból w jamie ustnej (zapalenie błony śluzowej) | <ul style="list-style-type: none"> Brak oddechu Problemy z oddychaniem | | <ul style="list-style-type: none"> Jasnoczerwona krew w jamie ustnej Problemy z przełykaniem Białe plamy lub owrzodzenia na dziąsłach, ustach lub w jamie ustnej Ból, który nie ustępuje po przyjęciu leków przeciwbólowych |
| Nudności lub wymioty (uczucie potrzeby wymiotowania) | | <ul style="list-style-type: none"> Bardzo silny ból brzucha Krwiste lub fusowate wymioty Niekontrolowane, ciągłe nudności i wymioty | <ul style="list-style-type: none"> Brak możliwości przyjęcia leków bez wymiotów Nudności nie ustępują po przyjęciu leków przeciw nudnościom |
| Ból | <ul style="list-style-type: none"> Bardzo silny ból w klatce piersiowej Bardzo silny ucisk w klatce piersiowej | <ul style="list-style-type: none"> Nagły i bardzo silny ból głowy | <ul style="list-style-type: none"> Nowy lub niemożliwy do opanowania ból Kołatanie serca Uczucie łomotania serca Pieczenie w klatce piersiowej lub żołądka Ból lub pieczenie podczas oddawania moczu lub wypróżniania Ból w miejscu wprowadzenia centralnego cewnika żylnego (CVC) Ból podczas podawania leków lub płynów przez CVC |
| Wysypka | | | <ul style="list-style-type: none"> Nowa wysypka Wysypka, której towarzyszy ból lub swędzenie |
| Obrzęk | <ul style="list-style-type: none"> Problemy z oddychaniem | <ul style="list-style-type: none"> Obrzęk w gardle | <ul style="list-style-type: none"> Obrzęk nóg, rąk lub dłoni Nagły obrzęk z bólem lub bez bólu |
| Oddawanie moczu | | | <ul style="list-style-type: none"> Krew w moczu (przy oddawaniu moczu) Ból lub pieczenie podczas oddawania moczu Nie można oddać moczu przez ponad 8 godzin |