



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Информация о процедуре пероральной эндоскопической миотомии (РОЕМ)

Эта информация поможет вам подготовиться к процедуре пероральной эндоскопической миотомии (РОЕМ) в центре MSK. Здесь также приведена информация о том, как ухаживать за собой после процедуры.

РОЕМ – это процедура лечения расстройств глотательного рефлекса без хирургического вмешательства. Расстройство глотательного рефлекса представляет собой затруднение при глотании или чрезмерное напряжение мышц, участвующих в процессе глотания.




Рисунок 1. Пищевод

Во время процедуры ваш медицинский сотрудник будет использовать гибкую трубку, которая называется эндоскопом, чтобы увидеть внутреннюю поверхность пищевода. Пищевод — это трубчатый орган, по которому пища и жидкости проходят из полости рта в желудок (см. рисунок 1).

Ваш медицинский сотрудник расслабит мышцы пищевода, вызывающие проблемы с глотанием. Для этого к концу эндоскопа прикрепляются

инструменты для разделения мышц. Это облегчит глотание и позволит пищеводу перемещать пищу и жидкость в желудок.

Ваш медицинский сотрудник расскажет, чего следует ожидать и как подготовиться к этой процедуре. После процедуры вы останетесь в больнице на 2–3 дня.

Может возникнуть вероятность того, что ваш медицинский сотрудник не сможет провести процедуру РОЕМ. Это может произойти в том случае, если ваш пищевод слишком узкий, и в него сложно ввести эндоскоп. Если это произойдет, ваш медицинский сотрудник объяснит, почему он не может провести процедуру. Он обсудит с вами другие варианты лечения. После разговора с медицинским сотрудником вы сможете отправиться домой вместе со своим сопровождающим.

## За 2 недели до процедуры

### Спросите о ваших лекарствах

Возможно, перед процедурой вам придется прекратить прием некоторых лекарств. Обсудите с медицинским сотрудником, прием каких лекарств вам можно прекратить.

Ниже приведено несколько распространенных примеров, но существуют и другие. **Обязательно расскажите своей лечащей команде обо всех принимаемых вами лекарствах, включая рецептурные и безрецептурные препараты.** Рецептурный препарат — это лекарство, которое можно получить только по рецепту врача. Безрецептурный препарат — это лекарство, которое можно купить без рецепта.



Очень важно правильно принимать лекарства в период перед процедурой. Если вы не соблюдаете это требование, нам, возможно, придется отменить вашу процедуру.

### **Лекарства, разжижающие кровь**

Если вы принимаете лекарства, разжижающие кровь (влияющие на свертываемость крови), поговорите с вашим медицинским сотрудником,

который их назначил, чтобы выяснить, следует ли вам прекратить их прием. Решение о прекращении приема этого лекарства зависит от причины, по которой вы его принимаете.

Ниже приводятся примеры распространенных лекарств, разжижающих кровь. Существуют и другие, поэтому обязательно сообщите своей лечащей команде обо всех принимаемых вами лекарствах. **Не прекращайте прием лекарства, разжижающего кровь, не посоветовавшись со специалистом вашей лечащей команды.**

- Apixaban (Eliquis®)
- Aspirin
- Celecoxib (Celebrex®)
- Cilostazol (Pletal®)
- Clopidogrel (Plavix®)
- Dabigatran (Pradaxa®)
- Dalteparin (Fragmin®)
- Dipyridamole (Persantine®)
- Edoxaban (Savaysa®)
- Enoxaparin (Lovenox®)
- Fondaparinux (Arixtra®)
- Heparin (подкожное введение)
- Meloxicam (Mobic®)
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ibuprofen (Advil®, Motrin®) и naproxen (Aleve®)
- Pentoxifylline (Trental®)
- Prasugrel (Effient®)
- Rivaroxaban (Xarelto®)
- Sulfasalazine (Azulfidine®, Sulfazine®)
- Ticagrelor (Brilinta®)
- Tinzaparin (Innohep®)
- Warfarin (Jantoven®, Coumadin®)

## **Лекарства для лечения диабета**

Если вы принимаете insulin или другие лекарства для лечения диабета, возможно, вам потребуется изменить их дозировку. Спросите врача, который назначил вам лекарство для лечения диабета, что вам нужно сделать за один день до процедуры и утром в день процедуры.

Не принимайте следующие лекарства накануне или в день проведения

процедуры:

- Metformin, например Glucophage® или Glumetza®.
- Лекарства, в состав которых входит metformin, например, Janumet®.

## **При необходимости возьмите у своего медицинского сотрудника справку**

Справка о допуске — это документ, в котором сказано, что для вас эта процедура безопасна. Она вам понадобится, если у вас:

- установлен автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (AICD);
- случались приступы боли в груди, головокружение, новые или более сильные случаи затруднения дыхания или обмороки в течение последних 6 недель.

Вы можете получить справку о допуске у вашего кардиолога (врача по лечению сердца). Если у вас нет кардиолога, вы можете получить ее у своего основного лечащего врача.

Справку о допуске к процедуре необходимо предоставить в офис врача центра MSK не позднее, чем за **3 дня** до проведения процедуры.

## **За 1 неделю до процедуры**

### **Соблюдайте указания медицинского сотрудника при приеме аспирина**

Аспирин может вызвать кровотечение. Если вы принимаете аспирин и лекарства, содержащие аспирин, возможно, вам придется изменить дозу или прекратить их прием за 7 дней до процедуры. Выполняйте инструкции своего медицинского сотрудника. **Не прекращайте прием аспирина без соответствующих указаний.**

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с материалом *Как проверить, содержит ли лекарство или добавка aspirin, другие НПВП, витамин E или рыбий жир* ([www.mskcc.org/ru/cancer-](http://www.mskcc.org/ru/cancer-)

[care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](#)).

## **Договоритесь с кем-нибудь, чтобы вас отвезли домой**

У вас должен быть ответственный сопровождающий, который отвезет вас домой после процедуры. Ответственный сопровождающий — это человек, который поможет вам безопасно добраться домой. Этот человек должен иметь возможность связаться с вашей медицинской бригадой в случае возникновения каких-либо опасений. Договоритесь об этом заранее, до дня процедуры.

Если вам не удалось найти ответственного сопровождающего, который отвезет вас домой, позвоните в одно из указанных ниже агентств. Вам предоставят сопровождающего, который отвезет вас домой. Такие услуги платные, и вам потребуется обеспечить транспорт. Можно взять такси или арендовать машину, однако в этом случае все равно потребуется, чтобы с вами был ответственный сопровождающий.

### **Агентства в Нью-Йорке**

VNS Health: 888-735-8913

Caring People: 877-227-4649

### **Агентства в Нью-Джерси**

Caring People: 877-227-4649

## **За 3 дня до процедуры**

### **Поговорите с медсестрой/медбратом отделения эндоскопии**

Медсестра/медбрат отделения эндоскопии позвонит вам в промежутке между 8:00 и 18:00 часами за 3 дня до процедуры. С вами обсудят инструкции, приведенные в этом руководстве. Кроме того вам зададут вопросы по вашей медицинской карте.

Медсестра/медбрат также просмотрит список ваших лекарств и скажет, какие из них вам следует принять утром в день процедуры.

# За 2 дня до процедуры

## Добавки с содержанием железа

Если вы принимаете добавки с содержанием железа, прекратите их прием за 2 дня до процедуры. Добавки с содержанием железа могут изменить цвет вашего пищевода. Из-за этого медицинскому сотруднику может быть сложнее его увидеть.

# За день до процедуры

## Follow a full liquid diet

Start following a full liquid diet the day before your procedure. A full liquid diet is a diet where you do not eat any solid foods. You can eat foods that you do not need to chew or bite, such as yogurt. Some examples of things you can drink and eat are listed in the “Full Liquid Diet” table.

While you’re on this diet, try to drink at least 1 (8-ounce) cup of liquid every hour while you’re awake. Drink plenty of different kinds of liquids, not just water, coffee, and tea. You can drink liquids of any color.

If you have diabetes, ask the healthcare provider who manages your diabetes what you should do while on a full liquid diet.

Full Liquid Diet		
	OK to Drink	Do Not Drink
<b>Soups</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Broth, bouillon, or consommé.</li><li>• Smooth blenderized soups, such as cream of potato, carrot, and broccoli.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soups that have whole food pieces such as vegetables, pastina, or rice.</li></ul>
<b>Dairy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Smooth ice cream.</li><li>• Smooth yogurt, such as plain, vanilla, lemon, or coffee flavors.</li><li>• Milk, Lactaid® milk, soy milk, almond milk, and rice milk.</li><li>• Milkshakes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dairy that has fruit, nuts, granola, or whole food pieces.</li></ul>

<b>Grains</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hot cereals, such as farina, strained oatmeal, grits, and Wheatena®, made with enough liquid so they're thin and runny with no lumps.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grains that have fruit, nuts, granola, or whole food pieces such as grains with fruit, nuts, seeds, or granola.</li> </ul>
<b>Nutritional Supplements*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquid nutritional supplements, such as Ensure®, Boost®, and Carnation Breakfast Essentials® drinks.</li> <li>Pudding nutritional supplements, such as Boost pudding and Ensure Original Pudding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supplements that have added fruit, nuts, granola, or whole food pieces such as fruits, nuts, or granola.</li> </ul>
<b>Other</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sugar, salt, or a dash of pepper blended into the foods and drinks above.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bubble teas.</li> <li>Alcoholic drinks.</li> </ul>

\* You can buy nutritional supplements at your local pharmacy without a prescription.

## **Запишите время, на которое назначена процедура**

Сотрудник приемного отделения (Admitting Office) позвонит вам после обеда (после 12:00) накануне дня процедуры. Если проведение процедуры запланировано на понедельник, вам позвонят в предшествующую пятницу.

Сотрудник сообщит, когда вам следует приехать в больницу на процедуру. Вам также напомнят, как пройти в отделение. Если до 19:00 с вами никто не свяжется, позвоните по номеру 212-639-5014.

## **День проведения процедуры**

### **Инструкции по употреблению напитков**

В период между полуночью и за 2 часа до времени прибытия в больницу пейте только те жидкости, которые указаны в списке ниже. Не пейте и не ешьте ничего другого. Ничего не пейте за 2 часа до прибытия.

- Воду
- Прозрачный яблочный сок, прозрачный виноградный сок или прозрачный клюквенный сок
- Напитки Gatorade или Powerade
- Черный кофе или обычный чай. Можно добавить сахар. Больше ничего не добавляйте.
  - Не добавляйте молоко или сливки, включая растительное молоко и молочный порошок.
  - Не добавляйте мед.
  - Не добавляйте ароматизированный сироп.

Если у вас диабет, обратите внимание на количество сахара в этих напитках. Если вы включите в свой рацион эти напитки без сахара, с низким содержанием сахара или без добавления сахара, вам будет легче контролировать уровень сахара в крови.

Перед операцией необходимо избегать обезвоживания, поэтому пейте, если испытываете жажду. Не пейте больше, чем вам нужно. Во время операции вам будут вводить жидкости внутривенно.



**Ничего не пейте за 2 часа до прибытия.** Это также касается воды.

### **Что необходимо запомнить**

- Примите только те лекарства, которые медицинский сотрудник велел принять утром в день проведения процедуры. Запейте их несколькими маленькими глотками воды.
- Не наносите лосьоны, крем, пудру, парфюмерию или одеколон.
- Снимите все ювелирные украшения, включая пирсинг на теле.
- Оставьте дома все ценности, такие как кредитные карты и ювелирные украшения.



- Если вы носите контактные линзы, снимите их и наденьте очки.

## **Что взять с собой**

- Список всех лекарств, которые вы принимаете дома, включая пластыри и мази.
- Ингалятор для экстренной помощи (Ventolin®) от астмы, если он у вас есть.
- Футляр для очков или контактных линз, если вы их носите.
- Бланк доверенности на принятие решений о медицинской помощи и другие предварительные распоряжения, если вы их заполнили.
- Если вам имплантирован кардиостимулятор или (AICD), возьмите с собой карточку-памятку.

## **Куда идти**

Процедура будет проходить по указанному ниже адресу:

### **Отделение эндоскопии в Memorial Hospital (основная больница центра MSK)**

1275 York Ave. (между East 67<sup>th</sup> Street и East 68<sup>th</sup> Street)

New York, NY 10065

Поднимитесь на лифте В на 2-й этаж. Поверните направо и войдите через стеклянные двери в отделение эндоскопии/хирургии дневного стационара (Endoscopy/Surgical Day Hospital Suite).

## **Что ожидать в день процедуры**

По прибытии различные сотрудники центра попросят вас назвать и продиктовать по буквам ваше имя и дату рождения. Это необходимо для вашей безопасности. Возможно, люди с похожим или точно таким же именем проходят процедуру в тот же день.

Переодевшись в больничную рубашку, вы встретитесь с медсестрой/медбратом. Она/он введет вам внутривенную (в/в) капельницу в одну из вен, как правило, на руке или на кисти руки. Ваша

лечащая команда будет использовать в/в катетер для введения анестезии (лекарства, чтобы вы уснули) во время процедуры. Также перед процедурой возможно введение жидкостей через в/в катетер.

Перед процедурой вы поговорите со своим врачом. Вам разъяснят процедуру и ответят на ваши вопросы.

## **Во время процедуры**

Когда придет время процедуры, сотрудник отведет вас в процедурный кабинет. Сотрудник лечащей команды поможет вам лечь на процедурный стол. Медсестра/медбрат будет продолжать следить за вашим сердцебиением, дыханием и артериальным давлением. Вы будете получать кислород через тонкую трубочку, которая располагается под носом.

Вы получите анестезию через в/в капельницу и заснете. После этого врач введет эндоскоп вам в рот и далее в пищевод. На конце эндоскопа будет прикреплена небольшая камера. Ваш врач будет использовать эту камеру для направления движения эндоскопа. Видео с камеры будет доступно для врача на мониторе рядом с ним (см. рисунок 2).




Рисунок 2. Направление движения эндоскопа врачом

Во время процедуры врач сделает небольшой разрез (хирургический надрез) во внутреннем слое пищевода (см. рисунок 3, А). Затем с помощью эндоскопа он сделает проход в мышечной оболочке вашего пищевода (см. рисунок 3, В). На конце эндоскопа будет закреплен специальный инструмент. С помощью этого инструмента он разрежет и расслабит все напряженные мышцы пищевода (см. рисунок 3, С).

По окончании процедуры врач удалит эндоскоп. После этого он наложит на разрезы скобы или швы (см. рисунок 3, D).

Эта процедура обычно занимает от 1 до 3 часов. Иногда это может занять больше времени. Узнайте у своей лечащей команды, сколько времени займет процедура.




Рисунок 3. Этапы процедуры РОЕМ

## После процедуры

### В больнице

После проведения процедуры вы проснетесь в послеоперационной палате (Post Anesthesia Care Unit (PACU)). Медсестра/медбрат будет следить за температурой вашего тела, а также за пульсом, артериальным давлением и уровнем кислорода. Вы будете получать кислород через тонкую трубочку, которая располагается под носом.

Вы проведете в больнице от 2 до 3 ночей. Пока вы находитесь в

больнице, вам сделают рентгенограмму пищевода. Рентгенограмма пищевода — это рентгеновский снимок внутренней поверхности пищевода. Это делается для того, чтобы убедиться, что ваш пищевод заживает.

## **Дома**

Перед выпиской из больницы ваш медицинский сотрудник научит вас, как ухаживать за собой. Он обсудит с вами вашу диету и ее продолжительность.

В течение первых 7 дней после процедуры соблюдайте следующие правила:

- Не пейте алкоголь.
- Воздержитесь от интенсивных физических нагрузок (например, бег трусцой).
- Не поднимайте ничего тяжелее 10 фунтов (4,5 кг).
- По возможности старайтесь не покидать Нью-Йорк. Это необходимо на случай, если у вас возникнут проблемы после процедуры.

## **Возвращение на работу**

Большинство людей может вернуться на работу через 7 дней после процедуры. Если ваша работа предполагает много движения или подъем тяжестей, возможно, вам придется побыть дома дольше. Спросите у своего медицинского сотрудника, когда вам можно будет снова приступить к работе.

## **Последующий уход**

Через 3 месяца после процедуры вы придете к медицинскому сотруднику на прием для последующего наблюдения. Во время этого приема вам будет сделана еще одна рентгенограмма пищевода, чтобы проверить, как идет заживление.

## **Когда следует обращаться к своему**

# медицинскому сотруднику

Позвоните медицинскому сотруднику, если у вас возникло что-либо из перечисленного ниже:

- температура 101 °F (38,3 °C) или выше;
- боль в груди;
- проблемы с дыханием;
- слабость или ощущение, что вы сейчас упадете в обморок;
- отек пищевода или проблемы с глотанием;
- боль в горле, которая не проходит;
- отек в области брюшной полости (живота);
- стул темного цвета;
- кровохарканье;

## Контактная информация

Если у вас появились вопросы, задайте их непосредственно сотруднику вашей лечащей команды. Если вы являетесь пациентом центра MSK и вам нужно обратиться к медицинскому сотруднику после 17:00, в выходные или праздничные дни, позвоните по номеру 212-639-2000 и спросите дежурного гастроэнтеролога.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

About Your Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) Procedure - Last updated on April 5, 2024

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center