



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Уход при подозреваемой или действительной экстравазации

Эта информация позволит вам узнать, как осуществлять уход при подозреваемой или действительной экстравазации.

Экстравазацией называется утечка лекарства из вены в окружающие ткани. Это может вызывать раздражение кожи и появление волдырей и открытых ран. Такая ситуация может произойти в любом месте, где установлена капельница внутривенного введения.

Вы получили эту информацию, поскольку есть вероятность того, что некоторое количество введенного вам лекарства проникло в ткани.

Чтобы ослабить возможную боль и раздражение, следуйте приведенным ниже инструкциям.

## Уход за местом экстравазации

- Накладывайте на это место \_\_\_\_\_ компресс 4–5 раз в день в течение следующих 48 часов (2 суток). Каждый раз оставляйте компресс на 20 минут. Это поможет уменьшить отек и дискомфорт.
- В течение следующих 24–48 часов как можно чаще приподымайте затронутый участок, подкладывая под него подушку. Затронутым участком является место экстравазации и область вокруг него. Это поможет уменьшить отек и улучшить кровоснабжение участка.
- Принимайте душ, используя мягкое мыло, и осторожно

промакивайте участок насухо. Не подвергайте участок воздействию каких-либо жидкостей.

- Если ваш врач дал вам лекарство от экстравазации, следуйте его инструкциям по нанесению. Не наносите на затронутый участок другие лосьоны, кремы или мази, если это не рекомендовано вашим медицинским сотрудником.
- Перед выходом на улицу прикрывайте затронутый участок, чтобы защитить его от солнечного света. Солнечный свет может усилить раздражение.
- Не допускайте сдавливания участка.
- Носите свободную одежду. Обтягивающая одежда может вызвать раздражение на затронутом участке.
- Не массируйте и не трите область вокруг места экстравазации.

## **Когда следует обращаться к своему медицинскому сотруднику**

Позвоните своему медицинскому сотруднику, если у вас:

- возникли изменения в месте экстравазации или вокруг него, например:
  - появление или усиление:
    - боли или чувства жжения;
    - покраснения или изменения цвета кожи;
    - Отек
  - повреждение кожи в месте экстравазации;
  - волдыри или жидкие выделения в месте экстравазации;
  - онемение, покалывание или изменение ощущений в месте экстравазации;
  - теплая или горячая на ощупь кожа;

- возникли проблемы с подвижностью на затронутом участке, например, вы не можете согнуть руку;
- температура 100,4 °F (38 °C) или выше;
- любые другие вопросы или проблемы.

## Последующий уход

Если лекарство, проникнувшее в ткани, — это препарат для химиотерапии, медсестра/медбрат позвонит вам на следующий день после того, как произошла экстравазация, чтобы узнать о вашем самочувствии. Медсестра/медбрат будет продолжать звонить вам один раз в неделю в течение следующих 3–6 недель. Она/он расскажет, как долго нужно будет ухаживать за местом экстравазации.

Важно, чтобы вы предоставили медсестре/медбрата номер телефона, по которому можно будет с вами связаться. Если вы пропустите звонок медсестры/медбрата, перезвоните по номеру \_\_\_\_\_.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

Caring for a Suspected or Actual Extravasation - Last updated on July 27, 2023  
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center