

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Распространенные лекарства, применяемые при трансплантации стволовых клеток у детей

В этом материале приводится перечень лекарств, которые часто применяются до, во время или после процедуры трансплантации стволовых клеток у детей. Ваш медицинский сотрудник обсудит с вами лекарства, которые вы принимаете, в том числе их наименования и то, чем обусловлена необходимость их приема. В этом материале слово «вы» относится к вам или вашему ребенку.

Пищевые добавки

- Фолиевая кислота: витамин, необходимый организму для выработки нормальных клеток крови.
- Хлорид калия / фосфат калия: калиевая добавка. Для надлежащей работы мышц (включая сердце) вашему организму необходим калий.
- Оксид магния / магниевая соль: магниевые добавки. Для надлежащей работы сердца вам необходим магний.
- Поливитамин: витаминная добавка, которая может содержать железо.
- Витамин К: витамин, необходимый организму для обеспечения свертываемости крови.

Предотвращение реакции GVHD

Эти лекарства применяются для предотвращения реакции «трансплантат против хозяина» (graft versus host disease (GVHD)).

Примеры таких средств:

- mycophenolate mofetil (CellCept®);
- cyclosporine (Neoral®);
- tacrolimus (Prograf®);
- sirolimus (Rapamune®);
- methotrexate (в небольших дозах).

Противовирусные препараты

Эти лекарства применяются для предотвращения или лечения вирусных инфекций (например ветряной оспы и опоясывающего лишая). Другие вирусные инфекции, которые иногда наблюдаются при трансплантации, включают цитомегаловирус (ЦМВ), вирус герпеса человека (HHV6), аденовирус и ВК-вирус. Примеры таких средств:

- acyclovir (Zovirax®);
- foscarnet (Foscavir®);
- ganciclovir (Cytovene®);
- cidofovir (Vistide®);
- letermovir (Prevymis®);
- valganciclovir (Valcyte®).

Противогрибковые препараты

Эти лекарства применяются для предотвращения или лечения грибковых инфекций. Примеры таких средств:

- fluconazole (Diflucan®);

- amphotericin (AmBisome®);
- voriconazole (Vfend®);
- micafungin (Mycamine®);
- posaconazole (Noxafil®);
- isavuconazonium (Cresemba®).

Препараты от тошноты

Эти лекарства применяются для предотвращения или устранения тошноты (ощущения подступающей рвоты) и рвоты. Примеры таких средств:

- ondansetron (Zofran®);
- hydroxyzine (Vistaril®);
- metoclopramide (Reglan®);
- granisetron (Kytril®);
- lorazepam (Ativan®);
- dronabinol (Marinol®);
- fosaprepitant (Emend®);
- diphenhydramine (Benadryl®).

Антациды

Эти лекарства применяются для уменьшения выработки желудочного сока. Примеры таких средств:

- pantoprazole (Protonix®);
- lansoprazole (Prevacid®);
- ranitidine (Zantac®);
- omeprazole (Prilosec®);

- esomeprazole magnesium (Nexium®).

Гормоны (для женщин)

Эти лекарства применяются для предотвращения вагинального кровотечения при очень низком количестве тромбоцитов. Примеры таких средств:

- norgestrel (Ovral®);
- norgestrel и ethinyl estradiol (Lo-Ovral®);
- medroxyprogesterone acetate (Provera®);
- leuprolide (Lupron®);
- medroxyprogesterone acetate (Depo-Provera®).

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Commonly Used Medications During Pediatric Stem Cell Transplants - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center