



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Контрастная клизма

Эта информация поможет вам подготовиться к обследованию с применением контрастной клизмы в центре MSK. Из нее вы также узнаете, чего следует ожидать во время и после контрастной клизмы.

Контрастная клизма — это рентгенологическое сканирование толстой кишки с визуализацией. Оно проводится с использованием контрастного вещества, например, бария или йодного раствора, также называемого iohexol (Omnipaque®) и/или воздуха. Благодаря контрастному веществу толстая кишечник лучше видна на рентгеновских снимках.

До процедуры

Большинству людей необходимо очистить толстую кишку (подготовить кишечник) перед контрастной клизмой.

Проконсультируйтесь со своим медицинским сотрудником перед процедурой, чтобы уточнить, какая подготовка нужна вам.

Если вы находитесь на стационарном лечении: перед контрастной клизмой медсестра/медбратья выдаст вам все необходимое для подготовки кишечника.

Если для контрастной клизмы вы приедете в больницу из дома: проконсультируйтесь по поводу подготовки с вашим медицинским сотрудником. Большинству людей необходимо купить следующие принадлежности за несколько дней до процедуры:

- Polyethylene glycol (MiraLAX®). Вам потребуется 1 флакон (238 г).

- Спортивный напиток светлого цвета (не красный и не фиолетовый) (например, Gatorade®). Вам потребуется 2 флакона (по 32 унции [950мл]).
- Bisacodyl (Dulcolax®). Вам потребуется 4 таблетки (по 5 мг).

За день до процедуры

Соблюдайте нулевую лечебную диету

Соблюдайте нулевую лечебную диету в день перед процедурой. Нулевая лечебная диета состоит исключительно из прозрачных жидкостей. Примеры приведены в таблице «Нулевая лечебная диета». Соблюдая эту диету:

- Не употребляйте твердую пищу.
- Страйтесь выпивать не менее 1 стакана (объемом 8 унций [240 мл]) воды каждый час, когда вы бодрствуете.
- Пейте различные прозрачные жидкости, а не только воду, кофе и чай.
- Не пейте напитки красного или фиолетового цвета.
- Не пейте жидкости без сахара, если у вас нет диабета и если вы не получали такое указание от вашей лечащей команды.

Для страдающих диабетом

Если у вас диабет, обсудите с медицинским сотрудником, у которого вы наблюдаетесь по поводу этого заболевания, что вам следует делать при соблюдении нулевой лечебной диеты.

- Если вы принимаете insulin или другие лекарства для лечения диабета, уточните, нужно ли вам изменить их дозировку.
- Спросите, следует ли вам употреблять не содержащие сахар прозрачные жидкости.

При соблюдении нулевой лечебной диеты часто проверяйте уровень сахара в крови. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к своему

медицинскому сотруднику.

Нулевая лечебная диета		
	Можно	Нельзя
Супы	<ul style="list-style-type: none">Прозрачный бульон, мясной отвар или консоме	<ul style="list-style-type: none">Любые продукты с кусочками сухой пищи или приправами
Сладости	<ul style="list-style-type: none">Желе, например, Jell-O®Ароматизированный ледЛеденцы, например, Life Savers®, лимонные дольки и мягкие конфеты	<ul style="list-style-type: none">Конфеты красного или фиолетового цветаВсе другие сладости.
Напитки	<ul style="list-style-type: none">Прозрачные фруктовые соки, например, из яблок, белой клюквы и белого винограда или лимонадыГазированные напитки, например, имбирный эль, 7UP®, Sprite® и минеральная водаСпортивные напитки, например, Gatorade® и Powerade®Черный кофе или обычный чай без молока и сливокВода, включая газированную (шипучую) и ароматизированную водуЖидкие прозрачные пищевые добавки, такие как Boost® Breeze, Ensure Clear™, Pedialyte® и Diabetishield®.	<ul style="list-style-type: none">Напитки красного или фиолетового цветаСоки с мякотьюНектарыСмузи или коктейлиМолоко, сливки и другие молочные продуктыОреховое молоко, растительное молоко, растительные сливки и другие заменители молочных продуктовАлкогольные напитки

Указания по подготовке кишечника

В 15:00 примите 2 таблетки Dulcolax.

В 17:00:

1. Разделите MiraLAX на две части. Вылейте по одной части MiraLAX в

каждый флакон Gatorade (по 32 унции [950 мл] каждый).

2. Взболтайте флаконы до полного растворения MiraLax.
3. Выпивайте по 1 стакану (объемом 8 унций [240 мл]) раствора каждые 30 минут, пока оба флакона не опустеют.

В 19:00 примите еще 2 таблетки Dulcolax.

Инструкции по употреблению пищи



Не ешьте после полуночи (12 часов ночи) накануне процедуры. Это также касается леденцов и жевательной резинки.

Если ваш медицинский сотрудник посоветовал вам прекратить прием пищи раньше полуночи, следуйте его указаниям. Некоторым людям перед процедурой необходимо воздерживаться от приема пищи (не есть) в течение более длительного периода времени.

День проведения процедуры

Примите только те лекарства, которые врач сказал принять утром в день проведения процедуры. Запейте их несколькими маленькими глотками воды.

Инструкции по употреблению напитков

В период между полуночью и за 2 часа до времени прибытия в больницу пейте только те жидкости, которые указаны в списке ниже. Не пейте и не ешьте ничего другого. Ничего не пейте за 2 часа до прибытия.

- Воду
- Прозрачный яблочный сок, прозрачный виноградный сок или прозрачный клюквенный сок
- Напитки Gatorade или Powerade

- Черный кофе или обычный чай. Можно добавить сахар. Больше ничего не добавляйте.
 - Не добавляйте молоко или сливки, включая растительное молоко и молочный порошок.
 - Не добавляйте мед.
 - Не добавляйте ароматизированный сироп.

Если у вас диабет, обратите внимание на количество сахара в этих напитках. Если вы включите в свой рацион эти напитки без сахара, с низким содержанием сахара или без добавления сахара, будет легче контролировать уровень сахара в крови.

Перед операцией необходимо избегать обезвоживания, поэтому пейте, если испытываете жажду. Не пейте больше, чем вам нужно. Во время операции вам будут вводить жидкости внутривенно.



Ничего не пейте за 2 часа до прибытия. Это также касается воды.

Что взять с собой

- Список всех лекарств, которые вы принимаете дома. К ним относятся рецептурные и безрецептурные лекарства, пластыри и кремы.
- Лекарства, принимаемые при нарушениях дыхания (например, ингалятор), если они вам нужны.
- Лекарства, принимаемые при боли в груди, если они вам нужны.
- При наличии у вас стомы возьмите с собой дополнительный мешок и все необходимое.

Куда идти

Ваше обследование с применением контрастной клизмы будет

проведено в главном здании центра Memorial Hospital. Чтобы получить информацию о парковке и указания о том, как добраться до всех отделений центра MSK, перейдите по ссылке www.msk.org/parking.

Войдите через вход на 425 E. 67th St. и поднимитесь на лифте A на 2-й этаж.

Что ожидать в день процедуры

Когда вы приедете в больницу, врачи, медсестры/медбратья и другой медицинский персонал несколько раз попросят вас назвать и продиктовать по буквам ваше имя, а также дату рождения. Это необходимо для вашей безопасности. Люди с одинаковыми или похожими именами могут проходить процедуру в тот же день.

Лаборант-радиолог проводит медицинские обследования с использованием рентгеновских лучей для создания изображений определенных частей тела. Радиолог — это врач, который специализируется на проведении процедур диагностической визуализации. Когда вы переоденетесь в больничную рубашку, лаборант и радиолог расскажут вам о ходе процедуры и ответят на ваши вопросы. Затем они помогут вам лечь на стол рентген-аппарата. Вы будете лежать на спине.

Сначала вам сделают рентген брюшной полости, чтобы убедиться, что в толстой кишке нет кала. Затем радиолог введет небольшую трубку в прямую кишку, чтобы контрастное вещество могло поступать в толстую кишку. В этот момент вы можете почувствовать спазмы.

Радиолог будет следить на экране за прохождением контрастного вещества через толстую кишку. Он будет делать рентгеновские снимки в разное время. Он может поднимать или опускать верхнюю часть стола и/или помочь вам принять различные положения. Это поможет контрастному веществу распространиться на всю поверхность толстой кишки.

Затем лаборант-радиолог извлечет трубку из прямой кишки. Он

покажет вам, где находится туалет, который понадобится вам для выведения контрастного вещества и воздуха из организма. После этого сделают еще один или несколько рентгеновских снимков.

Вы будете ждать в рентгеновском кабинете, пока радиолог изучает рентгеновские снимки. После этого вы сможете уйти.

После процедуры

Вы можете вернуться к привычному для вас рациону питания и образу жизни, если ваш врач или медсестра/медбрать не даст вам иных указаний.

Если вам поставили клизму с барием, ваш стул будет белым в течение нескольких дней после процедуры, пока весь барий не выйдет из организма. Важно пить больше жидкости, чтобы помочь вывести его из толстой кишки.

Иногда барий может вызывать запоры. Через несколько дней после клизмы с барием цвет каловых масс должен восстановиться. Если этого не произошло, спросите у врача, следует ли вам принять слабительное или сделать безрецептурную клизму. Некоторым людям требуется слабительное (например, гидроокись магния) или безрецептурная клизма, чтобы вывести весь барий.

Результаты исследования можно узнать у вашего врача через 2 рабочих дня. Результаты будут также доступны в вашей учетной записи портала MyMSK (портал для пациентов центра MSK).

Контактная информация

Если у вас возникли вопросы по поводу контрастной клизмы, позвоните по телефону 212-639-7298, чтобы поговорить с членом вашей лечащей команды радиологического отделения (Department of Radiology). Вы можете связаться с нами с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

После 20:00, а также в выходные и праздничные дни позвоните по

телефону 212-639-2000 и спросите дежурного врача.

После 20:00, а также в выходные и праздничные дни позвоните по телефону 212-639-2000 и спросите дежурного врача.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Contrast Enema - Last updated on June 6, 2024

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center