



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

О пластыре Flector®

Эта информация описывает пластырь Flector, в том числе то, как его накладывать и носить, а также на какие побочные эффекты следует обращать внимание.

О пластыре Flector

Пластырь Flector (пластырь местного действия с diclofenac epolamine) — это обезболивающее лекарство. Он помогает снять боль и воспаление (отек) на небольшом участке тела, например при растяжении, напряжении, ушибе или артрите. Он содержит нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП).

Пластырь Flector накладывается на кожу. Это значит, что НПВП всасывается через кожу, и лекарственное вещество попадает прямо в ту область, где возникла боль. В другие области лекарство не попадает в таком же количестве.

Перед наложением пластыря Flector

- Убедитесь в том, что кожа чистая. Смойте грязь, лосьон или увлажняющее средство на том участке, куда вы будете накладывать пластырь Flector. Они могут воспрепятствовать правильному прикреплению пластыря к коже.
- Если участок, на который вы будете накладывать пластырь Flector, необходимо промыть, сделайте это с использованием мягкого мыла, ополосните участок водой и промокните его насухо.
- Если на участке, где вы будете накладывать пластырь Flector, растут

волосы, состригите их ножницами. Не брейте этот участок.

Порядок наложения пластыря Flector

- Не накладывайте пластырь Flector на поврежденную кожу, например там, где есть ожог, рана, заражение инфекцией, сыпь или экзема.
- Не накладывайте пластырь Flector на кожу в области, подвергнутой облучению.

Чтобы наложить пластырь Flector:

1. снимите с пластыря прозрачную пленку;
2. наложите пластырь на то место, где боль ощущается сильнее всего;
3. плотно прижмите пластырь рукой и удерживайте примерно 20–30 секунд, чтобы он полностью приклеился к коже;
4. Вымойте руки.

Каждая упаковка содержит несколько пластырей Flector. Открыв упаковку, обязательно снова запечатайте ее. Это предотвратит высыхание оставшихся пластырей.

Храните пластыри при комнатной температуре. Не кладите их в холодильник и не подвергайте воздействию тепла.

После наложения пластыря Flector

- Не мочите пластырь. Не принимайте душ или ванну с наклеенным пластырем.
- Не прикладывайте поверх пластыря теплый или холодный компресс.
- Не допускайте контакта пластыря с глазами. Если это произошло, сразу же промойте глаз водой и позвоните своему врачу.
- Если пластырь начал отклеиваться, закрепите его края клейкой лентой.

Используйте только то количество пластырей, которое прописал ваш врач.

Удаление пластыря Flector

1. Отклейте пластырь от кожи.
2. Согните пластырь клейкой стороной внутрь.
3. Выбросьте пластырь в мусор, где его не достанут дети или домашние животные.
4. Вымойте руки.

Побочные эффекты

Если у вас возникнут какие-либо из перечисленных ниже симптомов, сразу же отклейте пластырь и промойте это место водой.

- Сыпь или кожная реакция в том месте, где наклеен пластырь
- головокружение;
- Отек рук или ног
- прибавка в весе;
- головная боль;
- Еще большее повышение кровяного давления или усугубление заболевания почек, печени или сердца

Меры предосторожности

- Не используйте это средство, если ранее у вас были случаи возникновения сыпи, зуда, астмы или другой аллергической реакции после приема aspirin или других НПВП.
- Не принимайте пероральные НПВП, пока у вас наклеен пластырь (кроме случаев, когда это разрешил ваш врач). Примеры НПВП:
 - Ibuprofen (Advil[®], Motrin[®]);

- Meloxicam (Mobic®)
 - Celecoxib (Celebrex®)
 - Naproxen (Aleve®, Naprosyn®);
 - Diclofenac (Voltaren®).
- Сообщите своему врачу, если вы принимаете другие лекарства, например:
 - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ACE inhibitors) для контроля кровяного давления;
 - стероиды;
 - Aspirin
 - Диуретики (мочегонные средства)
 - литий;
 - метотрексат;
 - Антикоагулянты (лекарства, разжижающие кровь)
 - Обезболивающие лекарства

Позвоните своему врачу или медсестре/медбратау, если у вас:

- возник любой из симптомов, перечисленных в разделе «Побочные эффекты»;
- изменяется количество или цвет мочи;
- новый или необычный симптом.
- возникли какие-либо вопросы или опасения.

Если у вас возникла боль в груди или проблемы с дыханием, сразу же позвоните по номеру 911 или обратитесь в ближайший пункт неотложной медицинской помощи.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

About Flector® Patch - Last updated on September 18, 2019

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center