



---

## ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Гастроэзофагеальный рефлюкс

Эта информация разъясняет причины и симптомы гастроэзофагеального рефлюкса (*gastroesophageal reflux disease, GERD*).

## О заболевании GERD

GERD — это нарушение, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Пищевод — это трубчатый орган, по которому пища и жидкости проходят из полости рта в желудок (см. рисунок 1).




Рисунок 1. Пищевод и желудок человека

GERD может вызывать эзофагит. Это состояние, при котором воспаляется (краснеет и отекает) выстилка пищевода. Если вы не будете лечить эзофагит, он может привести к появлению язв, кровотечению и сужению пищевода. Он также может увеличить риск развития рака пищевода.

## Причины GERD

GERD может быть вызвана различными причинами, включая:

- Употребление большого количества пищи за один

раз

- Употребление в большом количестве:
  - жареной и жирной пищи;
  - острой пищи;
  - цитрусовых, например, апельсинов, лимонов, грейпфрутов и лаймов;
  - шоколада;
  - мяты;
  - томатов;
  - напитков с кофеином, например, кофе, чая и газированных напитков.
- Выполнение физических упражнений сразу после еды.
- Лежачее положение, в особенности сразу после еды. Оно может способствовать возникновению отрыжки (перемещению пищи из желудка в пищевод), при которой появляется неприятный кислый привкус из-за желудочного сока.
- Курение.
- Алкогольные напитки.
- Наличие грыжи пищеводного отверстия, когда верхняя часть желудка выпирает через диафрагму.

Диафрагма — это мышца, отделяющая грудную полость от брюшной полости (живота).

- Беременность.
- Ожирение (избыточное нездоровое количество телесного жира).
- Сдавливание брюшной полости. Это может произойти, если:
  - тужитесь при опорожнении кишечника (когда вы ходите в туалет по-большому) из-за запора (когда опорожнение кишечника происходит реже обычного);
  - напрягаетесь при кашле, наклонах или при подъеме тяжестей;
  - носите брюки со слишком тугим поясом — из-за этого содержимое желудка может выдавливаться вверх и в пищевод.

## Симптомы GERD

Симптомы GERD могут включать:

- изжогу, которая обычно появляется через 30–60 минут после еды;
- отрыжку;
- проблемы с глотанием;

- боль в груди;
- кашель;
- боль в горле;
- ощущение кома в горле.

## Лечение GERD

Цель лечения GERD заключается в облегчении симптомов. Состояние большинства людей улучшается после приема лекарств и изменения образа жизни.

Далее перечислены некоторые способы, с помощью которых вы можете облегчить симптомы GERD:

- Не ешьте большое количество пищи за один раз. Принимайте пищу небольшими порциями, но чаще. Это позволит вам съедать то же количество пищи, но меньшими порциями, которые будет проще переварить.
- Не ложитесь как минимум 2–3 часа после еды.
- Не перекусывайте поздно вечером.
- Воздержитесь от употребления некоторых продуктов питания, например:
  - конфет, жевательной резинки и леденцов со вкусом перечной и кудрявой мяты;
  - жареной и жирной пищи.

- Воздержитесь от употребления некоторых напитков, например:
  - кислых соков, таких как апельсиновый сок;
  - алкоголя;
  - чая из перечной и кудрявой мяты;
  - напитков с кофеином, например, кофе и чая;
  - газированных (шипучих) напитков, например, сладкой газированной воды.
- Принимайте антациды (лекарства, нейтрализующие кислоту в желудке) или сидите прямо, чтобы облегчить изжогу.
- Не курите сигареты и не используйте другую табачную продукцию. В центре MSK есть специалисты, которые могут помочь вам бросить курить. Для получения дополнительной информации о нашей программе лечения табакозависимости (Tobacco Treatment Program) позвоните по номеру 212-610-0507 или поговорите со своим медицинским сотрудником.
- Подложите что-либо под изголовье своей кровати, чтобы приподнять его, или спите на подушке в форме клина, чтобы верхняя часть туловища была приподнята. Это поможет справиться с симптомами ночью. Купить клиновидную подушку можно в

ближайшей аптеке или в магазине медицинских изделий.

- Не допускайте сдавливания брюшной полости.
  - Ограничьте наклоны и интенсивную физическую нагрузку после еды.
  - Не носите тесную одежду.
- Предотвращайте или лечите запоры. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с материалом *Предотвращение запоров* (<https://mskcc.prod.acquia-sites.com/ru/cancer-care/patient-education/constipation>).
- С помощью диеты и физической активности поддерживайте здоровую массу тела. Для получения дополнительной информации о здоровом питании и физических упражнениях ознакомьтесь с материалом *Как улучшить здоровье через питание* (<https://mskcc.prod.acquia-sites.com/ru/cancer-care/patient-education/eat-your-way-to-better-health>).
- Принимайте лекарство, назначенное вашим врачом, согласно его указаниям.

**Когда следует обращаться к своему медицинскому сотруднику**

Позвоните своему медицинскому сотруднику, если наблюдается что-либо из нижеперечисленного:

- ваши симптомы сохраняются после того, как вы попробовали вышеуказанные способы лечения;
- появились проблемы с глотанием.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Last updated on October 18, 2024

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center