



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Fluorouracil and Salicylic Acid

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: Канада

Actikerall

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения предракового состояния кожи, называемого актиническим кератозом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- При дефиците дегидрогеназы дигидропимиридина или болезни почек.
- Если Вы принимали бривудин или соривудин на протяжении последних 4 недель.
- Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте данный препарат во время беременности.
- Если вы кормите ребенка грудью. Не кормите грудью во время

приема данного препарата.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Некоторые препараты против акне, содержащие пероксид бензоила или салициловую кислоту, в редких случаях могут вызывать очень тяжелые и иногда угрожающие жизни аллергические реакции или очень сильное раздражение. Перед первым применением Вам может понадобиться выполнить определенные действия, чтобы убедиться в том, что у Вас нет аллергии. Применяйте данный препарат в соответствии с инструкциями врача или прочитайте листок-вкладыш. Проконсультируйтесь с врачом.
- Для достижения полного эффекта может потребоваться несколько недель.
- Не применяйте дольше назначенного Вашим врачом времени.
- Обработанный участок может быть более чувствительным к свету. При воздействии света может появиться ощущение жжения или пощипывания. Защищайте обработанный участок и кожу вокруг него

от воздействия прямых солнечных лучей, ламп солнечного света, яркого освещения в помещениях и при посещении соляриев после нанесения препарата и в течение всего периода времени, предписанного врачом. Для защиты обработанного участка кожи от света носите соответствующую одежду, например широкополые головные уборы, рубашки с длинным рукавом или перчатки. Солнцезащитные средства будут неэффективны.

- Перед нанесением на кожу других препаратов или продуктов проконсультируйтесь с врачом. Это касается и мыла.
- Данный препарат способен к возгоранию. Не используйте вблизи открытого огня или во время курения.
- Данный препарат может запачкать ткани, древесное покрытие, окрашенные поверхности, мрамор, гранит, винил и эмаль.
- Вероятность тяжелых, а иногда и смертельно опасных побочных эффектов возрастает у пациентов с отсутствием фермента дигидропиримидин дегидрогеназы (ДПД) в организме. К ним относятся раздражение слизистой полости рта или стоматит, диарея, пониженный уровень лейкоцитов или нарушения со стороны нервной системы.
- Этот препарат может быть вредным и даже смертельным для домашних животных. Не допускайте контакта домашних животных с контейнером или обработанным участком кожи. Храните этот препарат в недоступном для домашних животных месте. Выбросьте или постирайте ткань или аппликаторы, которые использовались для нанесения этого препарата. Не допускайте попадания этого препарата на одежду, ковер или мебель. Если домашнее животное прогрызло контейнер, вступило в контакт с этим препаратом, проглотило его, лизало обработанный участок или его вырвало или у него началась судорога, немедленно обратитесь к ветеринару.
- При применении во время беременности возможно вредное влияние препарата на плод. Если Вы беременны или забеременеете в период приема данного препарата, немедленно свяжитесь с лечащим врачом.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Боль или спазмы в животе.
- Диарея, расстройство желудка или рвота.
- Раздражение или боли во рту.
- Любое необъяснимое образование кровоподтеков или кровотечение.
- Черный кал.
- Звон в ушах.
- Учащенное дыхание.
- Учащенное сердцебиение.
- Спутанность сознания.
- Чувство вялости.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за

медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Головная боль.
- Во время лечения могут возникать реакции со стороны кожных покровов в месте применения препарата. К этим реакциям могут относиться жжение или покалывание, зуд, боль, покраснение, отек или кровотечение. Обратитесь к врачу, если у вас отмечаются очень тяжелые реакции со стороны кожных покровов, которые беспокоят вас или не проходят.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Не следует принимать этот препарат внутрь. Только для нанесения на кожу. Следует избегать попадания в рот, нос и глаза (возможен ожог).
- При попадании препарата в глаза немедленно промойте прохладной водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Мойте руки до и после применения.

- Перед нанесением этого лекарственного препарата снимите пленку, оставшуюся на обработанной коже в том месте, где он наносился днем ранее.
- Перед применением промойте пораженный участок. Убедитесь, что кожа хорошо высохла.
- Нанесите тонкий слой на пораженную кожу.
- Избегайте попадания на непораженную кожу.
- Не накладывайте какие-либо покрытия (бинты, повязки), если иное не предписано врачом.
- Не наносите препарат на области порезов, царапин, экземы или на поврежденную кожу.
- Не наносите на какие-либо патологические очаги, которые кровоточат.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Пропустите забытую дозу и вернитесь к своему обычному графику.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительные дозы.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Храните при комнатной температуре. Не помещайте в холодильник или морозильник.
- Предохраняйте от воздействия тепла или открытого пламени.
- Держите крышку плотно закрытой.
- Выбросьте все неиспользованные порции из открытых упаковок через 3 месяца.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.

- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или)

оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2022-10-06

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2025. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Fluorouracil and Salicylic Acid - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center