



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Fluorouracil (Topical)

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Carac; Efudex; Fluropex [DSC]; Tolak

Торговые наименования: Канада

Efudex; Tolak

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения предракового состояния кожи, называемого актиническим кератозом.
- Он используется для лечения определенного типа рака кожи, называемого базально-клеточной карциномой. Только 5%-ная дозировка предназначена для лечения базально-клеточной карциномы.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

- Если у Вас недостаточность дигидропириимидин дегидрогеназы.
- Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте данный препарат во время беременности.
- Если вы кормите ребенка грудью. Не кормите грудью во время приема данного препарата.
- Если пациент ребенок. Не давайте данный препарат ребенку.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Только 5%-ная дозировка предназначена для лечения базально-клеточной карциномы. Если вы используете этот препарат для лечения базально-клеточной карциномы и у вас нет 5%-ной дозировки, поговорите со своим врачом.
- Если у вас аллергия на арахис, проконсультируйтесь с врачом.
- До получения полного результата может пройти несколько месяцев.
- Кожа вначале может выглядеть хуже.
- Существует больший риск получения солнечного ожога. Избегайте

солнца, ультрафиолетовых ламп и соляриев.

- Вы можете использовать увлажняющий крем или солнцезащитный крем через 2 часа после применения этого препарата, если об этом вам сказал врач. Не наносите другие препараты или продукты на кожу, не посоветовавшись с врачом.
- Вероятность тяжелых, а иногда и смертельно опасных побочных эффектов возрастает у пациентов с отсутствием фермента дигидропириимидин дегидрогеназы (ДПД) в организме. К ним относятся раздражение слизистой полости рта или стоматит, диарея, пониженный уровень лейкоцитов или нарушения со стороны нервной системы.
- Этот препарат может быть вредным и даже смертельным для домашних животных. Не допускайте контакта домашних животных с контейнером или обработанным участком кожи. Храните этот препарат в недоступном для домашних животных месте. Выбросьте или простирайте ткань или аппликаторы, которые использовались для нанесения этого препарата. Не допускайте попадания этого препарата на одежду, ковер или мебель. Если домашнее животное прогрызло контейнер, вступило в контакт с этим препаратом, проглотило его, лизало обработанный участок или его вырвало или у него началась судорога, немедленно обратитесь к ветеринару.
- При применении во время беременности возможно вредное влияние препарата на плод. Если Вы беременны или забеременеете в период приема данного препарата, немедленно свяжитесь с лечащим врачом.
- Используйте противозачаточные средства для предотвращения беременности во время лечения данным препаратом. Вам может также понадобиться использовать противозачаточные средства в течение некоторого времени после приема последней дозы. Проконсультируйтесь с врачом по вопросу необходимости применения противозачаточного средства после прекращения приема этого лекарственного препарата.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Боль в кишечнике.
- Диарея с кровянистым калом.
- Рвота.
- Тяжелая диарея.
- Изменения зрения, боль в глазах или сильное раздражение глаз.
- Раздражение или боли во рту.
- Повышение температуры, озноб, боль в горле; появление кровоподтеков и кровотечений по необъяснимым причинам; выраженное чувство усталости или слабости.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Зуд.
- Изменение цвета кожи.
- Образование шрамов.
- У большинства людей, которые применяли данный лекарственный препарат, кожные реакции возникали в месте его нанесения. Среди таких реакций жжение, сухость, раздражение, покраснение, боль и отек. Раздражение может длиться в течение 2 недель или дольше после прекращения применения Вами данного препарата.
Обратитесь к врачу в случае развития у Вас кожной реакции, которая Вас беспокоит.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочтите всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Не принимайте этот лекарственный препарат внутрь. Только для нанесения на кожу. Не наносите этот препарат на глаза, веки, в полости рта или носа (может вызвать раздражение или язвы).
- Не позволяйте этому препарату накапливаться в складках кожи вокруг глаз, носа или рта.

- Если препарат попал на какую-то из этих областей, хорошо смойте его водой.
- Мойте руки до и после применения. Если обрабатываемый участок находится на руке, не мойте руки после применения.
- Перед применением промойте пораженный участок. Убедитесь, что кожа хорошо высохла.
- Подождите 10 минут после промывки пораженного места перед тем, как наносить препарат на кожу.
- Нанесите тонкий слой на пораженный участок и слегка вотрите.
- Не накладывайте какие-либо покрытия (бинты, повязки), если иное не предписано врачом.
- Не наносите препарат на области порезов, царапин, экземы или на поврежденную кожу.
- Не наносите на здоровую кожу.
- После применения препарата следует избегать касания участка кожи, где был применен данный препарат, кожи других людей.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Примите пропущенную дозу, как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительные дозы.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе,

лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2024-03-18

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2024. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Fluorouracil (Topical - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center