



## ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Itraconazole

Этот документ, предоставленный Lexicomp<sup>®</sup>, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

### **Торговые наименования: США**

Sporanox; Sporanox Pulsepak [DSC]; Tolsura

### **Торговые наименования: Канада**

JAMP Itraconazole; MINT-Itraconazole; ODAN Itraconazole; Sporanox

### **Предупреждение**

- Применение данного лекарственного препарата сопровождалось сердечной недостаточностью (ослабленное сердце). Сообщите врачу, если у Вас имеется или когда-либо была сердечная недостаточность. Если на фоне приема данного

лекарственного препарата появляются признаки сердечной недостаточности, такие как одышка, резкое увеличение массы тела, откашливание слизи белого или розового цвета, тахикардия, более частые, чем обычно, ночные пробуждения либо отеки рук или ног, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- Не применяйте этот препарат для лечения инфекции ногтей, если у вас сердечная недостаточность.
- Этот препарат способен взаимодействовать со множеством других препаратов. Это может повлиять на эффективность данного лекарственного препарата или привести к развитию побочных эффектов. В некоторых случаях такие эффекты могут быть тяжелыми или приводить к летальному исходу. Этот препарат нельзя принимать одновременно с такими лекарственными препаратами, как аванафил, цизаприд, дигидроэрготамин, дизопирамид, дофетилид, дронедазон, эплеренон, эргоновин, эрготамин, фелодипин, финеренон, иринотекан, исавуконазол, ивабрадин, ломитапид, ловастатин, луразидон,

метадон, метилэргоновин, мидазолам для приема внутрь, налоксегол, низолдипин, пимозид, хинидин, ранолазин, симвастатин, тикагрелор, триазолам или воклоспорин.

Некоторые пациенты не должны принимать данный лекарственный препарат с такими препаратами, как элиглулат или венетоклакс.

- Существует много других лекарственных препаратов, которые нельзя принимать одновременно с этим препаратом. Уточните у вашего врача и фармацевта, безопасно ли для вас принимать другие лекарственные препараты (рецептурные и безрецептурные средства, препараты природного происхождения или витамины) в течение 2 недель до начала приема этого препарата, одновременно с этим препаратом или в течение 2 недель после завершения приема этого препарата.
- Если у Вас имеются нарушения со стороны почек или печени, не принимайте данный лекарственный препарат, если Вы уже принимаете фезотеродин, солифенацин или препарат, в составе которого есть колхицин.

**Для чего используется этот лекарственный**

## **препарат?**

- Применяется для лечения микозов.

## **Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?**

### **Для всех целей применения данного препарата:**

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

### **Грибковые инфекции ногтей:**

- Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте данный препарат во время беременности.

Сочетание этого препарата с некоторыми лекарствами и заболеваниями может быть неблагоприятно.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с

другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

## **Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?**

### **Для всех целей применения данного препарата:**

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих занятий, требующих повышенного внимания, пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
- Если у Вас головокружение или нарушение зрения, не садитесь за руль и не выполняйте другие задачи или действия, которые могут быть небезопасны.
- Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Если у вас повышенный уровень сахара в крови (диабет), необходимо регулярно проверять уровень

сахар в крови.

- Не применяйте дольше назначенного времени. Возможно возникновение вторичной инфекции.
- Перед употреблением алкоголя проконсультируйтесь с врачом.
- Применение данного лекарственного препарата сопровождалось потерей слуха. Чаще всего это происходило во время приема данного лекарственного препарата вместе с хинидином. В большинстве случаев этот эффект исчезает после прекращения приема данного лекарственного препарата, однако у некоторых людей он может не пройти. Проконсультируйтесь с врачом.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- Если для вас существует риск забеременеть, в период лечения и в течение некоторого времени после получения последней дозы этого препарата необходимо применять противозачаточное средство. Узнайте у лечащего врача, как долго следует применять противозачаточные средства. Если вы забеременеете, немедленно обратитесь к лечащему врачу.

- Сообщите врачу, если вы кормите грудью. Необходимо проконсультироваться, не представляет ли препарат какого-либо риска для ребенка.

### **Грибковые инфекции ногтей:**

- До получения полного результата может пройти от нескольких недель до нескольких месяцев.

### **О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта,

лица, губ, языка или горла.

- Признаки электролитных нарушений, такие как перепады настроения, спутанность сознания, мышечная боль, судороги или спазмы, слабость, тремор, нарушения равновесия, аритмия, судорожные припадки, потеря аппетита, а также сильная тошнота или рвота.
- Признаки повышенного содержания сахара в крови, такие как спутанность мышления, сонливость, необычное чувство жажды и голода, учащенное мочеиспускание, гиперемия, учащенное дыхание, а также фруктовый запах изо рта.
- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Непроходимость мочевыводящих путей.
- Боль или давление в груди.
- Повышенная температура или озноб.
- Изменение зрения.

- Спутанность сознания.
- Звон в ушах, потеря слуха или какие-либо другие изменения слуха.
- Воспаление.
- Понижение сексуального влечения.
- Отсутствие способности достигать или удерживать эрекцию.
- При применении этого препарата в редких случаях регистрировались тяжелые, а иногда и смертельно опасные заболевания печени. Иногда это происходило в течение 7 дней после начала приема данного лекарственного препарата. Немедленно обратитесь к врачу при появлении признаков нарушений со стороны печени, таких как потемнение мочи, утомляемость, отсутствие аппетита, тошнота или боль в животе, посветление кала, рвота, пожелтение кожи или глаз.

### **Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?**

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют.

Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие

побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Головная боль.
- Тошнота или рвота.
- Боль в животе или диарея.
- Насморк.
- Чувство головокружения, сонливости, усталости или слабости.
- Пониженный аппетит.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте

<https://www.fda.gov/medwatch>.

## **Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?**

Применяйте данный препарат в соответствии с

предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

### **Все формы выпуска:**

- Продолжайте принимать этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями Вашего врача или другого медицинского работника, даже если у Вас хорошее самочувствие.
- Принимайте данный препарат приблизительно в одно и то же время дня.

### **Капсулы:**

- Принимайте данный лекарственный препарат во время полноценного приема пищи.
- При пониженной кислотности желудка или приеме другого лекарственного средства для снижения кислотности желудочного сока проконсультируйтесь с врачом, как принимать этот препарат. Этот препарат, возможно, нужно будет принимать вместе с напитками, повышающими кислотность, например с недиетической колой.
- Проглатывайте целиком. Не жуйте, не ломайте и не раздробляйте.

### **Жидкость (раствор):**

- Принимайте данный препарат отдельно от приема пищи.
- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта средство для дозирования этого препарата.
- При грибковых инфекциях во рту или горле прополощите препаратом рот в течение нескольких секунд, а затем проглотите.

### **Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?**

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

### **Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?**

#### **Все формы выпуска:**

- Хранить при комнатной температуре в

защищенном от света месте. Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.

- Держите крышку плотно закрытой.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

### **Жидкость (раствор):**

- Не замораживайте.

### **Общие сведения о лекарственных препаратах**

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут

прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## **Использование информации потребителем и ограничение ответственности**

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в

качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical->

[effectiveness-terms.](#)

## **Дата последнего пересмотра**

2024-02-14

## **Авторское право**

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2024. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Itraconazole - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center