



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Nafarelin

Этот документ, предоставленный Lexicomp[®], содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Synarel

Торговые наименования: Канада

Synarel

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения эндометрия.
- Применяется для замедления полового созревания у детей, развивающихся чрезмерными темпами.
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас необъяснимое вагинальное кровотечение.
- Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте данный

препарат во время беременности.

- Если вы кормите ребенка грудью. Не кормите грудью во время приема данного препарата.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Для всех целей применения данного препарата:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых лабораторных анализов. Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам и сотрудникам лабораторий о том, что Вы принимаете этот препарат.
- До получения полного результата могут пройти 2 месяца.
- Во время применения препаратов, сходных с этим, у некоторых людей возникали судороги. Риск развития судорог может быть повышен у пациентов с заболеваниями головного мозга или кровеносных сосудов головного мозга, эпилептическими приступами или опухолями мозга.

Некоторые другие препараты также могут повышать риск судорог. Если у вас возникнут вопросы, проконсультируйтесь с врачом.

- Если во время лечения этим препаратом у вас наблюдается заложенность носа, обсудите с лечащим врачом возможность назначения препарата, устраняющего заложенность. Препараты, устраняющие заложенность носа, в форме спрея нельзя впрыскивать в течение 2 часов после применения данного препарата.
- В редких случаях в первые 2 месяца лечения могут развиваться кисты яичников.
- В большинстве случаев данный препарат препятствует наступлению менструации. Это не является методом контрацепции. Во время приема данного препарата дополнительно используйте негормональные виды противозачаточных средств, например презерватив.
- Если Вы вовремя не приняли дозу данного препарата, возможно возникновение межменструальных кровотечений. Также если Вы пропускаете прием данного препарата, может появиться вероятность наступления беременности. Проконсультируйтесь с врачом.
- Если Вы способны забеременеть, перед началом приема данного препарата Вы пройдете анализ на беременность, чтобы подтвердить, что Вы НЕ беременны. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- При применении во время беременности возможно вредное влияние препарата на плод. Если Вы беременны или забеременеете в период приема данного препарата, немедленно свяжитесь с лечащим врачом.

При эндометриозе:

- При длительном применении данный лекарственный препарат может вызвать ломкость костей (остеопороз). Если у вас увеличен риск повышенной ломкости костей или есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
- Будьте осторожны, если у Вас есть риск развития состояния, при котором кости становятся хрупкими и мягкими (остеопороза). К таким рискам могут относиться употребление алкогольных напитков,

курение, прием стероидов, противосудорожных препаратов или наличие остеопороза у родственников. Обсудите с лечащим врачом риски развития у Вас остеопороза.

- Пройдите обследование плотности костей согласно указаниям врача. Проконсультируйтесь с врачом.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

Для всех целей применения данного препарата:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Боль или давление в груди.
- Одышка.
- Боль в кишечнике.
- Вагинальные выделения.
- Нехарактерное вагинальное кровотечение.
- Судороги.
- В редких случаях применение данного препарата сопровождалось очень серьезным нарушением со стороны гипофиза (гипофизарной апоплексией). В большинстве случаев это нарушение развивалось через 2 недели после приема первой дозы. Если у Вас возникают

внезапные головные боли, рвота, обморок, изменение настроения, слабость глаз, неподвижность глаз или нарушение зрения, немедленно свяжитесь с врачом.

- При применении подобных препаратов наблюдались тяжелые кожные реакции. К ним относятся синдром Стивенса — Джонсона (ССД), токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) и другие тяжелые кожные реакции. Иногда могут поражаться другие органы. Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью при появлении таких симптомов со стороны кожи, как покраснение, отек, волдыри или шелушение; разрушение кожных покровов; при покраснении или раздражении глаз; изъязвлениях в полости рта, горле, носу, в области глаз или гениталий, а также на любых других участках кожи; при высокой температуре, ознобе, головной боли, кашле, боли в теле или суставах, одышке или увеличении лимфатических узлов.

При эндометриозе:

- Воспаление.
- Костная боль.
- Менструальный цикл все еще продолжается.
- Депрессия и другие расстройства настроения.

Дети:

- Применение препаратов, подобных данному, у детей сопровождалось изменениями поведения и настроения. К таким изменениям относятся агрессивность, плач, депрессия, эмоциональные подъемы и спады, беспокойство, чувства гнева и раздражительности, в также мысли или действия, направленные на самоубийство. При возникновении или усилении изменений поведения или настроения у вашего ребенка немедленно свяжитесь с врачом.
- Во время применения этого препарата регистрировались случаи повышенного внутричерепного давления. Немедленно обратитесь к врачу, если у вашего ребенка возникла головная боль,

головокружение, тошнота, звон в ушах, боль в глазах или нарушения зрения, например отмечается нечеткость зрения, двоение в глазах или потеря зрения.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

Для всех пациентов, принимающих данный препарат:

- Приливы.
- Угри.
- Раздражение носа.
- Насморк или заложенность носа.
- Вагинальное кровотечение или мажущие кровянистые выделения.

При эндометриозе:

- Головная боль.
- Мышечная боль.
- Прибавка в весе.
- Нарушения сна.
- Понижение сексуального влечения.
- Вагинальная сухость.
- Изменение размера молочных желез.

Дети:

- Если Ваш ребенок принимает данный препарат для замедления

полового созревания, в течение первого месяца лечения вы можете отметить кратковременный запах тела или такие признаки полового созревания, как вагинальное кровотечение, увеличение молочных желез, а также увеличение количества лобковых волос. Если это явление продолжается или переносится в тяжелой форме, обратитесь к врачу.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Не принимайте этот препарат через рот. Только для применения через нос. Следует избегать попадания в рот и глаза (возможен ожог).
- Перед первым использованием нажимайте на пульверизатор до появления взвеси.
- Перед применением следует очистить нос.
- Не чихайте во время или сразу после использования данного препарата.
- Впрыскивайте аэрозоль прямо в полость носа. Не следует впрыскивать аэрозоль на носовую перегородку, разделяющую две ноздри.

- Продолжайте принимать этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями Вашего врача или другого медицинского работника, даже если у Вас хорошее самочувствие.
- Чистите перед каждым применением и после в соответствии с указаниями врача.

При эндометриозе:

- Начните принимать этот препарат в период между 2-м и 4-м днем менструального цикла.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.
- Если вы пропустили 2 дозы, обратитесь к врачу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Хранить в вертикальном положении при комнатной температуре. Не замораживать.
- Предохраняйте от света.
- Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Выбросьте все неиспользованные порции по истечении 30 дней.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или

препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К препарату прилагается отдельная инструкция для пациентов. Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее каждый раз при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя

всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2025-12-30

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026.
Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Nafarelin - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center