



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Rotigotine

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Neupro

Торговые наименования: Канада

Neupro

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения болезни Паркинсона.
- Применяется для лечения синдрома беспокойных ног.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

Сочетание этого препарата с некоторыми лекарствами и заболеваниями может быть неблагоприятно.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных

препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Для всех целей применения данного препарата:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих занятий, требующих повышенного внимания, пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
- Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, вставать из лежачего или сидячего положения следует медленно. Подниматься и спускаться по лестнице следует с осторожностью.
- Измеряйте кровяное давление и частоту сердечных сокращений в соответствии с указаниями врача.
- При индивидуальной аллергической реакции на сульфиты необходимо проконсультироваться с врачом. В некоторых продуктах содержатся сульфиты.
- Пластырь может содержать металл. Снимите пластырь перед МРТ или кардиоверсией.
- Нельзя прекращать прием данного лекарственного препарата без консультации с Вашим врачом. При прекращении приема этого препарата у Вас могут появиться признаки синдрома отмены. Если Вам необходимо прекратить прием данного препарата, проконсультируйтесь с Вашим врачом и следуйте его указаниям.

Немедленно сообщите Вашему врачу, если у Вас появились какие-либо из перечисленных симптомов в результате снижения дозы или прекращения приема этого препарата: высокая температура, спутанность сознания, выраженная ригидность мышц, апатия, тревожность, депрессия, чувство усталости, проблемы со сном, потливость или болевые ощущения.

- Проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением алкоголя, марихуаны или других форм каннабиса, а также рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов, которые могут замедлить ваши действия.
- Откажитесь от использования источников тепла (например, ламп солнечного света, соляриев, грелок, электрических одеял, инфракрасных ламп, саун, джакузи, водяных матрасов с подогревом). Избегайте длительного приема горячих ванн или солнечных ванн. Температура тела может повыситься, что приведет к проникновению в организм слишком большого количества препарата.
- Если у вас появились кожная сыпь или раздражение в месте наложения пластыря, избегайте попадания солнечных лучей на этот участок, пока кожа не заживет. Воздействие солнечных лучей может изменить цвет раздраженного участка кожи.
- При внезапном прекращении применения данного препарата возникало тяжелое, а иногда и смертельно опасное заболевание — злокачественный нейрорептический синдром (ЗНС). ЗНС также возникал при снижении дозы данного препарата. Немедленно свяжитесь с врачом в случае высокой температуры, появления мышечных судорог или скованности в мышцах, головокружения, тяжелой головной боли, спутанности сознания, изменений мышления, учащения или нарушения сердечного ритма, а также обильной потливости.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

Синдром беспокойных ног:

- Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если симптомы ухудшились или стали появляться раньше во времени в течение дня.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.
- Сильные желания, которые трудно контролировать (например, прием пищи, азартные игры, секс или трата денег).
- Боль или давление в груди.
- Учащение или нарушение сердечного ритма.
- Появление или усугубление психических расстройств, перепадов настроения или изменений поведения.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Спутанность сознания.
- Высокая температура.
- Мышечная боль.

- Ригидность мышц.
- При появлении или усугублении проблем контролирования движений тела.
- Изменение зрения.
- Изменение полового влечения.
- Данный препарат может вызывать отечность или задержку жидкости в организме. Поставьте в известность врача, если у вас наблюдается отечность, быстрое увеличение веса или трудности с дыханием.
- Некоторые люди засыпали во время управления автомобилем, приема пищи или беседой. Некоторые не ощущали сонливости и чувствовали себя бодро непосредственно перед тем, как заснуть. Эти случаи отмечались спустя 1 год после начала приема данного препарата. Если Вы засыпаете во время различных занятий, в день приема препарата откажитесь от вождения транспортных средств, а также прочих занятий или видов работ, требующих повышенного внимания. Если у Вас наблюдается повышенная сонливость, немедленно свяжитесь с врачом.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Запор, диарея, рвота или тошнота.
- Пониженный аппетит.
- Чувство головокружения, сонливости, усталости или слабости.
- Странные или необычные сны.
- Головная боль.
- Излишнее потоотделение.

- Нарушения сна.
- Боль в суставе.
- Раздражение в месте применения препарата.
- Сухость во рту.
- Раздражение носа или горла.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Не разрезайте и не разделяйте пластыри. Не используйте поврежденные пластыри.
- Мойте руки до и после применения.
- Наносите пластырь на чистую, сухую, здоровую кожу на животе, в области тазобедренного сустава, на боку, бедре или плече.
- Наносите пластырь приблизительно в одно и то же время дня.
- Не наносить на участки раздраженной или поврежденной кожи. Не наносить на участок кожной складки или кожи, которая будет натираться плотно прилегающей одеждой.

- Не накладывайте на кожу в тех местах, где только что использовались кремы, масла, лосьоны, порошок или другие продукты, предназначенные для нанесения на кожу. Пластырь может также не приклеиться.
- За три дня до размещения пластыря сбрейте волосы на участке его размещения.
- При размещении пластыря плотно прижимайте его в течение 30 секунд.
- Меняйте место расположения каждого нового пакета. Не наносите на то же место в течение 14 дней.
- Соблюдайте осторожность, чтобы пластырь не отклеился, когда вы принимаете ванну или душ.
- Если пластырь спадает, наложите новый.
- При ослаблении пластыря, закрепите его лейкопластырем ТОЛЬКО по краям.
- После снятия пластыря промойте участок кожи, на который был нанесен, мылом и водой.
- Продолжайте применять этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями Вашего врача или другого медицинского работника, даже если у Вас хорошее самочувствие.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Нанесите пропущенный пластырь как только сможете, предварительно сняв старый.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не наносите более 1 пластыря одновременно.

Как мне хранить и (или) выбросить этот

лекарственный препарат?

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните пластыри в защитном пакете до употребления.
- После снятия пластыря согните его пополам, соединив между собой клейкие стороны. Выбрасывайте использованные пластыри туда, где они будут недоступны для детей и домашних животных.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим

работником здравоохранения.

- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2021-08-03

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2025. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Rotigotine - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center