



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Salicylic Acid

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

AcNesic [DSC]; Atrix Medicated Formula [OTC]; Atrix System 1 [OTC]; Bensal HP; Betasal [OTC]; Clear Away 1-Step Wart Remover [OTC] [DSC]; Corn Remover One Step [OTC] [DSC]; DermacinRx Atrix Antibac Wash [OTC]; DermacinRx Atrix Clarify Toner [OTC]; DHS Sal [OTC]; FT Medicated Corn Removers [OTC]; GoodSense Corn & Callus [OTC]; GoodSense Liquid Wart Remover [OTC]; Gordofilm; Keralyt; Keralyt Scalp [DSC]; Keralyt [OTC]; Mediplast [OTC] [DSC]; Neutrogena Oil-Free Acne Wash [OTC]; P & S [OTC]; Psoriasis [OTC] [DSC]; RayaSal; Sal-Plant [OTC] [DSC]; Saalex [DSC]; Salicate; Salicylic Acid Wart Remover; Salimez; Salimez Forte; Salvax; Salycim; Salynta; UltraSal-ER; Virasal; Xalix

Торговые наименования: Канада

Saliject [DSC]

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения угрей.
- Этот препарат применяют для удаления кожных мозолей, мозолей и бородавок.
- Применяется для лечения псориаза.

- Этот препарат применяют для лечения себорейного дерматита.
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

Для всех целей применения данного препарата:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

При мозолях, натоптышах и бородавках:

- В одном из следующих случаев: повышенный уровень сахара в крови (диабет) или пониженное кровообращение.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Некоторые препараты против акне, содержащие пероксид бензоила

или салициловую кислоту, в редких случаях могут вызывать очень тяжелые и иногда угрожающие жизни аллергические реакции или очень сильное раздражение. Перед первым применением Вам может понадобиться выполнить определенные действия, чтобы убедиться в том, что у Вас нет аллергии. Применяйте данный препарат в соответствии с инструкциями врача или прочитайте листок-вкладыш. Проконсультируйтесь с врачом.

- Нельзя наносить на открытые раны, порезы или раздраженную кожу.
- Будьте осторожны при нанесении на большие участки кожи. Проконсультируйтесь с врачом.
- Не наносите данный лекарственный препарат на родимые пятна, родинки или покрытые волосами бородавки, а также на цервикальные кондиломы, кондиломы в области половых органов и в полости рта.
- Слишком частый прием данного препарата может привести к усугублению вашего кожного заболевания.
- Применение других продуктов для кожи одновременно с этим препаратом может увеличить раздражение.
- Перед нанесением на кожу других препаратов или продуктов проконсультируйтесь с врачом. Это касается и мыла.
- Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых лабораторных анализов. Вашему врачу или сотруднику лаборатории необходимо сообщить о том, что Вы применяете данный препарат.
- Некоторые из этих препаратов способны к возгоранию. Не применяйте вблизи открытого огня или во время курения.
- В случае проглатывания данного препарата он может быть вреден. При случайном проглатывании этого препарата немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.
- Не давайте препарат детям и подросткам, у которых присутствуют симптомы или которые находятся в процессе выздоровления при гриппе, ветряной оспе или других вирусных инфекциях из-за риска

развития синдрома Рейе. Синдром Рейе приводит к очень тяжелым нарушениям со стороны головного мозга и печени.

- Если пациент — ребенок, используйте этот препарат с осторожностью. У детей риск возникновения некоторых побочных эффектов может быть более высоким.
- Различные торговые марки этого препарата могут быть предназначены для использования у детей разных возрастов. Прежде чем давать данный препарат ребенку, проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.
- Если Вы кормите грудью, не наносите этот препарат на грудную клетку. Проконсультируйтесь со своим врачом.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Перемены настроения.
- Учащенное дыхание.
- Тошнота или рвота.

- Звон в ушах, потеря слуха или какие-либо другие изменения слуха.
- Головокружение.
- Чувство крайней усталости или слабости.
- Диарея.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Кожное раздражение.
- Сухая кожа.
- Жжение или покалывание.
- Отслаивание.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача.

Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Для всех целей применения данного препарата:

- Не следует принимать этот препарат внутрь. Только для нанесения на кожу. Следует избегать попадания в рот, нос и глаза (возможен ожог).
- При попадании данного лекарственного препарата в глаза промойте глаза холодной водой.
- Перед применением промойте пораженный участок. Убедитесь, что кожа хорошо высохла.
- Не вдыхайте пары.
- Мойте руки до и после применения. Если обрабатываемый участок находится на руке, не мойте руки после применения.

Пена:

- Подготовьте распылитель перед первым применением.
- Некоторые из данных лекарственных препаратов необходимо взбалтывать перед применением. Убедитесь, что Вы точно знаете, нужно ли взбалтывать данный лекарственный препарат перед применением.
- Нанесите пену на пораженный участок и осторожно вотрите.

При угревой сыпи (акне):

Крем, гель, раствор или лосьон:

- Нанесите тонкий слой на пораженный участок и слегка вотрите.
- Некоторые из данных лекарственных препаратов необходимо взбалтывать перед применением. Убедитесь, что Вы точно знаете, нужно ли взбалтывать данный лекарственный препарат перед применением.

Промойте:

- Влажная кожа.
- Нанесите на пораженную кожу, вспеньте и тщательно смойте.

Грелка:

- Пользуйтесь тампоном для нанесения тонкого слоя салициловой кислоты на пораженный участок.
- Не оставляйте подушечку на коже.

При мозолях, натоптышах и бородавках:

- Можно намочить пораженный участок в течение 5 минут.
- По рекомендации врача можно накрыть тонкой повязкой.

Гель и жидкость:

- Нанесите на пораженную кожу и дайте высохнуть.

Крем:

- Нанесите тонкий слой на пораженный участок и слегка вотрите.

При псориазе и себорейном дерматите:

Крем, гель, жидкость и мазь:

- Нанесите тонкий слой на пораженный участок и слегка вотрите.
- Если препарат предназначен для нанесения на волосистую часть головы, следуйте инструкциям, которые вы получили от врача или прочитали на упаковке.

Шампунь:

- Иногда этот препарат наносят на влажные волосы. Иногда его нужно наносить на сухие волосы. Убедитесь, что вы точно знаете, как применять данный препарат. В случае сомнений

проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

- Повторить лечение в соответствии с указаниями врача.

Шампунь с набором гелей:

- Если вы применяете шампунь для лечения кожи головы, **не** мочите волосы. Используйте аппликатор для нанесения на пораженные области. Оставьте в соответствии с указаниями. Тщательно промойте водой. Если хотите, можете вымыть волосы не лечебным, а обычным шампунем.
- Для применения геля на коже головы, нанесите с помощью аппликатора на поврежденные области. Оставьте в соответствии с указаниями. Вымойте теплой водой или с помощью лечебного шампуня.
- При применении геля на коже, используйте во время сна. Перед применением этого препарата пропитайте область в течение, как минимум, 5 минут. Нанесите тонкий слой и осторожно втирайте. Закутайте, как указано. Вымойте утром.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительные дозы.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Предохраняйте от воздействия тепла или открытого пламени.

- Держите крышку плотно закрытой.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Пена:

- Храните в вертикальном положении с закрытым колпачком.
- Не протыкать.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за

медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2023-05-01

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2025. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Salicylic Acid - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center